Bilan de campagne national pois chiche 2023

28 septembre 2023

Quentin Lambert – Ingénieur de développement
6 Chemin de la Côté Vieille, 31450 Baziège
q.lambert@terresinovia.fr

La campagne pois-chiche 2023 renoue avec des prix d'acompte avant campagne plutôt intéressants qui sécurisent l'insertion de l'espèce dans l'assolement. De ce fait, l'engouement pour l'espèce se fait ressentir de nouveau, dans les deux principaux bassins de production : Poitou-Charentes et le Sud-Ouest. Ceci est d'autant plus intéressant que les deux précédentes campagnes ont été difficiles (r21 et r22), avec des rendements moyens et/ou des qualités de graines décevantes.

Notes de lecture :

Le Sud-Ouest correspond à l'ancienne région administrative Midi-Pyrénées en y ajoutant l'Ouest Audois.
L'Ouest correspond au Sud de la région Pays de la Loire et à l'ancienne région administrative Poitou-Charentes.
Le Sud-Est correspond à la région Provence Alpes Côte d'Azur ainsi que l'ancienne région administrative Languedoc-Roussillon (hors Ouest Audois).
Les éléments rapportés ici ne sont représentatifs que des secteurs, au sein des régions, où l'on retrouve effectivement du pois chiche.

Terres Inovia tient à remercier l'ensemble des acteurs du territoire qui accompagne le développement de la culture du pois chiche et qui nourrissent ce bilan de campagne, par les échanges riches et réguliers que nous pouvons avoir avec eux.

Faits marquants

- **Une période de semis favorable** à l'implantation de la culture pour l'ensemble des secteurs de production.
- **Une campagne très difficile dans le Sud-Est** avec un déficit de pluie inédit sur les principales périodes du cycle de la culture ainsi qu'une pression héliothis très importante.
- A l'inverse, **des pluies non limitantes dans le reste des secteurs** de production permettant une mise en place des composantes de rendement tout à fait intéressantes.
- Localement, on retrouve **une pression ascochytose importante** surtout en mai/juin, bien gérée par les solutions disponibles. Localement encore, les pluies incessantes dans le Sud-Ouest entrainent de la verse et le développement de maladies tel que du botrytis sur gousses.
- Globalement, **une pression héliothis très forte** avec un gradient d'Est en Ouest. L'Est étant particulièrement concerné par de forts dégâts en parcelle. C'est un fait notable de l'année car le suivi de ce ravageur a été difficile du fait d'un chevauchement de plusieurs générations durant le cycle de la culture.
- **Récolte** : Des résultats très décevants dans le Sud-Est (6 à 15q/ha), bon dans le Centre Ouest (20-30q/ha) et hétérogène dans le Sud-Ouest mais globalement bon situé entre 18-20q/ha et 25-30q/ha selon les potentiels beaucoup d'hétérogénéité dans l'Ouest et le Sud-Ouest. Attention à la qualité des graines avant triage (cause héliothis).

Implantation





- **Sud-Ouest**

Sortie d'hiver, en janvier/février, les reprises en vue de la préparation du lit de semence se sont déroulées dans de très bonnes conditions. L'alternance de périodes pluvieuses et sèches, ainsi que les nombreux jours de gel durant l'hiver, ont permis d'avoir un état structural très satisfaisant. On note des premiers semis mi-février, à la faveur d'un temps plutôt sec. La majorité des semis se sont déroulés ensuite sur la première quinzaine de mars. Les levées sont plutôt bonnes et régulières. Quelques dégâts d'oiseaux (pigeons ramiers) ou de lièvres sont à noter.

- **Ouest**

Les semis se sont déroulés dans de bonnes conditions, avec des premières implantations plutôt précoces pour la région. En effet, dès mi-février, les premiers pois chiches étaient mis en terre alors que les températures étaient encore fraîches pour la saison. Globalement, l'implantation est réussie sur ce secteur.

- **Sud-Est**

Les semis se déroulent dès la mi-décembre et jusqu'à fin janvier dans des conditions particulières. En effet, les conditions sont très hétérogènes entre les secteurs. Le sec domine sur une grande partie du territoire. Les températures sont, comme dans le Sud-Ouest, plutôt froides pour la saison en janvier/février. Ces températures basses, couplées à la sécheresse, poussent certains producteurs à décaler les semis sur février, ce qui est assez inhabituel pour le secteur. Les peuplements sont de décevants à corrects en fonction de l'état hydrique des sols.

Début de cycle

- **France**

La phase végétative se déroule globalement dans de bonnes conditions pour les bassins de production Ouest et Sud-Ouest. Les cumuls ne sont pas limitants pour l'installation de la culture sans toutefois être excessifs. Durant ce mois d'avril, on retrouve des températures moyennes plus adaptées à la croissance du pois chiche, le mois de mars ayant été plus frais. Le contrôle des adventices est plutôt bon grâce à l'action des racinaires.



Durant cette phase dans une minorité de situations, les premiers symptômes d'ascochytoses en parcelle ont été remarqués, notamment dans le Sud-Ouest.

Dans le Sud-Est, la pluviométrie est toujours insuffisante et limite le développement des plantes.

Figure 1 : Parcelle au stade premières gousses dans l'Est de la Haute-Garonne, dpt 31 (Crédits Q. Lambert)

Floraison/Remplissage

- **France**

Au global, les mois de mai et juin sont très pluvieux. De 125 à 350mm sur les principaux départements du Sud-Ouest ainsi que la vallée du Rhône. Côté Poitou Charentes, les pluies sont légèrement moins intenses mais on relève généralement des cumuls de 100 à 200mm. Enfin, sur le pourtour méditerranéen, hors vallée du Rhône, on note un retour des pluies, de 40 à 100mm. Celles-ci restent bien faibles et surtout trop tardives pour sauver la culture.



- **Sud-Est**

La floraison s'est déroulée majoritairement sur le mois d'avril et une partie du mois de mai. Des mois encore très secs, peu favorables au nombre d'étage de gousses. Cela s'ajoute à un nombre de ramifications très faible. Le mois de mai renoue avec les pluies mais celles-ci sont tardives et ne viendront compenser que le remplissage des gousses en place. A noter que dans la vallée du Rhône, les semis sont plus tardifs et la culture profite donc, pendant la floraison et le remplissage, des pluies de mai et juin. On ne note pas de dégâts d'ascochytose sur ce secteur.

- **Secteurs Ouest et Sud-Ouest**

La floraison s'est déroulée sur la deuxième quinzaine du mois de mai et sur une partie de juin. Une floraison particulièrement longue du fait des précipitations très régulières sur ce mois. En parallèle, on ne note aucun jour de température pénalisante, qu'elles soient chaudes (>= à 36°C en pic journalier) ou fraîches (<= à 15°C en moyenne journalière) et qui peuvent provoquer des avortements de fleurs ou de gousses en fonction de l'intensité et de leur récurrence.

- ## Ascochytose

Les conditions météorologiques sont propices aux contaminations d'ascochytose. Dès le début du mois de mai, une part significative de parcelles présente des symptômes d'ascochytose sur folioles et dans les situations les plus préoccupantes, sur tiges. A cette date, l'intensité reste plutôt faible.

Figure 2 : *Foyer d'ascochytose dans une parcelle au Sud de la Haute Garonne, dpt 31 (Crédits Q. Lambert)*

Dès la seconde quinzaine de mai et jusqu'à mi-juin, c'est-à-dire durant la floraison, les contaminations sont plus nombreuses, et dans les situations non protégées, les foyers pouvaient être assez conséquents. Les programmes fongicides ont dû être renforcés par un troisième passage voir un quatrième dans les situations où la maladie était très présente.

Cette année, les pluies n'ont pas été limitantes pour la levée et les conditions humides ont perduré sur le mois de mai et juin. Celles-ci ont entrainé des re-salissements de parcelles, avec notamment des chénopodes, des repousses de tournesol, du liseron des champs, etc. On note moins de différence cette année entre les types de semis céréales ou monograine. En effet, les pertes de plantes liées au semis céréales ont moins été observables cette année (pluie non limitante) et ce type de semis a permis une fermeture du rang plus rapide entrainant un salissement bien présent mais moins important. A noter toutefois qu'en pluriannuel, et lorsque c'est possible, le semoir monograine (40 à 60cm d'écartement) est plus adapté pour sécuriser le peuplement (ce qui se traduit ensuite dans les essais Terres Inovia par un gain sur le rendement).

Comme durant la floraison, la phase de remplissage n'est pas limitante au niveau météorologique. Toutefois, le développement de la culture est généralement exubérant et le Sud-Ouest connait un nombre inédit d'épisodes orageux en juin. Ces orages sont accompagnés de rafales de vents qui entrainent une verse de la culture dans certaines situations. Ce phénomène est observé dès la première quinzaine de juin. La verse entraine différentes contraintes. En premier lieu, pour la récolte (voir partie dédiée ci-dessous) mais surtout sur le développement de botrytis à l'intérieur du couvert versé, sur gousses, entrainant des avortements. L'intensité de la maladie est liée à chaque situation versée mais c'est un fait marquant de l'année.

- ## Ravageurs

Le pois chiche est touché par un nombre restreint de ravageurs.

La présence de mineuses est plutôt rare cette année. Elle arrive plus tardivement qu'à l'accoutumée, c'est à dire fin mai, voir début juin. Les situations de fortes pressions sont très rares, même dans l'Aude (dpt 11) pourtant régulièrement touché par l'insecte. A noter que les dégâts de mineuse n'engendrent pas de nuisibilité sur la culture, sauf rare cas dans les secteurs historiques de productions.



Figure 3 : *Dégâts de mineuse sur feuilles (Crédits Q. Lambert)*

L'héliothis est le principal ravageur et cette année, son impact sur le culture atteint des niveaux préoccupants, notamment dans le Sud-Est.

En effet, sa fréquence dans les parcelles a été très importante et les dégâts liés à sa présence dépendent du secteur. On remarque un gradient d'Est en Ouest sur son intensité. Le premier pic de vol est observé fin juin dans le Sud-Ouest via les captures d'adultes au champ. Il en est de même dans le Sud-Est avec un premier pic de vol qui a dû survenir près d'un mois plus tôt. Cette année, ce suivi a été difficile du fait d'un chevauchement de plusieurs générations durant le cycle de la culture. L'intensité habituelle des pics s'est étalée puisque plusieurs générations étaient déjà en place. Dès lors que plusieurs générations se chevauchent, il est beaucoup plus difficile d'effectuer un contrôle efficace en parcelle. En effet, les solutions disponibles ciblent uniquement les œufs et les jeunes larves (dites L1, L2). De plus, elles possèdent une rémanence faible, qui n'excède pas une dizaine de jours. Le positionnement de la protection et le renouvellement de celle-ci durant la phase de sensibilité sont donc cruciaux pour arriver à diminuer la pression du ravageur.

Figure 4 : *Héliothis perforant des gousses à la recherche de grains (Crédits Q. Lambert)*

Dans le Sud-Est, la pression était telle que ces pratiques n'ont pas suffi et les dégâts sur graines sont très importants. A noter que ce ravageur pose également de nombreux problèmes dans plusieurs filières (soja,

tomates plein champ, sorgho, maïs spéciaux). On en retrouve même à ce jour dans de nombreuses parcelles de tournesol du Sud-Ouest.

Récolte



- **Sud-Est**

Les récoltes ont débuté mi-juillet et se sont terminées début août. Les rendements sont très décevants, de l'ordre de 6 à 10q/ha, impactés par le climat et l'héliothis. Dans la vallée du Rhône, les rendements moyens sont estimés à 10-15q/ha, surtout impactés par l'héliothis.

- **Sud-Ouest**

Les récoltes ont débuté début août pour les secteurs plutôt préservés en eau sur le mois de juillet. Le gros des récoltes s'est déroulé mi-août, avec des rendements allant de 10 à 35 q/ha. Les résultats sont donc très hétérogènes selon les parcelles. En fonction des potentiels de sol, on retiendra des moyennes de 18-20q/ha à 25-30q/ha. La qualité des graines est impactée par la présence, plus ou moins forte, d'héliothis dans les parcelles. La récolte des parcelles versées a dû être adaptée avec des doigts releveurs ou via du fauchage andainage.

- **Ouest**

Les récoltes se sont déroulées début août dans de bonnes conditions. Le rendement moyen est fonction des potentiels de sol et très régulièrement compris entre 15 et 20q/ha (fourchette comprise 5 à 30q/ha).