

נייר עמדה

מתן אישור רפואי לחזרה למוסדות חינוך לאחר מחלה מידבקת

על פי נוהל משרד הבריאות וההסתדרות הרפואית בישראל

ד"ר אלכס גורי • פרופ' אפרים בילבסקי • פרופ' גליה גריסרו

החוג למחלות זיהומיות בילדים | נובמבר 2023

תוכן המצגת

- 01 מטרת הנוהל ועקרונות כלליים
- 02 מתי הילד יכול להישאר במסגרת
- 03 מתי יש להוציא את הילד מהמסגרת
- 04 מחלות מערכת העיכול – שלשולים והקאות
- 05 זיהומים ספציפיים – הפטיטיס, A, אימפטיגו, סטרפטוקוק
- 06 טבלה מסכמת – אישור חזרה למסגרת

מטרת הנוהל

להגדיר מתי ילד שחלה במחלה מידבקת רשאי לחזור למוסד חינוכי או למעון, באופן שמאזן בין בריאות הילד, בריאות הסביבה ויכולת הצוות לטפל בכלל הילדים.

טובת הילד

מצבו הקליני של הילד הוא הקריטריון המרכזי – לא רק האבחנה.

בריאות הסביבה

מניעת הדבקה במסגרת תוך הימנעות מהרחקה מיותרת.

יכולת הצוות

ילד חולה מאוד מצריך טיפול שמונע מהצוות לטפל בשאר הילדים.

עקרונות כלליים

- 1 ההחלטה מבוססת על מצבו הקליני של הילד – ולא רק על שם המחלה.
- 2 תנאי בסיסי בכל המקרים: הילד מרגיש טוב מספיק להשתתף בפעילות.
- 3 חום מעל 38°C מחייב הרחקה עד 24 שעות ללא חום (ללא משככי חום).
- 4 סימני אזהרה: ישנוניות, אפטיות, קוצר נשימה, פריחה מתפשטת, כאב חד מתמשך.
- 5 במקרים מיוחדים – נדרש תיאום פרטני עם לשכת הבריאות הנפתית.

מצבים שבהם הילד יכול להישאר במסגרת

בתנאי שהילד מרגיש טוב, ללא חום ומסוגל להשתתף בפעילות

✓ דלקת אוזניים קלה – ללא חום

✓ נזלת, כאב גרון או שיעול קל – ללא חום

✓ פריחה מוכרת, ללא חום וללא שינוי בהתנהגות

✓ דלקת לחמית קלה – ללא הפרשות, כאב או נפיחות

✓ כינמת – לאחר תחילת טיפול

✓ מולוסקום קונטגיוזום

✓ נשאות אסימפטומטית של חיידקים עמידים (ESBL, CRE, MRSA)

✓ הרפס בשפה (Herpes labialis)

✓ ילדים עם HBV, HCV או HIV

✓ תולעי סיכה (Enterobiasis)

מתי יש להוציא את הילד מהמסגרת

תסמינים כלליים המחייבים הרחקה

מחלה שמונעת השתתפות

הילד אינו מסוגל להשתתף בפעילות המסגרת בנוחות.

חום $\geq 38^{\circ}\text{C}$

בכל דרך מדידה שסוכמה עם ההורים.

סימני מחלה מובהקים

ישנוניות, אפטיות, אי-שקט, בכי מתמשך ללא הסבר.

טיפול שמכביד על הצוות

מצב שפוגע ביכולת הצוות לטפל בשאר הילדים.

כאב חד ממושך

כאבי ראש, בטן, רגל או חזה שאינם חולפים.

מצוקה נשימתית

קוצר נשימה, נשימות מהירות או נשימה רעשנית.

מתי להוציא?

■ ילד גמול שאינו מסוגל להתאפק

■ ילד לא גמול – יציאות "גולשות" מהטיטול

■ מעל 2 יציאות מעבר לרגיל ביום

■ יציאות עם דם או ריר – להפנות לרופא

מתי לחזור?

24 שעות לאחר הפסקת השלשול

Shigella, Salmonella (non-typhi), Campylobacter, Rotavirus

48 שעות לאחר הפסקת השלשול

Cryptosporidium, Norovirus, Giardia lamblia

תיאום פרטני עם לשכת הבריאות

Salmonella typhi / paratyphi, HUS (E. coli STX)

שים לב: בקריפטוספורידיום – להימנע מבריכות ציבוריות 14 ימים מהפסקת השלשול. בשיגלה / קמפילובקטר – לשקול אנטיביוטיקה לפחות יומיים לפני החזרה.

הקאות והפטיטיס A

הפטיטיס A (HAV)

1 פעולה בהתאם להנחיות לשכת הבריאות הנפתית.

2 חזרה למסגרת לפחות שבוע לאחר הופעת הצהבת.

3 וידוא שכל הילדים והצוות חוסנו ב HAV-לפחות שבועיים קודם ,
או קיבלו חיסון /אימונוגלובולינים לאחר חשיפה.

הקאות

יש להוציא ילד אם הקיא פעמיים או יותר בתוך 24 שעות.

חריג: רופא קבע שההקאות אינן מחלה מידבקת ושאינן סכנת
התייבשות.

חזרה למסגרת

לאחר 24 שעות מהפסקת ההקאות.

אימפטיגו ודלקת גרון סטרפטוקוקלית

Tonsillitis (Strep A)

הרחקה:

ילד עם בידוד סטרפטוקוק A מקבוצה בטא-המוליטי.

תנאי לחזרה:

24 שעות ללא חום.

נוסף:

לפחות 12 שעות מתחילת טיפול אנטיביוטי מתאים.

אימפטיגו / פצעים מוגלתיים

הרחקה:

עד תחילת טיפול אנטיביוטי שנקבע על-ידי הרופא המטפל.

חזרה:

לאחר תחילת הטיפול האנטיביוטי – ניתן להחזיר את הילד.

המלצה:

מומלץ לכסות את הנגעים, אם ניתן, עד להחלמה מלאה.

טבלה מסכמת –נספח 1

מצב רפואי	אישור חזרה למסגרת	הערות
כל מחלת חום	24שעות ללא חום	
נזלת, שיעול קל, דלקת אוזניים קלה	אין מניעה	
דלקת לחמית	רק אם קלה	ללא כאב, הפרשות או נפיחות
HIV, HBV, HCV, EBV, CMV, Parvo B19, Herpes labialis	אין מניעה	
Molluscum / נשאות MRSA / Enterobiasis	אין מניעה	
שלשולים (גורם לא ידוע)	24שעות לאחר חלוף השלשול	ראה פירוט בטקסט
Shigella, Salmonella, Campylobacter, Rotavirus	24שעות לאחר השלשול	
Cryptosporidium, Norovirus, Giardia	48שעות לאחר השלשול	להימנע מבריכות 14 ימים
Salmonella typhi/paratyphi, HUS (STEC)	בתיאום עם לשכת הבריאות	
הקאות	24שעות לאחר הפסקת ההקאות	
Hepatitis A	≥שבוע מהופעת צהבת	בתיאום עם לשכת הבריאות
Impetigo	לאחר תחילת טיפול אנטיביוטי	מומלץ לכסות נגעים
Tonsillitis – Strep A	24שעות ללא חום 12 +שעות אנטיביוטיקה	

עיקרי הדברים

1

הקריטריון העיקרי הוא הרגשת הילד

ילד שמרגיש טוב, ללא חום, יכול להישאר במסגרת גם עם תסמינים קלים.

3

שלשולים – להתייחס לגורם

מעבר ל 24/48-שעות לפי המחולל; דם או ריר – פנייה לרופא.

2

חום מעל 38°C = הרחקה

חזרה רק לאחר 24 שעות ללא חום וללא משככי חום.

4

מקרים מיוחדים = לשכת בריאות

– Hepatitis A, S. typhi/paratyphi, HUS תיאום עם הרופא המחוזי.