

UNIVERZA V LJUBLJANI  
FAKULTETA ZA MATEMATIKO IN FIZIKO

Finančna matematika - 1. stopnja

Anej Rozman

## **Verjetnost z mero**

Zapiski po predavanjih doc. dr. Matije Vidmarja v študijskem letu 2023/2024.

Ljubljana, 2023

# Kazalo

<b>1</b>	<b>Mera</b>	<b>2</b>
1.1	Merljivost in mere . . . . .	2
1.1.1	Merjlive mnozice . . . . .	2
1.1.2	Mere . . . . .	3
1.1.3	Merjlive preslikave in generirane $\sigma$ -algebre . . . . .	5

# 1 Mera

## 1.1 Merljivost in mere

### 1.1.1 Merjlive množice

**Definicija 1.1.** Naj bo  $\mathcal{A} \subset 2^\Omega$ , torej  $\mathcal{A} \in 2^{2^\Omega}$ . Pravimo, da je  $\mathcal{A}$  zaprta za:

1.  $c^\Omega$  (zaprta za komplemente v  $\Omega$ )  $\iff \forall A \in \mathcal{A} \Rightarrow \Omega \setminus A \in \mathcal{A}$
2.  $\cap$  (zaprta za preseke)  $\iff A \cap A' \in \mathcal{A}$  kadarkoli  $\{A, A'\} \subset \mathcal{A}$
3.  $\cup$  (zaprta za unije)  $\iff A \cup A' \in \mathcal{A}$  kadarkoli  $\{A, A'\} \subset \mathcal{A}$
4.  $\setminus$  (zaprta za razlike)  $\iff A \setminus A' \in \mathcal{A}$  kadarkoli  $\{A, A'\} \subset \mathcal{A}$
5.  $\sigma\cap$  (zaprta za stevne preseke)  $\iff \cap_{n \in \mathbb{N}} A_n \in \mathcal{A}$  kadarkoli je  $(A_n)_{n \in \mathbb{N}}$  zaporedje v  $\mathcal{A}$
6.  $\sigma\cup$  (zaprta za stevne unije)  $\iff \cup_{n \in \mathbb{N}} A_n \in \mathcal{A}$  kadarkoli je  $(A_n)_{n \in \mathbb{N}}$  zaporedje v  $\mathcal{A}$

**Definicija 1.2.** ( $\sigma$ -algebra, pod- $\sigma$ -algebra in algebra)

1.  $\mathcal{A}$  je  $\sigma$ -algebra na  $\Omega$   $\iff (\Omega, \mathcal{A})$  je merljiv prostor  $\iff \emptyset \in \mathcal{A}$  in  $\mathcal{A}$  je zaprta za  $c^\Omega$  in  $\sigma\cup$ . e je  $\mathcal{A}$   $\sigma$ -algebra na  $\Omega$  potem:  $A$  je  $\mathcal{A}$ -merljiva  $\iff A \in \mathcal{A}$ .
2.  $\mathcal{B}$  je pod- $\sigma$ -algebra  $\mathcal{A}$   $\iff \mathcal{B} \subset \mathcal{A}$  in  $\mathcal{B}$  je  $\sigma$ -algebra na  $\Omega$ .
3.  $\mathcal{A}$  je algebra na  $\Omega$   $\iff \emptyset \in \mathcal{A}$  in  $\mathcal{A}$  je zaprta za  $c^\Omega$  in  $\cup$ .

**Opomba 1.3.** V primeru ko nimamo podane množice  $\Omega$  lahko vzamemo  $\Omega = \cup \mathcal{A}$  in velja  $\mathcal{A} \subset 2^\Omega$ .

**Zgled 1.4.**  $2^\Omega$  je  $\sigma$ -algebra na  $\Omega$  in  $\{\emptyset, \Omega\}$  je  $\sigma$ -algebra na  $\Omega$ . Klicemo ju diskretna in trivialna  $\sigma$ -algebra.

**Zgled 1.5.** Naj bo  $A \subset \Omega$ . Potem je  $\sigma_\Omega A := \{\emptyset, A, A^C, \Omega\}$   $\sigma$ -algebra na  $\Omega$ .

**Zgled 1.6.**  $\sigma_\Omega^{ccc} := \{A \in 2^\Omega : A \text{ je stevna ali } \Omega \setminus A \text{ je stevna}\}$  je  $\sigma$ -algebra na  $\Omega$ . To je oznaka za stevno kostevno  $\sigma$ -algebro na  $\Omega$ . Seveda je  $\sigma_\Omega^{ccc} = 2^\Omega$  razen če  $\Omega$  ni stevna.

**Zgled 1.7.** Naj bo  $\mathcal{P}$  particija  $\Omega$  (torej  $\mathcal{P} \subset 2^\Omega$  in  $\mathcal{P}$  je družina paroma disjunktnih množic, ki pokrije  $\Omega$ ). Potem je  $\sigma\mathcal{P} := \{\cup R \mid R \subset \mathcal{P} \text{ in } (R \text{ ali } \mathcal{P} \setminus R \text{ je stevna})\}$  je sigma algebra na  $\Omega$ .

**Trditev 1.8.** Naj bo  $\mathcal{A} \subset 2^\Omega$  zaprta za  $c^\Omega$  in naj bo  $\emptyset \in \mathcal{A}$ . Potem je  $\mathcal{A}$   $\sigma$ -algebra na  $\Omega$  ce in samo ce je  $\mathcal{A}$  zaprta za  $\sigma\cup$ , in v tem primeru je  $\mathcal{A}$  zaprta za  $\cap$  in  $\setminus$ .

*Dokaz.* Sledi iz de Morganovih zakonov:

$$\cap_{n \in \mathbb{N}} A_n = \Omega \setminus (\cup_{n \in \mathbb{N}} (\Omega \setminus A_n))$$

$$\cup_{n \in \mathbb{N}} A_n = \Omega \setminus (\cap_{n \in \mathbb{N}} (\Omega \setminus A_n))$$

Zaprto  $\sigma$ -algebre  $\mathcal{A}$  na  $\Omega$  za:

1.  $\cap$ :  $A \cap B = A \cap B \cap \Omega \cap \Omega \cdots \in \mathcal{A}$
2.  $\cup$ :  $A \cup B = A \cup B \cup \emptyset \cup \emptyset \cdots \in \mathcal{A}$
3.  $\setminus$ :  $A \setminus B = A \cap (\Omega \setminus B) \in \mathcal{A}$

□

### 1.1.2 Mere

**Definicija 1.9.** (Mera) Naj bo  $(\Omega, \mathcal{F})$  merljiv prostor in  $\mu : \mathcal{F} \rightarrow [0, \infty]$ .  $\mu$  je mera na  $(\Omega, \mathcal{F})$  natanko tedaj ko:

1.  $\mu(\emptyset) = 0$
2.  $\mu$  je stevno aditivna: za  $\forall$  zaporedje  $(A_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathcal{F}$  paroma disjunktne množice je  $\mu(\cup_{n \in \mathbb{N}} A_n) = \sum_{n \in \mathbb{N}} \mu(A_n)$

Za mero  $\mu$  na  $(\Omega, \mathcal{F})$  recemo da je:

1. končna  $\iff \mu(\Omega) < \infty$
2. verjetnostna mera  $\iff \mu(\Omega) = 1$
3.  $\sigma$ -končna  $\iff \exists (A_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathcal{F} : \Omega = \cup_{n \in \mathbb{N}} A_n$  in  $\mu(A_n) < \infty \forall n \in \mathbb{N}$

**Definicija 1.10.** (Merljiv prostor)  $(\Omega, \mathcal{F}, \mu)$  je prostor z mero  $\iff \mu$  je mera na  $(\Omega, \mathcal{F})$

**Definicija 1.11.** Če je  $(\Omega, \mathcal{F}, \mu)$  merljiv prostor. Potem za  $A \in \mathcal{F}$  recemo:

1.  $A$  je  $\mu$ -zanemarljiva  $\iff \mu(A) = 0$
2.  $A$  je  $\mu$ -trivialna  $\iff \mu(A) = 0$  ali  $\mu(\Omega \setminus A) = 0$

Ce imamo neko lastnost  $P(\omega)$  v  $\omega \in A$ , potem:

1.  $P(\omega)$  drži  $\mu$ -skoraj povsod v  $\omega \in A$   $\iff A_{\neg P} := \{\omega \in A : \neg P(\omega)\}$  je  $\mu$ -zanemarljiva.
2.  $P(\omega)$  drži  $\mu$ -skoraj gotovo v  $\omega \in A$   $\iff A_{\neg P} := \{\omega \in A : \neg P(\omega)\}$  je  $\mu$ -zanemarljiva in  $\mu$  je verjetnost.
3.  $P$  drži  $\mu$ -s.p. na  $A$   $\iff P(\omega)$  drži  $\mu$ -s.p. v  $\omega \in A$ .
4.  $P$  drži  $\mu$ -s.g. na  $A$   $\iff P(\omega)$  drži  $\mu$ -s.g. v  $\omega \in A$ .

**Zgled 1.12.** Nicelna mera na  $\mathcal{F}$  (torej preslikava  $\mu(A) \rightarrow 0, \forall A \in \mathcal{F}$ ) je vedno mera na katerikoli  $\sigma$ -algebri.

**Zgled 1.13.** Če definiramo  $c_\Omega : 2^\Omega \rightarrow [0, \infty]$  kot  $c_\Omega(A) := |A|$  če je  $A$  končna podmnožica  $\Omega$  in  $c_\Omega(A) := \infty$  če je neskončna podmnožica  $\Omega$ , je  $c_\Omega$  tako imenovana stevna mera na  $\Omega$ . Ko je  $\Omega$  končna in neprazna, potem je  $\frac{c_\Omega}{|\Omega|}$  verjetnostna mera na  $\Omega$ .

**Zgled 1.14.** Če definiramo  $\delta_x : 2^\Omega \rightarrow [0, \infty]$  za fiksen  $x \in \Omega$ , tako da za  $A \in 2^\Omega, \delta_x(A) := 0$  če  $x \notin A$  in  $\delta_x(A) := 1$  če  $x \in A$ , potem je  $\delta_x$  tako imenovana Diracova mera za  $x$ . Katerakoli podmnožica  $\Omega \setminus \{x\}$  je  $\delta_x$ -zanemarljiva.

**Trditev 1.15.** (Lastnosti mere) Naj bo  $\mu$  mera na merljivem prostoru  $(\Omega, \mathcal{F})$ . Potem velja naslednje:

1.  $\mu$  je aditivna:  $\mu(A \cup B) = \mu(A) + \mu(B)$  kadarkoli  $A \cap B = \emptyset$  in  $\{A, B\} \in \mathcal{F}$ .
2.  $\mu$  je monotona:  $A \subset B$  in  $\{A, B\} \in \mathcal{F} \Rightarrow \mu(A) \leq \mu(B)$ .
3.  $\mu$  je zvezna od spodaj:  $\mu(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n) = \uparrow \text{-}\lim_{n \rightarrow \infty} \mu(A_n)$  kadarkoli je  $(A_n)_{n \in \mathbb{N}}$  narasčajoče zaporedje v  $\mathcal{F}$ .
4.  $\mu$  je stevno subaditivna:  $\mu(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n) \leq \sum_{n \in \mathbb{N}} \mu(A_n)$  kadarkoli je  $(A_n)_{n \in \mathbb{N}}$  zaporedje v  $\mathcal{F}$ .
5. Predpostavimo da je  $\mu$  končna.  $\mu(\Omega \setminus A) = \mu(\Omega) - \mu(A)$  za vse  $A \in \mathcal{F}$ . Se vec,  $\mu$  je zvezna od zgoraj:  $\mu(\bigcap_{n \in \mathbb{N}} A_n) = \downarrow \text{-}\lim_{n \rightarrow \infty} \mu(A_n)$  kadarkoli je  $(A_n)_{n \in \mathbb{N}}$  padajoče zaporedje v  $\mathcal{F}$ .
6. Za  $A \in \mathcal{F}$  je  $\mathcal{F}|_A := \{B \cap A : B \in \mathcal{F}\}$ ; potem je  $\mu_A := \mu|_{\mathcal{F}|_A}$  mera na  $\mathcal{F}|_A$ . Imenuje se restrikcija/skrcitev mere  $\mu$  na  $A$ .

*Dokaz.* 1.  $(A, B, \emptyset, \emptyset, \dots)$  je zaporedje medseboj disjunktne množice v  $\mathcal{F}$ , torej po stevni aditivnosti velja  $\mu(A \cup B \cup \emptyset \cup \dots) = \mu(A) + \mu(B) + \mu(\emptyset) + \dots = \mu(A) + \mu(B)$ .

2.  $B = A \cup (B \setminus A)$  in uporabimo končno aditivnost (1.).

3.  $(A_1, A_2 \setminus A_1, A_3 \setminus A_2, \dots)$  je zaporedje paroma disjunktne množice v  $\mathcal{F}$  z unijo  $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n$ . Uporabimo stevno aditivnost in za tem se končno aditivnost.

4.  $(A_1, A_2 \setminus A_1, A_3 \setminus (A_1 \cup A_2), \dots)$  je zaporedje paroma disjunktne množice v  $\mathcal{F}$  z unijo  $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n$ . Uporabimo stevno aditivnost in za tem se monotonost (2.).

5. Prvi del sledi iz končne aditivnosti (1.). Za množici vzamemo  $A \in \Omega$  in  $B = \Omega \setminus A$ . Dobimo  $\mu(\Omega) = \mu(A) + \mu(\Omega \setminus A)$ . Drugi del sledi iz zveznosti od spodaj (3.) tako da jo uporabimo na  $(\Omega \setminus A_n)_{n \in \mathbb{N}}$ .  $\mu(\Omega) - \mu(\bigcap_{n \in \mathbb{N}} A_n) = \mu(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} \Omega \setminus A_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mu(\Omega \setminus A_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} (\mu(\Omega) - \mu(A_n)) = \mu(\Omega) - \lim_{n \rightarrow \infty} \mu(A_n) \Rightarrow \mu(\bigcap_{n \in \mathbb{N}} A_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mu(A_n)$ .

6. Preveriti moramo, da je  $\mathcal{F}|_A$   $\sigma$ -algebra na  $A$ . Kasneje bomo videli da je  $\mathcal{F}|_A = 2^A \cap \mathcal{F}$  in bo dokaz sledil iz tega.  $\square$

**Zgled 1.16.** (Borel-Cantellijeva lema) Naj bo  $(\Omega, \mathcal{F}, \mu)$  merljiv prostor in  $(A_n)_{n \in \mathbb{N}}$  zaporedje v  $\mathcal{F}$ , da velja  $\sum_{n \in \mathbb{N}} \mu(A_n) < \infty$ . Potem je  $\mu(\limsup_{n \rightarrow \infty} A_n) = 0$ .

*Dokaz.*  $\square$

**Zgled 1.17.** Če je  $P$  vejretnost na  $(\Omega, \mathcal{F})$ , potem je  $P^{-1}(\{0, 1\})$  pod- $\sigma$ -algebra na  $\mathcal{F}$ . Tako imenovana  $P$ -trivialna  $\sigma$ -algebra.

### 1.1.3 Merjlive preslikave in generirane $\sigma$ -algebre

**Definicija 1.18.** (Generirana  $\sigma$ -algebra) Naj bo  $\mathcal{A} \subset 2^\Omega$ ; potem

$$\sigma_\Omega(\mathcal{A}) := \cap \{ \mathcal{F} \in 2^{2^\Omega} : \mathcal{F} \text{ je } \sigma\text{-algebra na } \Omega \text{ in } \mathcal{A} \subset \mathcal{F} \}$$

imenujemo  $\sigma$ -algebra generirana na  $\Omega$  z  $\mathcal{A}$ . Je najmanjša  $\sigma$ -algebra, ki vključuje družino podmnožic  $\mathcal{A}$ .

**Opomba 1.19.**  $2^\Omega$  je gotovo  $\sigma$ -algebra na  $\Omega$ , ki vsebuje  $\mathcal{A}$ , torej je  $\sigma_\Omega(\mathcal{A})$  neprazna.

Za dve  $\sigma$ -algebri  $\mathcal{B}_1$  in  $\mathcal{B}_2$  na  $\Omega$  je množica  $\mathcal{B}_1 \vee \mathcal{B}_2 := \sigma_\Omega(\mathcal{B}_1 \cup \mathcal{B}_2)$  skupek  $\mathcal{B}_1$  in  $\mathcal{B}_2$ . Bolj splošno za družino  $(\mathcal{B}_\lambda)_{\lambda \in \Lambda}$   $\sigma$ -algeber na  $\Omega$  pravimo, da je  $\vee_{\lambda \in \Lambda} \mathcal{B}_\lambda := \sigma_\Omega(\cup_{\lambda \in \Lambda} \mathcal{B}_\lambda)$  njen skupek.

**Opomba 1.20.** Razlog zakaj so generirane  $\sigma$ -algebre pomembne v teoriji mere je, ker le redko lahko eksplicitno podamo vse elemente  $\sigma$ -algebre, ki bi jo zeleli, ampak pogosto lahko eksplicitno podamo njene generatorje.

**Definicija 1.21.** (Zacetna in končna struktura) Naj bo  $f : \Omega \rightarrow \Omega'$ . Za podano  $\sigma$ -algebro  $\mathcal{F}'$  na  $\Omega'$  definiramo

$$\sigma^{\mathcal{F}'}(f) := f^{-1}(\mathcal{F}') := \{f^{-1}(A') : A' \in \mathcal{F}'\},$$

zacetno strukturo za  $f$  glede na  $\mathcal{F}'$ . (oziroma  $\sigma$ -algebra generirana z  $f$  glede na  $\mathcal{F}'$ ).

Za podano  $\sigma$ -algebro  $\mathcal{F}$  na  $\Omega$  definiramo

$$\sigma_{\mathcal{F}}^{\Omega'}(f) := \{A' \in 2^{\Omega'} : f^{-1}(A') \in \mathcal{F}\},$$

končno strukturo za  $f$  na  $\Omega'$  glede na  $\mathcal{F}$ .

**Definicija 1.22.** Za dano  $\sigma$ -algebro  $\mathcal{F}'$  na  $\Omega'$  in  $\sigma$ -algebro  $\mathcal{F}$  na  $\Omega$  pravimo da je  $f : \Omega \rightarrow \Omega'$   $\mathcal{F}/\mathcal{F}'$ -merljiva preslikava  $\iff f^{-1}(A') \in \mathcal{F}$  za vse  $A' \in \mathcal{F}'$ .

**Opomba 1.23.** 1. V notacijah  $\sigma_\Omega(\mathcal{A})$  in  $\sigma^{\mathcal{F}'}(f)$  spuscamo  $\Omega$  in  $\mathcal{F}'$  kadar je to jasno iz konteksta. Torej pisemo preprosto  $\sigma(\mathcal{A})$  in  $\sigma(f)$ .

2. V primeru ko je zaloga vrednosti  $f$  stevna in nimamo podane ne  $\mathcal{F}'$  ali  $\Omega'$  za  $\Omega'$  vazamemo  $Z_f$  in za  $\mathcal{F}'$  vazamemo  $2^{\Omega'}$ .

3. Izmed objektov, ki smo ju uvedli v definiciji 7. je zacetna struktura bolj sugestivna.

**Definicija 1.24.** Za dano  $\sigma$ -algebro  $\mathcal{F}$  na  $\Omega$  in  $\mathcal{F}'$  na  $\Omega'$  definiramo

$$\mathcal{F}/\mathcal{F}' := \{g \in \Omega^\Omega : g \text{ je } \mathcal{F}/\mathcal{F}'\text{-merljiva}\}.$$

**Zgled 1.25.** Konstantna funkcija je vedno merljiva, ne glede na  $\sigma$ -algebro. Za poljubno  $\sigma$ -algebro  $\mathcal{F}$  na  $\Omega$  je  $id_\Omega \in \mathcal{F}/\mathcal{F}'$ .

**Definicija 1.26.** (Indikator) Za  $A \subset \Omega$  definiramo  $\mathbb{1}_{A_\Omega} : \Omega \rightarrow \{0, 1\}$ :

$$\mathbb{1}_{A_\Omega}(x) := \begin{cases} 1, & x \in A \\ 0, & \text{sicer} \end{cases}$$

Funkciji pravimo indikator množice  $A$  v  $\Omega$ . Pisali bomo  $\mathbb{1}_A$  in predvidevali da se  $\Omega$  da razbrati iz konteksta.

**Zgled 1.27.** Naj bo  $A \subset \Omega$ . Potem  $\sigma^{2^{\{0,1\}}}(\mathbb{1}_A) = \sigma_\Omega(A) = \{\emptyset, \Omega, A, \Omega \setminus A\}$ . Če je nadaljno  $\mathcal{F}$   $\sigma$ -algebra an  $\Omega$  potem je  $\mathbb{1}_A \in \mathcal{F}/2^{\{0,1\}} \iff A \in \mathcal{F}$

**Trditev 1.28.** Naj bodo  $\mathcal{F}, \mathcal{G}, \mathcal{H}$   $\sigma$ -algebre (vsaka na svoji množici). Naj bo  $f \in \mathcal{F}/\mathcal{G}$  in  $g \in \mathcal{G}/\mathcal{H}$ . Potem je  $g \circ f \in \mathcal{F}/\mathcal{H}$ . Z besedami to pomeni: kompozitumi merljivih preslikav so merljive preslikave.

*Dokaz.*  $(g \circ f)^{-1}(H) = f^{-1}(g^{-1}(H))$  za  $\forall H \in \mathcal{H}$  □

**Trditev 1.29.** (Lastnosti preslikav) Naj bo  $f : \Omega \rightarrow \Omega'$ .

1. Naj bo  $\mathcal{F}'$   $\sigma$ -algebra na  $\Omega'$ .  $\sigma^{\mathcal{F}'}(f)$  je  $\sigma$ -algebra na  $\Omega$ ; je najmanjša  $\sigma$ -algebra  $\mathcal{F}$  na  $\Omega$  da velja  $f \in \mathcal{F}/\mathcal{F}'$ .
2. Naj bo  $\mathcal{F}$   $\sigma$ -algebra na  $\Omega$ .  $\sigma_{\mathcal{F}}^{\Omega'}(f)$  je  $\sigma$ -algebra na  $\Omega'$ ; je največja  $\sigma$ -algebra  $\mathcal{F}'$  na  $\Omega'$  da velja  $f \in \mathcal{F}/\mathcal{F}'$ .
3. Naj bo  $\mathcal{F}'$   $\sigma$ -algebra na  $\Omega'$  in  $\mathcal{F}$   $\sigma$ -algebra na  $\Omega$ , potem  $f \in \mathcal{F}/\mathcal{F}' \iff \sigma^{\mathcal{F}'}(f) \subset \mathcal{F} \iff \sigma_{\mathcal{F}}^{\Omega'}(f) \supset \mathcal{F}'$ .
4. Naj bo  $\mathcal{A}' \subset 2^{\Omega'}$ .  $\sigma_{\Omega'}(\mathcal{A}')$  je najmanjša  $\sigma$ -algebra na  $\Omega'$ , ki ima  $\mathcal{A}'$  za svojo podmnožico. Naj bo  $\mathcal{F}$   $\sigma$ -algebra na  $\Omega$ , potem je  $f \in \mathcal{F}/\sigma_{\Omega'}(\mathcal{A}') \iff (f^{-1}(A') \in \mathcal{F} \text{ za vse } A' \in \mathcal{A}')$ . Natancno zapisemo  $\sigma^{\sigma_{\Omega'}(\mathcal{A}')} (f) = \sigma_\Omega(\{f^{-1}(A') : A' \in \mathcal{A}'\})$ . V posebnem je  $f^{-1}(\sigma_{\Omega'}(\mathcal{A}')) = \sigma_\Omega(f^{-1}(\mathcal{A}'))$ .

*Dokaz.* 1.  $f^{-1}(\mathcal{F}')$  je  $\sigma$ -algebra na  $\Omega$ :  $\forall \emptyset : f^{-1}(\emptyset) \in f^{-1}(\mathcal{F}')$ ; za  $A' \in \mathcal{F}'$  je  $\Omega \setminus f^{-1}(A') = f^{-1}(\Omega \setminus A') \in f^{-1}\mathcal{F}'$ ; za zaporedje  $(A_i)_{i \in \mathbb{N}}$  je  $\cup_{i \in \mathbb{N}} f^{-1}(A'_i) = f^{-1}(\cup_{i \in \mathbb{N}} A'_i) \in f^{-1}(\mathcal{F}')$ . Drugi del je jasen

2. Podoben dokaz kot 1.

3. krneki

4. prvi del je jasen. Drugi del:  $(\Rightarrow)$  : je jasna.  $(\Leftarrow)$  :  $\sigma_{\mathcal{F}}^{\Omega'}(f) \subset A' \dots$  napisi s skripte.

□

**Opomba 1.30.** Tocka 4 nam pove da je dovolj da dokazemo merljivo lastnost na množici generatorjev. Se en način zapisa  $f \in \mathcal{F}/\sigma_{\Omega'}(\mathcal{A}') \iff (f^{-1}(A') \in \mathcal{F})$  za vse  $A' \in \mathcal{A}'$ . Natančno zapisemo  $\sigma^{\sigma_{\Omega'}(\mathcal{A}')}_{\Omega'}(f) = \sigma_{\Omega}(\{f^{-1}(A') : A' \in \mathcal{A}'\})$  je  $f^{-1}(\sigma_{\Omega'}(\mathcal{A}')) = \sigma_{\Omega}(f^{-1}(\mathcal{A}'))$ , kar bomo interpretirali kot operacija dobivanja preslik in generiranih  $\sigma$ -algeber komutirati.

**Definicija 1.31.** Pisemo  $\mathcal{A}|_A := \{A' \cap A : A' \in \mathcal{A}\}$  za sled  $\mathcal{A}$  na  $A$ .

**Opomba 1.32.** Če je  $\mathcal{F}$  zaprta za  $\cap$  in  $A \in \mathcal{F}$ , potem je  $\mathcal{F}|_A = \mathcal{F} \cap 2^A$ .

**Posledica 1.33.** Naj bo  $\mathcal{A} \subset 2^{\Omega}$ . Če je  $A \subset \Omega$ , potem

$$\sigma_{\Omega}(\mathcal{A})|_A = \sigma_A(\mathcal{A}|_A);$$

v primeru če je  $\mathcal{A}$   $\sigma$ -algebra na  $\Omega$ , potem je  $\mathcal{A}|_A$   $\sigma$ -algebra na  $A$ .

*Dokaz.* Po prejšnji trditvi (1. točka) je  $\sigma_{\Omega}(\mathcal{A})|_A = \sigma^{\sigma_{\Omega}(\mathcal{A})}_{\Omega}(id_A)$   $\sigma$ -algebra na  $A$  ki vsebuje  $\mathcal{A}|_A$ , torej velja  $\sigma_A(\mathcal{A}|_A) \subset \sigma_{\Omega}(\mathcal{A})|_A$ . Po (2.točki) je  $\mathcal{C} := \{C \in 2^{\Omega} : C \cap A \in \sigma_A(\mathcal{A}|_A)\} = \sigma^{\sigma_{\Omega}(\mathcal{A})}_{\Omega}(id_A)$   $\sigma$ -algebra na  $\Omega$ , ki vsebuje  $\mathcal{A}$ , torej  $\sigma_{\Omega}(\mathcal{A}) \subset \mathcal{C}$ , torej  $\sigma_{\Omega}(\mathcal{A})|_A \subset \sigma_A(\mathcal{A}|_A)$ .

□

**Zgled 1.34.** Prepricaj se da je v zgledu 1.3  $\sigma_{\Omega}A = \sigma_{\Omega}(\{A\})$ .

**Zgled 1.35.**

**Zgled 1.36.** ...

**Opomba 1.37.** Kako lahko v splošnem določimo  $\sigma_{\Omega}(\mathcal{A})$ ? Začnemo z  $\mathcal{A}$  karkoli kar mora biti v  $\sigma_{\Omega}(\mathcal{A})$  da zadosca pogojem  $\sigma$ -algebre, vse komplemente, stevne unije,  $\emptyset$ ,  $\Omega$  in stevne unije teh itd. Po tem postopku dokazemo, da je to kar imamo  $\sigma$ -algebra.

**Zgled 1.38.** Naj bosta  $\{E, F\} \subset 2^{\Omega}$ . Potem mora  $\sigma_{\Omega}(\{E, F\})$  vsebovati  $\{\emptyset, E, F, E \setminus F, E \cap F, \dots\}$  oziroma tako imenovano particijo  $\mathcal{P} := \{E \cap\}$