

★ 小小孩**NEC**注意事項：

賴慧卿主任

.**準備期**：查看電腦是否有A-line、呼吸器設定、其他用藥。

- 1.備L/R 500ml + LV set + 3way + TCI 200cm
(接週邊IV line，原則上ICU會留24# IV lock)
- 2.備N/S 500ml + PP Kit 1 + Pressure bag
(接A-line，抽血Flush用)
- 3.備N/S 50 ml + Ext 60cm +3way *2個+

Syringe pump

(接Hickman，輸血用)

- 4.視情況備Dopamine 2X 50ml + Syringe

pump

(接PICC，雙人核對劑量，絕對避免錯誤)

- 5.直接領血PRBC 1 u (照光、減白)，FFP 1u
領血後抽50ml，接N/S syringe pump (接

Hickman)

.**手術期**：A - 聽診呼吸音、抽痰，注意Endo不可滑脫

B - 注意Tidal volume及Air way pressure

C - 注意血壓

D - 外科先On Hickman，打好後給予外科TCI
200cm及

T-conect，外科排氣後，會將另一端
交給麻醉，請接

在N/S Ext 60cm Syringe pump

L/R 20-25 ml/kg/hr

PRBC 20-30 ml/kg，FFP 20 ml/kg

Ca⁺⁺ 1-2 ml/kg，加N/S稀釋2倍，由Hickman

給予

Dopamine 依血壓 2-10 mcg/kg/min

給予抗生素前，請確認藥名、劑量、滴注

速度

