

Problemario de Cálculo

Andrés Fabián Leal Archila
anfalear@correo.uis.edu.co
Escuela de Matemáticas
Universidad Industrial de Santander
aleal214@unab.edu.co
Departamento de Ciencias Básicas
Universidad Autónoma de Bucaramanga

Última actualización: 3 de mayo de 2026

“Si he visto más, es poniéndome sobre los hombros de Gigantes”
Isaac Newton.

Prefacio a la primera edición

Este documento proporciona preparación para exámenes, talleres y quices de Cálculo I, II y III, presentando problemas prácticos y sus soluciones extraídas de diversas fuentes bibliográficas.

El documento inicia con las políticas del curso, contenidos, evaluación y contacto. Cada capítulo incluye secciones con resumen teórico, problemas resueltos y ejercicios de práctica. Al final se proponen rutinas de programación en Python 3.x, Wolfram Alpha, www.matrixcalc.org/es y GeoGebra.

Este material está en construcción continua, por lo que algunos ejercicios pueden carecer de solución o presentar errores que se corregirán progresivamente.

Espero que este documento contribuya a su proceso de aprendizaje.

Cordialmente,
Andrés Fabián Leal Archila
Docente Escuela de Matemáticas
Universidad Industrial de Santander
Correo: anfalear@correo.uis.edu.co
Docente Departamento de Ciencias Básicas
Universidad Autónoma de Bucaramanga
Correo: aleal214@unab.edu.co

Contenido

Prefacio a la primera edición	3
1 Políticas del curso	21
1.1 Contenido del curso	21
1.2 Políticas de clase	23
2 Preliminares	25
2.1 Números reales	25
2.1.1 Propiedades de los números reales	25
2.1.2 Valor absoluto de los números reales	26
2.1.3 Magnitudes variables y constantes e intervalos de variación	27
2.1.4 Problemas propuestos	29
3 Funciones	31
3.1 Propiedades básicas	31
3.2 Funciones elementales fundamentales	36
3.3 Transformaciones de funciones	41
3.4 Funciones inversas	43
3.5 Operaciones con logaritmos y exponenciales naturales	47
3.6 Ejercicios del capítulo	47
4 Límites y Continuidad	53
4.1 Definición Formal: Épsilon-Delta	54
4.2 Propiedades Algebraicas de los Límites	55
4.3 El Teorema del Encaje	56
4.4 Límites Infinitos y en el Infinito	57
4.5 Continuidad	58
4.6 El Teorema del Valor Intermedio	58
4.7 Infinitesimales Equivalentes	59
4.8 Problemas Propuestos	61
5 La Derivada	65
5.1 Reglas Algebraicas de Derivación	67
5.2 Derivadas de las Funciones Trigonométricas	68
5.3 Regla de la Cadena	68
5.4 Derivadas de Funciones Exponenciales y Logarítmicas	70
5.5 Derivadas de Orden Superior	70
5.6 Derivación Implícita	71
5.7 Derivación Logarítmica	74
5.8 Derivadas de las Funciones Trigonométricas Inversas	75
5.9 Problemas Propuestos	76
6 Aplicaciones de la Derivada	83
6.1 Razones de Cambio Relacionadas	83
6.2 Valores Extremos	86
6.3 Trazado Sistemático de Curvas	91
6.4 Optimización	93
6.5 El Teorema del Valor Medio	96

6.6	Regla de L'Hôpital	98
6.7	Métodos Numéricos para la Localización de Raíces	100
6.7.1	Bisección	101
6.7.2	Método de Newton-Raphson	101
6.7.3	Método de Punto Fijo	102
6.8	Problemas Propuestos	102
6.8.1	Razones de cambio relacionadas	103
6.8.2	Valores extremos y trazado de curvas	104
6.8.3	Optimización	106
6.8.4	Teorema del Valor Medio	108
6.8.5	Regla de L'Hôpital	108
6.8.6	Métodos numéricos para la localización de raíces	109
7	Integrales indefinidas y técnicas de integración	111
7.1	Sustitución Simple	113
7.1.1	Fundamento teórico	113
7.1.2	Sustitución en integrales definidas	114
7.1.3	Ejemplos	114
7.2	Integración por Partes	115
7.2.1	Fundamento teórico	115
7.2.2	La regla LIATE	116
7.2.3	Ejemplos	116
7.3	Identidades Trigonómicas Esenciales	118
7.4	Integración de Potencias Trigonómicas	119
7.4.1	Integrales de la forma $\int \sin^m x \cos^n x \, dx$	119
7.4.2	Integrales de la forma $\int \tan^m x \sec^n x \, dx$	120
7.4.3	Integrales de productos $\sin(mx) \cos(nx)$, $\sin(mx) \sin(nx)$, $\cos(mx) \cos(nx)$	121
7.5	Sustitución Trigonómica	121
7.5.1	Idea geométrica y fundamento	121
7.5.2	Caso 1: Radical $\sqrt{a^2 - u^2}$	122
7.5.3	Caso 2: Radical $\sqrt{a^2 + u^2}$	122
7.5.4	Caso 3: Radical $\sqrt{u^2 - a^2}$	123
7.5.5	Tabla resumen de sustituciones	124
7.6	Integración por Fracciones Parciales	124
7.6.1	Fundamento algebraico	124
7.6.2	Procedimiento	124
7.6.3	Casos de descomposición	125
7.6.4	Fórmulas de integración para cada fracción	125
7.6.5	Ejemplos	125
7.7	Ejercicios propuestos	127
8	La Integral Definida	131
8.1	Antecedentes Históricos: De Arquímedes a Leibniz	131
8.2	Notación Sigma y Fórmulas de Sumatorias	132
8.3	Sumas de Riemann	132
8.4	La Integral Definida	133
8.5	Propiedades de la Integral Definida	134
8.6	Los Teoremas Fundamentales del Cálculo	135
8.6.1	Primer Teorema Fundamental	135
8.6.2	Segundo Teorema Fundamental	136
8.7	Teorema del Valor Medio para Integrales	137
9	Aplicaciones de la integral	139
9.1	Cálculo de áreas de regiones planas	140
9.2	Volúmenes de sólidos de revolución	144

9.2.1	Método de los discos	144
9.2.2	Método de las arandelas (<i>washers</i>)	145
9.2.3	Método de los cascarones cilíndricos (<i>shells</i>)	147
9.3	Longitud de arco	149
9.4	Áreas de superficies de revolución	151
9.5	Aplicaciones físicas	153
9.5.1	Trabajo mecánico	153
9.5.2	Centro de masa y centroide	155
9.5.3	Momento de inercia	157
9.6	Presión y fuerza hidrostática	158
9.7	Problemas propuestos	159
10	Integrales Impropias	163
10.1	Funciones de densidad de probabilidad	165
10.2	Integrandos no acotados y discontinuidades	169
10.3	La paradoja de la trompeta de Gabriel	171
10.4	Problemas Propuestos	173
10.4.1	Integrales Impropias de Tipo I	173
10.4.2	Integrales Impropias de Tipo II	174
10.4.3	Integrales con Doble Singularidad	174
10.4.4	Integral de Tipo p y Criterios de Comparación	175
10.4.5	Aplicaciones de las Integrales Impropias	176
11	Curvas Paramétricas y Coordenadas Polares	179
11.1	Representación Paramétrica de Curvas	179
11.2	Cálculo para Curvas Definidas Paramétricamente	180
11.2.1	Longitud de arco paramétrica	182
11.3	Sistema de Coordenadas Polares	185
11.3.1	Área en coordenadas polares	188
11.3.2	Longitud de arco en coordenadas polares	190
11.4	Problemas propuestos	192
12	Sucesiones y series de números	195
12.1	Sucesiones de números reales	195
12.1.1	Monotonía, acotación y convergencia	196
12.1.2	Complejitud y compacidad	197
12.1.3	Límites fundamentales y herramientas de cálculo	197
12.1.4	Infinitesimales equivalentes	198
12.2	Series de números reales	199
12.2.1	Series clásicas	199
12.3	Criterios de convergencia para series de términos positivos	200
12.4	Convergencia absoluta y series de signo variable	202
12.5	Propiedades estructurales y operaciones con series	203
12.6	Criterios de refinamiento	203
13	Sucesiones y series de funciones	205
13.1	Sucesiones de funciones	205
13.2	Series de funciones	207
13.3	Series de potencias	208
13.4	Complementos avanzados	209
	Bibliografía	211

Glosario

2.1	Teorema (Propiedad de tricotomía)	25
2.2	Teorema	26
2.3	Ejemplo	26
2.4	Definición (Valor absoluto)	26
2.5	Ejemplo	27
2.6	Teorema (Propiedades del valor absoluto)	27
2.7	Definición (Intervalos)	28
2.8	Ejemplo	28
2.9	Definición (Vecindad)	28
2.10	Problema	29
3.1	Definición (Función)	31
3.2	Problema	31
3.3	Observación (Formas de representar una función)	32
3.4	Ejemplo	32
3.5	Observación (Prueba de la recta vertical)	33
3.6	Definición (Funciones crecientes y decrecientes)	34
3.7	Ejemplo	34
3.8	Ejemplo (Función definida por partes)	34
3.9	Definición (Funciones pares e impares)	35
3.10	Ejemplo	35
3.11	Definición (Función potencia)	36
3.12	Ejemplo (Ejemplos de funciones potencia elementales)	36
3.13	Definición (Función exponencial)	37
3.14	Ejemplo (Ejemplos de funciones exponenciales)	37
3.15	Definición (Función logarítmica)	38
3.16	Ejemplo (Funciones logarítmicas elementales)	38
3.17	Definición (Función periódica)	38
3.18	Observación	38
3.19	Definición (Funciones trigonométricas fundamentales)	38
3.20	Ejemplo (Gráficas de las funciones trigonométricas fundamentales)	39
3.21	Definición (Función compuesta)	39
3.22	Ejemplo	39
3.23	Observación (Composiciones múltiples)	40
3.24	Definición (Función elemental)	40
3.25	Definición (Función algebraica)	41
3.26	Definición (Función lineal)	41
3.27	Definición (Función polinómica)	41
3.28	Definición (Función racional)	41
3.29	Definición (Función irracional)	41
3.30	Definición (Función inyectiva)	43
3.31	Observación (Prueba de la recta horizontal)	43
3.32	Definición (Función inversa)	44
3.33	Observación	44
3.34	Ejemplo	44
3.35	Definición (Funciones trigonométricas inversas)	45
3.36	Teorema (Leyes de los exponentes)	47
3.37	Teorema (Leyes de los logaritmos)	47

3.38	Definición (Función logaritmo natural)	47
3.39	Teorema (Cambio de base a logaritmos naturales)	47
3.40	Problema	47
3.41	Problema	48
3.42	Problema	50
3.43	Problema	50
3.44	Problema	50
3.45	Problema	50
3.46	Problema	50
3.47	Problema	50
3.48	Problema	50
3.49	Problema	51
3.50	Problema	51
4.1	Observación	53
4.2	Ejemplo	53
4.3	Definición	54
4.4	Observación	54
4.5	Ejemplo	54
4.6	Teorema (Unicidad del límite)	54
4.7	Teorema (Leyes de los límites)	55
4.8	Observación	55
4.9	Definición (Límites laterales)	55
4.10	Teorema (Condición de existencia del límite bilateral)	55
4.11	Ejemplo	55
4.12	Ejemplo	56
4.13	Teorema (Del encaje o del sándwich)	56
4.14	Teorema	56
4.15	Observación	57
4.16	Definición	57
4.17	Observación	57
4.18	Definición	58
4.19	Definición	58
4.20	Observación	58
4.21	Teorema (Teorema del Valor Intermedio (TVI))	58
4.22	Corolario (Localización de ceros de Bolzano)	59
4.23	Ejemplo	59
4.24	Ejemplo	59
4.25	Definición	59
4.26	Observación	59
4.27	Teorema (Sustitución de equivalentes)	59
4.28	Observación	59
4.29	Observación	60
4.30	Ejemplo	60
4.31	Ejemplo	60
4.32	Ejemplo	60
4.33	Ejemplo	60
4.34	Problema	61
4.35	Problema	61
4.36	Problema	61
4.37	Problema	61
4.38	Problema	61
4.39	Problema	61
4.40	Problema	61
4.41	Problema	61
4.42	Problema	61
4.43	Problema	61

4.44	Problema	61
4.45	Problema	61
4.46	Problema	61
4.47	Problema	61
4.48	Problema	61
4.49	Problema	61
4.50	Problema	61
4.51	Problema	62
4.52	Problema	62
4.53	Problema	62
4.54	Problema	62
4.55	Problema	62
4.56	Problema	62
4.57	Problema	62
4.58	Problema	62
4.59	Problema	62
4.60	Problema	62
4.61	Problema	62
4.62	Problema	62
4.63	Problema	62
4.64	Problema	62
4.65	Problema	62
4.66	Problema	62
4.67	Problema	62
4.68	Problema	62
4.69	Problema	62
4.70	Problema	62
4.71	Problema	63
4.72	Problema	63
4.73	Problema	63
4.74	Problema	63
4.75	Problema	63
4.76	Problema (El monje tibetano)	63
4.77	Problema	63
4.78	Problema	63
4.79	Problema	63
4.80	Problema	63
4.81	Problema	63
4.82	Problema	63
5.1	Observación	65
5.2	Definición	65
5.3	Ejemplo	65
5.4	Ejemplo	66
5.5	Observación	66
5.6	Teorema	66
5.7	Observación	66
5.8	Observación	66
5.9	Teorema (Reglas fundamentales de derivación)	67
5.10	Observación	67
5.11	Ejemplo	67
5.12	Ejemplo	67
5.13	Teorema (Derivadas de las funciones trigonométricas básicas)	68
5.14	Ejemplo	68
5.15	Observación	68
5.16	Teorema (Regla de la cadena)	68
5.17	Observación	69

5.18	Observación	69
5.19	Ejemplo	69
5.20	Ejemplo	69
5.21	Ejemplo	69
5.22	Ejemplo	69
5.23	Teorema (Derivadas exponenciales y logarítmicas)	70
5.24	Ejemplo	70
5.25	Ejemplo	70
5.26	Ejemplo	70
5.27	Ejemplo	70
5.28	Definición	70
5.29	Ejemplo	71
5.30	Ejemplo	71
5.31	Teorema (Fórmula de Leibniz para el producto)	71
5.32	Observación	71
5.33	Observación	71
5.34	Ejemplo	72
5.35	Ejemplo	72
5.36	Ejemplo	72
5.37	Teorema (Derivada de la función inversa)	72
5.38	Ejemplo	73
5.39	Ejemplo	73
5.40	Observación	74
5.41	Ejemplo	74
5.42	Ejemplo	74
5.43	Ejemplo	74
5.44	Observación	75
5.45	Teorema (Derivadas de las inversas trigonométricas)	75
5.46	Ejemplo	75
5.47	Observación	75
5.48	Ejemplo	75
5.49	Ejemplo	75
5.50	Observación	76
5.51	Problema	76
5.52	Problema	77
5.53	Problema	77
5.54	Problema	77
5.55	Problema	77
5.56	Problema	77
5.57	Problema	77
5.58	Problema	77
5.59	Problema	77
5.60	Problema	77
5.61	Problema	78
5.62	Problema	78
5.63	Problema	78
5.64	Problema	78
5.65	Problema	78
5.66	Problema	78
5.67	Problema	78
5.68	Problema	78
5.69	Problema	78
5.70	Problema	78
5.71	Problema	79
5.72	Problema	79
5.73	Problema	80
5.74	Problema	80

5.75	Problema	80
5.76	Problema	80
5.77	Problema	80
5.78	Problema	81
5.79	Problema	81
5.80	Problema	81
5.81	Problema	81
5.82	Problema	81
5.83	Problema	81
5.84	Problema	81
5.85	Problema	82
5.86	Problema	82
5.87	Problema	82
6.1	Observación	83
6.2	Construcción	83
6.3	Observación	83
6.4	Ejemplo	84
6.5	Ejemplo	85
6.6	Ejemplo	85
6.7	Definición	86
6.8	Definición	86
6.9	Teorema (Teorema del Valor Extremo de Weierstrass)	86
6.10	Observación	86
6.11	Teorema (Fermat)	86
6.12	Construcción	86
6.13	Ejemplo	87
6.14	Teorema (Criterio de monotonía)	87
6.15	Ejemplo	87
6.16	Definición	88
6.17	Observación	88
6.18	Ejemplo	88
6.19	Definición	89
6.20	Teorema (Criterio de la primera derivada)	89
6.21	Teorema (Criterio de la segunda derivada)	90
6.22	Observación	90
6.23	Ejemplo	90
6.24	Construcción	91
6.25	Ejemplo	91
6.26	Construcción	93
6.27	Ejemplo	94
6.28	Ejemplo	94
6.29	Ejemplo	95
6.30	Lema (Rolle)	96
6.31	Teorema (del Valor Medio de Lagrange)	96
6.32	Ejemplo	97
6.33	Corolario	97
6.34	Observación	97
6.35	Ejemplo	97
6.36	Teorema (Regla de L'Hôpital)	98
6.37	Observación	98
6.38	Ejemplo	98
6.39	Ejemplo	99
6.40	Ejemplo	99
6.41	Ejemplo	100
6.42	Observación	101
6.43	Ejemplo	101

6.44	Ejemplo	101
6.45	Teorema (Convergencia del punto fijo)	102
6.46	Observación	102
6.47	Problema	102
6.48	Problema	103
6.49	Problema	103
6.50	Problema	103
6.51	Problema	103
6.52	Problema	103
6.53	Problema	103
6.54	Problema	103
6.55	Problema	103
6.56	Problema	103
6.57	Problema	103
6.58	Problema	103
6.59	Problema	103
6.60	Problema	104
6.61	Problema	104
6.62	Problema	104
6.63	Problema	104
6.64	Problema	104
6.65	Problema	104
6.66	Problema	105
6.67	Problema	105
6.68	Problema	105
6.69	Problema	106
6.70	Problema	106
6.71	Problema	106
6.72	Problema	106
6.73	Problema	106
6.74	Problema	106
6.75	Problema	106
6.76	Problema	106
6.77	Problema	107
6.78	Problema	107
6.79	Problema	107
6.80	Problema	107
6.81	Problema (Optimización de la longitud del cable)	107
6.82	Problema	108
6.83	Problema	108
6.84	Problema	108
6.85	Problema	108
6.86	Problema	108
6.87	Problema	108
6.88	Problema	108
6.89	Problema	108
6.90	Problema	108
6.91	Problema	109
6.92	Problema	109
6.93	Problema	109
6.94	Problema	109
6.95	Problema	109
6.96	Problema	109
7.1	Definición	111
7.2	Corolario	111
7.3	Teorema (Linealidad de la integral indefinida)	111

7.4	Teorema (Regla generalizada de la potencia)	113
7.5	Observación	113
7.6	Teorema (Regla de sustitución — integral indefinida)	114
7.7	Construcción	114
7.8	Observación	114
7.9	Teorema (Regla de sustitución — integral definida)	114
7.10	Ejemplo	114
7.11	Ejemplo	114
7.12	Ejemplo	115
7.13	Ejemplo	115
7.14	Ejemplo	115
7.15	Teorema (Fórmula de integración por partes)	115
7.16	Observación	116
7.17	Ejemplo	116
7.18	Ejemplo	116
7.19	Ejemplo	116
7.20	Ejemplo	117
7.21	Ejemplo	117
7.22	Ejemplo	117
7.23	Para notar!!!	118
7.24	Teorema (Identidades pitagóricas)	118
7.25	Teorema (Identidades de reducción de potencia y ángulo doble)	118
7.26	Teorema (Fórmulas de producto a suma)	118
7.27	Observación	119
7.28	Construcción	119
7.29	Ejemplo	119
7.30	Ejemplo	119
7.31	Teorema (Fórmulas de reducción)	120
7.32	Observación	120
7.33	Construcción	120
7.34	Ejemplo	120
7.35	Ejemplo	120
7.36	Observación	121
7.37	Ejemplo	121
7.38	Observación	122
7.39	Ejemplo	122
7.40	Ejemplo	122
7.41	Ejemplo	123
7.42	Ejemplo	123
7.43	Observación	124
7.44	Observación	124
7.45	Construcción	124
7.46	Definición	125
7.47	Ejemplo	125
7.48	Ejemplo	126
7.49	Ejemplo	126
7.50	Ejemplo	126
7.51	Ejemplo	127
7.52	Observación	127
7.53	Problema	127
7.54	Problema	128
7.55	Problema	128
7.56	Problema (Problemas de referencia — <i>Spivak, Cap. 19 y Larson</i>)	128
8.1	Observación	131
8.2	Teorema (Fórmulas de sumatorias fundamentales)	132
8.3	Observación	132

8.4	Definición	132
8.5	Observación	132
8.6	Ejemplo	133
8.7	Definición	133
8.8	Teorema (Integrabilidad de funciones continuas)	133
8.9	Observación	133
8.10	Teorema (Propiedades algebraicas)	134
8.11	Teorema (Aditividad en intervalos)	134
8.12	Teorema (Simetría para funciones pares e impares)	134
8.13	Observación	134
8.14	Teorema (Propiedad de acotamiento y comparación)	134
8.15	Ejemplo	135
8.16	Definición	135
8.17	Teorema (Primer Teorema Fundamental del Cálculo — TFC1)	135
8.18	Ejemplo	136
8.19	Ejemplo	136
8.20	Observación	136
8.21	Teorema (Segundo Teorema Fundamental del Cálculo — TFC2)	136
8.22	Ejemplo	136
8.23	Ejemplo	136
8.24	Definición	137
8.25	Teorema (Teorema del Valor Medio para Integrales)	137
8.26	Observación	137
8.27	Ejemplo	137
8.28	Teorema (Segundo Teorema del Valor Medio para Integrales)	138
8.29	Observación	138
9.1	Observación	139
9.2	Teorema (Principio unificador de las aplicaciones de la integral)	139
9.3	Observación	140
9.4	Definición (Área bajo una curva)	140
9.5	Observación	140
9.6	Ejemplo (Área entre la curva y el eje x con cambio de signo)	140
9.7	Teorema (Área entre dos curvas)	141
9.8	Ejemplo	141
9.9	Observación	142
9.10	Ejemplo	142
9.11	Definición	142
9.12	Observación	142
9.13	Ejemplo (Área con integración respecto a y)	143
9.14	Ejemplo	143
9.15	Teorema (Volumen por discos respecto al eje x)	144
9.16	Ejemplo	144
9.17	Ejemplo	145
9.18	Teorema (Volumen por arandelas)	145
9.19	Observación	145
9.20	Ejemplo	145
9.21	Ejemplo	146
9.22	Teorema (Volumen por cascarones girando respecto al eje y)	147
9.23	Observación	147
9.24	Ejemplo	147
9.25	Ejemplo	148
9.26	Definición (Longitud de una curva suave)	149
9.27	Observación	149
9.28	Ejemplo (Longitud de una parábola)	149
9.29	Ejemplo (Longitud del arco de la catenaria)	150
9.30	Definición (Área superficial de revolución respecto al eje x)	151

9.31	Observación	151
9.32	Ejemplo (Superficie de una esfera)	151
9.33	Teorema (Superficie alrededor del eje y)	152
9.34	Ejemplo (Superficie de un paraboloide)	152
9.35	Definición (Trabajo de una fuerza variable)	153
9.36	Observación	153
9.37	Ejemplo (Ley de Hooke para la longitud de un resorte)	153
9.38	Ejemplo	153
9.39	Ejemplo	154
9.40	Ejemplo	155
9.41	Definición (Momentos y centro de masa de una lámina plana)	155
9.42	Observación	156
9.43	Teorema (Teorema de Pappus para el volumen)	156
9.44	Observación	156
9.45	Ejemplo (Centroide de un triángulo rectángulo)	156
9.46	Ejemplo (Centroide de un semicírculo)	156
9.47	Definición (Momento de inercia de una lámina)	157
9.48	Observación	157
9.49	Ejemplo (Momento de inercia de una varilla (extremo))	157
9.50	Ejemplo (Momento de inercia de una varilla (centro))	158
9.51	Definición (Fuerza hidrostática sobre una placa plana)	158
9.52	Ejemplo (Fuerza hidrostática sobre una compuerta rectangular)	158
9.53	Problema	159
9.54	Problema	159
9.55	Problema	159
9.56	Problema	159
9.57	Problema	159
9.58	Problema	159
9.59	Problema	159
9.60	Problema	159
9.61	Problema	159
9.62	Problema	159
9.63	Problema	160
9.64	Problema	160
9.65	Problema	160
9.66	Problema	160
9.67	Problema	160
9.68	Problema	160
9.69	Problema	160
9.70	Problema	160
9.71	Problema	160
9.72	Problema	160
9.73	Problema	160
9.74	Problema	160
9.75	Problema	161
9.76	Problema	161
9.77	Problema	161
9.78	Problema	161
9.79	Problema	161
9.80	Problema	161
9.81	Problema	161
9.82	Problema	161
9.83	Problema	161
9.84	Problema	161
9.85	Problema	161
9.86	Problema	161
9.87	Problema	161

9.88	Problema	161
9.89	Problema	161
9.90	Problema (Desafío Putnam)	161
9.91	Problema (Geometría de Curvas)	161
9.92	Problema (Integrabilidad y Composición)	161
9.93	Problema (Aplicaciones de Densidad Variable)	162
10.1	Definición (Integral impropia con límite infinito)	163
10.2	Teorema (Criterio de convergencia)	163
10.3	Observación	163
10.4	Ejemplo (Área bajo una campana exponencial decreciente)	164
10.5	Ejemplo (Integral con límites infinitos en ambos extremos)	165
10.6	Definición (Función de densidad de probabilidad)	166
10.7	Observación	166
10.8	Ejemplo (Determinación de la constante de normalización)	166
10.9	Teorema (Media y varianza de una variable aleatoria continua)	167
10.10	Observación	167
10.11	Ejemplo (Distribución exponencial: vida útil de un sensor)	168
10.12	Definición (Integral impropia de tipo II)	169
10.13	Teorema (Convergencia con discontinuidad interior)	169
10.14	Observación	169
10.15	Ejemplo (Discontinuidad en el extremo inferior)	169
10.16	Ejemplo (Discontinuidad en un punto interior)	170
10.17	Observación (Resolución de la paradoja)	171
10.18	Ejemplo (Volumen finito y área superficial infinita de la trompeta)	172
10.19	Problema	173
10.20	Problema	173
10.21	Problema	173
10.22	Problema	174
10.23	Problema	174
10.24	Problema	174
10.25	Problema	175
10.26	Problema	175
10.27	Problema	175
10.28	Problema	175
10.29	Problema	175
10.30	Problema	176
10.31	Problema (Función Gamma)	176
10.32	Problema (Probabilidad)	176
10.33	Problema (Geometría Analítica)	176
10.34	Problema (Longitud de arco)	177
10.35	Problema (Física — Trabajo gravitacional)	177
11.1	Definición (Curva plana paramétrica)	179
11.2	Observación	179
11.3	Teorema (Derivada paramétrica)	180
11.4	Observación	180
11.5	Ejemplo (Tangente a una curva paramétrica)	180
11.6	Ejemplo (Eliminación del parámetro y área bajo el arco)	181
11.7	Teorema (Longitud de arco paramétrica)	182
11.8	Ejemplo (Circunferencia vía parámetros)	182
11.9	Ejemplo (Longitud de la cicloide)	183
11.10	Observación	184
11.11	Definición (Coordenadas polares)	185
11.12	Observación	185
11.13	Observación	185
11.14	Observación	185

11.15 Ejemplo (Galería de curvas polares notables) 185

11.16 Teorema (Área de una región polar) 188

11.17 Ejemplo (Área de un pétalo de la rosa $r = 3 \sin(3\theta)$) 188

11.18 Ejemplo (Intersección de dos cardioides y área de la región común) 189

11.19 Teorema (Longitud de arco en coordenadas polares) 190

11.20 Ejemplo (Longitud de la espiral de Arquímedes) 190

11.21 Problema 192

11.22 Problema 192

11.23 Problema 192

11.24 Problema 192

11.25 Problema 192

11.26 Problema 193

11.27 Problema 193

11.28 Problema 193

11.29 Problema 193

11.30 Problema 193

11.31 Problema 193

11.32 Problema 193

12.1 Definición (Sucesión de números reales) 195

12.2 Ejemplo (Formas de definir una sucesión) 195

12.3 Definición (Límite de una sucesión) 195

12.4 Observación 195

12.5 Teorema (Unicidad del límite) 195

12.6 Teorema (Propiedades aritméticas de los límites) 196

12.7 Teorema (Teorema del emparedado) 196

12.8 Ejemplo 196

12.9 Definición (Sucesión monótona) 196

12.10 Definición (Sucesión acotada) 196

12.11 Observación 196

12.12 Teorema (Teorema de convergencia monótona) 196

12.13 Observación 196

12.14 Ejemplo 196

12.15 Ejemplo 197

12.16 Teorema (Teorema de Bolzano-Weierstrass) 197

12.17 Observación 197

12.18 Definición (Sucesión de Cauchy) 197

12.19 Teorema (Criterio de Cauchy) 197

12.20 Observación 197

12.21 Ejemplo (Límites fundamentales) 197

12.22 Observación 197

12.23 Teorema (Teorema de Stolz-Cesàro) 198

12.24 Observación 198

12.25 Ejemplo (Potencias y Stolz-Cesàro) 198

12.26 Ejemplo (Logaritmo del factorial) 198

12.27 Definición (Infinitesimales equivalentes) 198

12.28 Ejemplo 198

12.29 Observación 198

12.30 Definición (Serie numérica) 199

12.31 Definición (Sumas parciales y convergencia) 199

12.32 Observación 199

12.33 Teorema (Criterio del término n -ésimo) 199

12.34 Observación 199

12.35 Ejemplo (Serie armónica) 199

12.36 Teorema (Serie geométrica) 199

12.37 Ejemplo 199

12.38 Teorema (Series p) 200

12.39	Observación	200
12.40	Ejemplo (Serie telescópica)	200
12.41	Ejemplo	200
12.42	Observación	200
12.43	Teorema (Criterio de la integral)	200
12.44	Observación	200
12.45	Ejemplo	200
12.46	Teorema (Criterios de comparación)	201
12.47	Ejemplo	201
12.48	Ejemplo	201
12.49	Teorema (Criterio del cociente — D’Alembert)	201
12.50	Ejemplo	201
12.51	Ejemplo	201
12.52	Teorema (Criterio de la raíz — Cauchy)	201
12.53	Ejemplo	201
12.54	Observación	202
12.55	Teorema (Criterio de condensación de Cauchy)	202
12.56	Ejemplo	202
12.57	Definición (Convergencia absoluta y condicional)	202
12.58	Teorema (Criterio de Leibniz para series alternadas)	202
12.59	Ejemplo	202
12.60	Ejemplo	202
12.61	Teorema (Criterios de Dirichlet y Abel)	202
12.62	Ejemplo	202
12.63	Teorema (Propiedad asociativa)	203
12.64	Teorema (Teorema de reordenamiento de Riemann)	203
12.65	Observación	203
12.66	Definición (Producto de Cauchy)	203
12.67	Teorema (Criterio de Raabe)	203
12.68	Teorema (Criterio de Bertrand)	203
12.69	Teorema (Criterio de Kummer)	203
12.70	Observación	203
13.1	Definición (Sucesión de funciones)	205
13.2	Definición (Convergencia puntual y uniforme)	205
13.3	Observación	205
13.4	Ejemplo (Convergencia puntual sin uniforme: $f_n(x) = x^n$)	205
13.5	Ejemplo (Convergencia uniforme)	206
13.6	Ejemplo (Desplazamiento del máximo)	206
13.7	Teorema (Criterio de Cauchy para convergencia uniforme)	206
13.8	Teorema (Propiedades de la convergencia uniforme)	206
13.9	Observación	206
13.10	Ejemplo (Intercambio inválido de derivada y límite)	206
13.11	Teorema (Teorema de Dini)	206
13.12	Observación	206
13.13	Teorema (Teorema de aproximación de Weierstrass)	206
13.14	Observación	206
13.15	Definición (Serie de funciones)	207
13.16	Teorema (Prueba M de Weierstrass)	207
13.17	Ejemplo	207
13.18	Ejemplo	207
13.19	Observación	207
13.20	Teorema (Criterios de Dirichlet y Abel para convergencia uniforme)	207
13.21	Teorema (Integración y derivación término a término)	207
13.22	Ejemplo (La función de Weierstrass)	207
13.23	Definición (Serie de potencias)	208
13.24	Teorema (Radio e intervalo de convergencia)	208

13.25 Ejemplo (Cálculo del radio de convergencia) 208

13.26 Teorema (Convergencia uniforme en compactos) 208

13.27 Observación 208

13.28 Teorema (Analiticidad: derivación e integración término a término) 208

13.29 Teorema (Serie de Taylor) 208

13.30 Ejemplo (Expansiones estándar) 209

13.31 Ejemplo (Aplicaciones de las series de Taylor) 209

13.32 Teorema (Irracionalidad de e) 209

13.33 Teorema (Teorema de Borel) 210

13.34 Observación 210

13.35 Ejemplo (Función C^∞ no analítica) 210

13.36 Observación 210

13.37 Teorema (Unicidad y álgebra de series de potencias) 210

13.38 Observación 210

Índice de figuras

2.1	Recta numérica o eje real	26
2.2	Representación trigonométrica en el círculo unitario: $x = \cos \theta$, $y = \sin \theta$, donde (x, y) satisface $x^2 + y^2 = 1$	28
2.3	Intervalo abierto $(x_0 - \varepsilon, x_0 + \varepsilon)$ representado como línea centrada en x_0 de radio ε en el eje real.	28
3.1	Figura del ejemplo 3.4	33
3.2	Circunferencia unitaria fallando la prueba de la recta vertical.	34
3.3	Bosquejo de $y = x^2$	34
3.4	Gráfica de la función $f(x)$ definida por partes.	35
3.5	$f(x) = x$: Dom = $\mathbb{R}$	36
3.6	Función cuadrática $f(x) = x^2$: Dom = $\mathbb{R}$	36
3.7	Función cúbica $f(x) = x^3$: Dom = $\mathbb{R}$	36
3.8	Función $f(x) = x^4$: Dom = $\mathbb{R}$, par.	37
3.9	Función recíproca $f(x) = 1/x$: Dom = $\mathbb{R} \setminus \{0\}$	37
3.10	Función $x^{2/3}$: Dom = $\mathbb{R}$	37
3.11	Exponenciales: $f(x) = 2^x$ (Dom = $\mathbb{R}$, $y > 0$), $g(x) = (1/2)^x$ (asíntota $y = 0$).	37
3.12	$\log_2 x$: Dom = $(0, +\infty)$, pasa por $(1, 0)$, creciente.	38
3.13	$\sin x$, $\cos x$: período 2π , rango $[-1, 1]$	39
3.14	$\tan x$, $\cot x$: período π , rango $\mathbb{R}$, asíntotas verticales en $\pi/2$	39
3.15	$\sec x = 1/\cos x$, $\csc x = 1/\sin x$: rango $\mathbb{R} \setminus (-1, 1)$, asíntotas verticales.	39
3.16	Traslaciones de $y = x^2$: vértice se desplaza de $(0, 0)$ a $(h, k) = (1, 2)$	42
3.17	Transformaciones superpuestas de $y = \sin x$: amplitud, compresiones y reflexión.	42
3.18	Componentes de la forma amplitud-fase.	43
3.19	Función arcoseno: dominio $[-1, 1]$, rango $[-\pi/2, \pi/2]$	46
3.20	Función arcoseno: dominio $[-1, 1]$, rango $[0, \pi]$	46
3.21	Función arcotangente: dominio $(-\infty, \infty)$, rango $(-\pi/2, \pi/2)$	46
3.22	Ventana normanda	48
3.23	Caja sin tapa: Hoja de cartón de 20×12 cm con cuadrados de lado x recortados en las esquinas	49
3.24	Caja armada con pestañas laterales	49
4.1	Representación gráfica de la discontinuidad evitable en $x = 1$	53
4.2	Interpretación geométrica del límite	54
4.3	Comparación de áreas: triángulo inscrito $\subset$ sector $\subset$ triángulo circunscrito.	56
5.1	Un círculo de radio r inscrito en la parábola $y = x^2$	79
5.2	Triángulo equilátero formado por el eje x y las rectas tangentes.	81
5.3	Lámpara en $(3, h)$, elipse $x^2 + 4y^2 = 5$ y borde de sombra en $(-5, 0)$	81
6.1	Monotonía de $f(x) = x^3 - 3x$: la curva se colorea según el signo de f'	88
6.2	Concavidad de $f(x) = x^4 - 4x^3$: en azul los tramos donde $f'' > 0$ (curva abre hacia arriba) y en rojo donde $f'' < 0$ (curva abre hacia abajo). Los puntos negros señalan los puntos de inflexión.	89
6.3	Bosquejo de $f(x) = \frac{x^2}{x^2 - 4}$. Las ramas azules son cóncavas hacia arriba y las rojas hacia abajo. Las líneas grises punteadas indican las asíntotas $x = \pm 2$ e $y = 1$	93
6.4	Disposición geométrica del mecanismo y definición de variables.	104

Capítulo

1

Políticas del curso

La información aquí presentada no se modificará por ninguna de las partes a menos que haya un consenso entre estas, el cual debe ser oportunamente informado y reportado por escrito en este documento. Ante cualquier instancia, este documento será soporte para las acciones a las que se de lugar, por lo cual, tanto el profesor como el estudiante lo aceptan y se someten a lo que esté aquí escrito.

Esta política se rige de acuerdo a lo dispuesto en los Reglamentos Académicos de Pregrado de cada institución (R.A.P.) disponibles en las web institucionales.

Los cursos de Álgebra Lineal tendrán su Aula Virtual, donde se informarán horarios de atención, distribución de exámenes, demás aspectos particulares, calificaciones y distribuciones de porcentajes. La nota mínima de aprobación es 3.0.

1.1

Contenido del curso

La cobertura total del contenido dependerá del progreso del semestre; es responsabilidad del estudiante mantenerse al día. Los temas evaluados en cada corte se proporcionarán oportunamente. Los temas marcados con asterisco (*) son opcionales según el progreso del semestre.

1. Funciones

- a) Concepto y representación de funciones.
- b) Clasificación y gráficas de funciones:
 - Algebraicas: polinómicas, racionales e irracionales.
 - Trascendentes: exponenciales, logarítmicas, trigonométricas, trigonométricas inversas e hiperbólicas.
 - Otras funciones: valor absoluto y parte entera.
- c) Operaciones con funciones:
 - Álgebra de funciones.
 - Composición de funciones.
 - Función inversa.
- d) Representación de funciones como modelos matemáticos.

2. Límites y continuidad de funciones

- a) Concepto de límite de una función.

- b) Límites laterales, infinitos y especiales.
- c) Teoremas de límites y cálculo de límites utilizando teoremas.
- d) Límites de funciones trigonométricas.
- e) Continuidad de funciones.

3. Derivada

- a) Interpretación geométrica de la derivada.
- b) Velocidad promedio y velocidad instantánea.
- c) Concepto y reglas para el cálculo de la derivada (incluyendo la regla de la cadena).
- d) Derivadas de:
 - Funciones algebraicas (teoremas y cálculo).
 - Funciones trigonométricas e inversas.
 - Funciones exponenciales y logarítmicas.
 - Funciones hiperbólicas.
- e) Derivadas de orden superior.
- f) Derivación implícita y función inversa.

4. Aplicaciones de la derivada

- a) Tasas de cambio relacionadas.
- b) Diferenciales y aproximaciones.
- c) Regla de L'hôpital.
- d) Trazado de gráficas:
 - Máximos y mínimos.
 - Crecimiento, decrecimiento y concavidades.
 - Puntos de inflexión y asíntotas.
- e) Teorema del valor medio.
- f) Problemas de optimización.

5. Introducción a las integrales

- a) Concepto de antiderivadas o integración indefinida.
- b) Técnicas de integración:
 - Sustitución simple.
 - Por partes.
 - De funciones racionales mediante completación de cuadrados o fracciones parciales.
 - Con productos y potencias de funciones trigonométricas.
 - Sustitución trigonométrica.
- c) Integrales impropias.

6. La integral definida

- a) Concepto y propiedades de la integral definida.
- b) El teorema fundamental del cálculo.
- c) Cálculo de integrales definidas.

d) Integración numérica.

7. Aplicaciones de la integral

- a) Cálculo de áreas de regiones planas.
- b) Volumen de sólidos de revolución (capas, discos, arandelas y cascarones).
- c) Longitud de arco.
- d) Áreas de superficies de revolución.
- e) Centro de masa, centro de inercia y trabajo.

8. Ecuaciones paramétricas y coordenadas polares

- a) Representación paramétrica de curvas en el plano.
- b) Sistema de coordenadas polares.
- c) Gráfica de ecuaciones polares.
- d) Cálculo de áreas y longitud en coordenadas polares.

Notas aclaratorias:

- No hay número específico de quices o trabajos; si son varios se promedian.
- Las calificaciones se publican en la plataforma universitaria con notificación por correo. Si el estudiante no puede visualizar su nota, debe manifestarlo por correo al profesor.
- El profesor acordará con los estudiantes la forma de revisar trabajos y exámenes.

1.2

Políticas de clase

- Los instrumentos electrónicos requieren aprobación del profesor.
- Quices y exámenes sin apuntes, libros ni aparatos electrónicos (salvo flexibilización informada). El estudiante debe leer las reglas de cada evaluación.
- El trabajo debe ser autónomo o en grupo designado. **Ofrecer** o **aceptar** soluciones ajenas constituye **plagio**, penalizado según el R.A.P. Incluye omisión de fuentes e uso no citado de IA.
- **No se reciben trabajos fuera de fecha**, excepto con excusa según R.A.P.
- **Asistencia obligatoria** con control por parte del profesor.
- En exámenes escritos se esperan 15 minutos tras el inicio para ingresar; después se requiere supletorio según R.A.P.
- **Casos de emergencia:** El profesor informará evacuaciones necesarias. No se responsabiliza por decisiones estudiantiles post-evacuación.

Capítulo

2

Preliminares

En esta sección introductoria se abordarán algunas propiedades fundamentales de los números reales, cuyo estudio resulta esencial para la comprensión rigurosa de los principios del cálculo. A partir del análisis del concepto de número real, del plano cartesiano y de otras nociones preliminares, se pretende establecer una base conceptual sólida que facilite la transición hacia el estudio formal del cálculo diferencial e integral, estructurado desde la noción de función.

2.1

Números reales

Uno de los conceptos más fundamentales en las matemáticas es el de número, cuya noción se remonta a la antigüedad y cuya generalización se ha desarrollado a lo largo de la historia. La estructura numérica básica se origina en el conjunto de los *números naturales*, que posteriormente se amplió al incorporar los números negativos, dando lugar a los *números enteros*. Más adelante, al considerar la posibilidad de expresar un número como una fracción de la forma $\frac{a}{b}$, donde a y b son enteros con $b \neq 0$, surge el conjunto de los *números racionales*, los cuales pueden representarse mediante expresiones decimales finitas o periódicas infinitas.

Desde la época de los pitagóricos, se reconoce la existencia de los *números irracionales*, aquellos que no pueden expresarse como cociente de dos números enteros; un ejemplo clásico es $\sqrt{2}$. La unión de los números racionales e irracionales da origen al conjunto de los **números reales**, que constituirá el objeto principal de estudio en esta sección.

El descubrimiento de los números irracionales, atribuido a la escuela pitagórica en la antigua Grecia (siglo V a. C.), representó una crisis intelectual para la concepción aritmética de la época, pues reveló la existencia de magnitudes inconmensurables. Este hallazgo marcó un punto de inflexión en el pensamiento matemático, impulsando el desarrollo posterior de la teoría de los números y la formalización del concepto de continuidad numérica.

A continuación se presentan algunas propiedades fundamentales de los números reales, cuya comprensión resulta esencial para el estudio riguroso del análisis matemático.

2.1.1

Propiedades de los números reales

Teorema 2.1 (Propiedad de tricotomía). *El conjunto de los números reales forma un cuerpo ordenado. En particular, dados x y y números reales, existe una y solo una de las siguientes relaciones: $x < y$,*

$x = y$ o $x > y$.

Los números reales pueden representarse sobre la **recta numérica infinita** (o *eje real*) de acuerdo con la siguiente convención (figura 2.1.1): se define un punto O , denominado *origen*, que representa al número 0; una flecha orientada hacia la derecha indica la dirección positiva, mientras que una flecha orientada hacia la izquierda representa los valores negativos.

Por ejemplo, si un número x_1 es positivo, se ubica en la recta como un punto a la derecha del origen, a una distancia proporcional a su valor. De manera análoga, si un número x_2 es negativo, se representa como un punto a la izquierda del origen, también a una distancia proporcional a $|x_2|$.




Figura 2.1: Recta numérica o eje real

Existe así una correspondencia biunívoca entre los números reales y los puntos de la recta numérica: a cada número real le corresponde un punto único, y a cada punto, un número real. Además, debido a una propiedad denominada **completitud de los números reales** —cuyo tratamiento formal excede los alcances de este curso—, se cumple que entre dos números reales cualesquiera siempre es posible encontrar otros números, sean racionales o irracionales. Esta idea se resume en el siguiente teorema clásico.

Teorema 2.2. *Para todo número irracional α , existen infinitos números racionales que lo aproximan con cualquier grado deseado de precisión.*

Demostración. Sea $\alpha > 0$ un número irracional. Queremos calcular una aproximación con un error menor que $\frac{1}{n}$. Note que, para cualquier α , existe un número entero N tal que $N < \alpha < N + 1$. Si se divide el segmento comprendido entre N y $N + 1$ en n partes iguales, entonces α se encontrará entre $N + \frac{m}{n}$ y $N + \frac{m + 1}{n}$ para algún entero m . La diferencia entre ambos extremos es $\frac{1}{n}$, de modo que se puede alcanzar cualquier precisión deseada disminuyendo el valor de $\frac{1}{n}$. □

Ejemplo 2.3. El número irracional $\sqrt{2}$ puede aproximarse de la siguiente manera:

$$1,4 < \sqrt{2} < 1,5,$$
$$1,41 < \sqrt{2} < 1,42,$$
$$1,414 < \sqrt{2} < 1,415,$$

según precisiones de $\frac{1}{10}$, $\frac{1}{100}$ y $\frac{1}{1000}$, respectivamente.

2.1.2

Valor absoluto de los números reales

Definición 2.4 (Valor absoluto). El **valor absoluto** (o módulo) de un número real x , denotado por $|x|$, se define como:

$$|x| = x$$
$$|x| = -x$$

$$\text{si } x \geq 0,$$
$$\text{si } x < 0.$$

Por esta definición, $|x|$ representa siempre un número real no negativo ($|x| \geq 0$) y mide la distancia de x al origen en la recta numérica.

Ejemplo 2.5. Para $x = 2$, se tiene $|2| = 2 \geq 0$. Para $x = -3$, se verifica $|-3| = 3 > 0$. En ambos casos, el valor absoluto produce un número no negativo.

A continuación se enuncian las propiedades fundamentales del valor absoluto:

Teorema 2.6 (Propiedades del valor absoluto). *Dados $x, y \in \mathbb{R}$, se cumplen las siguientes propiedades:*

- 1. $|x + y| \leq |x| + |y|$ (Desigualdad triangular).
- 2. $|x - y| \geq ||x| - |y||$ (Segunda desigualdad triangular).
- 3. $|xy| = |x| \cdot |y|$ para todo $x, y \in \mathbb{R}$.
- 4. $\left|\frac{x}{y}\right| = \frac{|x|}{|y|}$ siempre que $y \neq 0$.

Demostración. 1. **Caso 1:** $x + y \geq 0$. Entonces $|x + y| = x + y \leq |x| + |y|$, pues $|x| \geq x$ y $|y| \geq y$.
Caso 2: $x + y < 0$. Entonces $|x + y| = -(x + y) = (-x) + (-y) \leq |x| + |y|$, ya que $|x| \geq -x$ y $|y| \geq -y$.
2. Sea $z = x - y$. Entonces $x = y + z$, y por la desigualdad triangular:

$$|x| = |y + z| \leq |y| + |z| = |y| + |x - y|.$$

Restando $|y|$ de ambos lados: $|x| - |y| \leq |x - y|$.

Dado que la desigualdad es simétrica, también se tiene $|y| - |x| \leq |x - y|$, lo que equivale a:

$$|x - y| \geq ||x| - |y||.$$

Las propiedades 3 y 4 se siguen directamente de la definición del valor absoluto.

□

2.1.3

Magnitudes variables y constantes e intervalos de variación

Las **magnitudes variables**, tales como el tiempo, longitud, área, volumen, masa, velocidad y temperatura, obtienen sus valores mediante el hábito de la medición y se presentan en sucesión constante. Para el caso del movimiento uniforme, podemos observar el desplazamiento de un punto a lo largo del tiempo.

Por contraste, las **magnitudes constantes** son aquellas que no sufren variación; una magnitud variable cuyo valor permanece invariable se denomina constante. La distinción entre magnitudes variables y constantes resulta fundamental en el análisis matemático. De esto, por ejemplo $\pi \approx 3,14159$ es una constante mientras t vista como el tiempo es variable.

Una magnitud variable puede tomar diferentes valores numéricos. Se considera el problema de la temperatura del agua al calentarla en condiciones normales, variará desde 15°C hasta el punto de ebullición: 100°C .




Figura 2.2: Representación trigonométrica en el círculo unitario: $x = \cos \theta$, $y = \sin \theta$, donde (x, y) satisface $x^2 + y^2 = 1$

La variable $z = \cos \theta$ puede tomar todos los valores comprendidos entre -1 y $+1$. El conjunto de todos los valores posibles que puede tomar la variable independiente θ se denomina **campo de variación** de la variable independiente, el cual determina el conjunto de valores posibles de la función dependiente.

Por ejemplo, en la función $z = \cos \theta$, el **campo de variación** de z es el intervalo cerrado $[-1, 1]$. Posteriormente, este concepto se denominará formalmente *rango* (o *imagen*) de una función.

Observe que hemos introducido la notación de intervalo $[-1, 1]$. Esta notación se define de la siguiente manera:

Definición 2.7 (Intervalos). Un **intervalo** es el conjunto de valores numéricos $x \in \mathbb{R}$ comprendidos entre dos números reales dados a y b ($a < b$). Los intervalos se clasifican según los extremos incluidos:

- **Intervalo abierto:** $(a, b) = \{x \in \mathbb{R} \mid a < x < b\}$. No se incluyen los extremos a ni b .
- **Intervalo cerrado:** $[a, b] = \{x \in \mathbb{R} \mid a \leq x \leq b\}$. Se incluyen ambos extremos.
- **Intervalos semicerrados (o semiabiertos):**
 - $(a, b] = \{x \in \mathbb{R} \mid a < x \leq b\}$
 - $[a, b) = \{x \in \mathbb{R} \mid a \leq x < b\}$
- **Intervalos infinitos:**
 - $(-\infty, c) = \{x \in \mathbb{R} \mid x < c\}$
 - $(c, +\infty) = \{x \in \mathbb{R} \mid x > c\}$
 - $(-\infty, +\infty) = \mathbb{R}$

Existen combinaciones adicionales de estas definiciones, como por ejemplo $(-\infty, b]$, que se interpretan de manera análoga.

Ejemplo 2.8. Ejemplos de intervalos: $(-1, 1)$, $[-2, 3)$, $(0, +\infty)$, $\mathbb{R} = (-\infty, +\infty)$.

Las definiciones de intervalos abiertos y cerrados se utilizan para múltiples aspectos de las funciones. Gráficamente se considera el concepto de vecindad, que está representada por un centro y un radio, el cual resulta ser un intervalo:




Figura 2.3: Intervalo abierto $(x_0 - \varepsilon, x_0 + \varepsilon)$ representado como línea centrada en x_0 de radio ε en el eje real.

Definición 2.9 (Vecindad). Dados un número real $x_0 \in \mathbb{R}$ y un número positivo $\varepsilon > 0$, el conjunto $(x_0 - \varepsilon, x_0 + \varepsilon)$ se denomina **vecindad** de x_0 de **radio** ε , o simplemente vecindad de radio ε centrada

en x_0 . En este caso, el punto x_0 se llama **centro** de la vecindad, y la magnitud $\frac{\varepsilon}{2}$ denomina **radio de la vecindad**. La Figura 2.3 representa la vecindad $(x_0 - \varepsilon, x_0 + \varepsilon)$ del punto x_0 , cuyo radio es ε .

2.1.4

Problemas propuestos

Siga estos pasos ordenados para resolver los problemas algebraicos. Estos pasos son útiles tanto para su resolución manual como para generar prompts efectivos con inteligencia artificial.

PROCESO SISTEMÁTICO DE RESOLUCIÓN

1. ANÁLISIS INICIAL

- Lea todo el problema cuidadosamente.
- Identifique: ¿Qué datos se dan? ¿Qué se pide?
- Clasifique el problema: ecuación, desigualdad, simplificación, o aplicado.

2. PLAN DE SOLUCIÓN

- Liste las técnicas necesarias: factorización, valor absoluto, despeje, etc.
- Si es aplicado, asigne variables a las incógnitas.

3. EJECUCIÓN ALGEBRAICA

- Organice la ecuación/desigualdad claramente.
- Identifique simplificaciones: fracciones, factorización, radicales.
- Realice operaciones paso a paso, explicando cada acción:
 - “Multiplico por $x - 2 \neq 0$ para eliminar denominador”
 - “Factorizo numerador: $x^2 - 4 = (x - 2)(x + 2)$ ”

4. VALIDACIÓN DE SOLUCIONES

- Verifique soluciones extraviadas (raíces, valor absoluto).
- Determine dominio: denominadores $\neq 0$, radicales ≥ 0 .
- Sustituya en la expresión original.

5. PRESENTACIÓN FINAL

- Expresión simplificada o intervalo solución.
- Dominio completo.
- Contexto físico (si aplica).

Problema 2.10. Encuentre los valores de $x \in \mathbb{R}$ que resuelven las siguientes ecuaciones o desigualdades. Expresa las soluciones en notación de intervalo cuando corresponda y represente gráficamente cada conjunto solución como vecindad abierta en el eje real (incluya la figura con centro y radio ε apropiados).

1. $\frac{3x + 1}{5x + 7} = \frac{6x + 11}{10x - 3}$

2. $2 - \frac{1}{x} = 1 + \frac{3}{x}$

3. $\frac{2}{x + 5} = \frac{3}{2x + 1} - \frac{5}{6x + 3}$
4. $\frac{4}{x - 5} - \frac{2}{x + 4} = \frac{3}{2x - 4}$

5. $\frac{1}{\sqrt{x}} = 3 - \frac{1 - 3\sqrt{x}}{\sqrt{x}}$

6. $2x^2 + 7x - 15 = 0$

7. $(x - 2)(x + 1) - 6 = 0$

8. $4x^2 - 37x^2 + 75 = 0$

9. $x^2 - 2x - 15 = 0$

10. $20x^2 + 8x^2 - 55x - 22 = 0$

11. $\frac{6xy^2}{7} \times \frac{21x^2}{y} \div \frac{32xy^2}{91}$

12. $\frac{12p^2q^2}{5} \times \frac{15}{4pq} \div 3$

13. $\frac{3}{pq} \times \frac{4p}{p+1}$

14. $\frac{x^2 - x - 6}{2xy} \times \frac{2x^2y}{x^2 - 9}$

15. $\frac{4}{\sqrt{2} - 1} + \frac{4 + \sqrt{3}}{\sqrt{2} - 3}$

16. $3x - 2 > 12$

17. $2x + 5 \leq 8$

18. $-2 - 3x \geq 2$

19. $3 - 5x < 11$
20. $2x + 5 < 6x - 7$

21. $|4x - 1| = 7$

22. $|2x + 1| + 1 = 15$

23. $\left| \frac{2 - 3x}{5} \right| = 2$

24. $\left| \frac{2x + 5}{3} \right| < 1$

25. $\frac{3}{|5 - 2x|} < 2$

26. $\frac{x^2(x + 2)}{x + 2(x + 1)} \leq 0$

27. $\frac{(x^2 + 1)(x - 3)}{x^2 - 9} \geq 0$

28. $\frac{x^2 - x}{x^2 + 2x} \leq 0$

29. $\frac{(x + 3)(2 - x)}{(x + 4)(x^2 - 4)} \leq 0$

30. $\frac{x - 2}{3x - 10} \geq 0$

Capítulo

3

Funciones

La función es, tal vez, uno de los conceptos más importantes en matemáticas, pues gran parte de los demás conceptos matemáticos se basan en el conocimiento de las funciones y sus propiedades. Aunque existen muchos tipos de funciones —por ejemplo, el área de un círculo que depende de su radio, el costo de un envío que depende de su peso, o la velocidad que depende del tiempo t transcurrido—, las funciones no siempre dependen de una sola variable. Por ejemplo, el volumen de un cilindro depende tanto de su altura como de su radio.

En esta sección nos enfocaremos inicialmente en las funciones de una variable real y desarrollaremos con detalle este concepto fundamental.

3.1

Propiedades básicas

Definición 3.1 (Función). Una función f es una regla de correspondencia que asigna a cada elemento x de un conjunto denominado **dominio**, un único valor $f(x)$ en otro conjunto, llamado **codominio**.

El conjunto de todos los valores $f(x)$ obtenidos se denomina **rango** o **imagen** de f . Es común decir que x es la variable independiente y $f(x)$ es la variable dependiente además de usar la notación $y = f(x)$ de manera indistinta.

Problema 3.2. Calcule el dominio de las siguientes funciones

1. $f(x) = x^2 - 8x + 5$.
2. $f(x) = \sqrt{1 - x^2}$.
3. $f(x) = \sqrt{3 + x} + \sqrt[4]{7 - x}$.
4. $f(x) = \frac{x + 5}{x - 3}$

Solución:

1. La función es un polinomio de grado 2. Los polinomios están definidos para todo $x \in \mathbb{R}$, sin restricciones. Por tanto, $\text{Dom}(f) = \mathbb{R}$.
2. La raíz cuadrada requiere $1 - x^2 \geq 0$. Factorizamos:

$$1 - x^2 = (1 - x)(1 + x) \geq 0.$$

Intervalo	$1 + x$	$1 - x$	$(1 - x)(1 + x)$
$(-\infty, -1)$	$-$	$+$	$-$
$(-1, 1)$	$+$	$+$	$+$
$(1, +\infty)$	$+$	$-$	$-$

Cuadro 3.1: Tabla de signos para el problema 3.2

3. Analizamos cada radical por separado. Para $\sqrt{3+x}$ se cumple que $3+x \geq 0 \iff x \geq -3$ y para $\sqrt[4]{7-x}$ se tiene que las raíces de índice par requieren radicando ≥ 0 . Así, $7-x \geq 0 \iff x \leq 7$. Finalmente la suma está definida cuando ambas lo están, por tanto $\text{Dom}(f) = [-3, 7]$.
4. La función está definida para todo número real excepto donde el denominador sea 0. De esta manera, $\text{Dom}(f) = \mathbb{R} - \{3\}$.

Observación 3.3 (Formas de representar una función). *Existen básicamente cuatro formas de representar una función: verbalmente, describiendo en palabras la relación entre variables; numéricamente, mediante una tabla de valores; visualmente, a través de una gráfica; y algebraicamente, por medio de una fórmula explícita. Aclaremos estas formas en el siguiente ejemplo.*

Ejemplo 3.4. Un contenedor rectangular sin tapa tiene un volumen de 10 m^3 . La longitud de su base es dos veces su ancho. El material para la base cuesta \$10 por metro cuadrado y el material para los lados cuesta \$6 por metro cuadrado. Expresa el costo de los materiales como una función del ancho de la base. Dé una representación verbal, numérica, visual y algebraica.

Solución: Primero introducimos las variables geométricas del problema. Sea x el ancho de la base (en metros), $2x$ la longitud de la base (en metros) y h la altura del contenedor (en metros). Como el contenedor no tiene tapa, solo hay base y cuatro lados. La condición de volumen se escribe como

$$V = (\text{ancho}) \cdot (\text{longitud}) \cdot (\text{altura}) = x \cdot 2x \cdot h = 2x^2h = 10.$$

Despejamos la altura en función del ancho:

$$h = \frac{10}{2x^2} = \frac{5}{x^2}.$$

Ahora calculamos el área de cada parte para expresar el costo total. El área de la base es

$$A_{\text{base}} = x \cdot 2x = 2x^2,$$

y su costo es

$$C_{\text{base}} = 10 \cdot A_{\text{base}} = 10 \cdot 2x^2 = 20x^2.$$

El contenedor tiene cuatro lados rectangulares: dos lados de dimensiones $x \times h$ y dos de dimensiones $2x \times h$. El área total de los lados es

$$A_{\text{lados}} = 2(xh) + 2(2xh) = 2xh + 4xh = 6xh.$$

Sustituimos $h = \frac{5}{x^2}$:

$$A_{\text{lados}} = 6x \cdot \frac{5}{x^2} = \frac{30}{x}.$$

El costo de los lados es entonces

$$C_{\text{lados}} = 6 \cdot A_{\text{lados}} = 6 \cdot \frac{30}{x} = \frac{180}{x}.$$

Sumando ambos aportes obtenemos el costo total como función del ancho x :

$$C(x) = C_{\text{base}} + C_{\text{lados}} = 20x^2 + \frac{180}{x}.$$

Podemos ahora presentar las cuatro representaciones de la función costo:

Representación verbal: A cada valor positivo del ancho x se le asigna el costo total de construir el contenedor, sumando el costo de la base y el de los cuatro lados, donde la longitud es $2x$ y la altura se ajusta para que el volumen sea 10 m^3 .

Representación algebraica: La función costo en términos del ancho x está dada por

$$C(x) = 20x^2 + \frac{180}{x}, \quad x > 0.$$

Representación numérica: Podemos elaborar una tabla de valores, eligiendo algunos anchos x (en metros) y calculando el costo $C(x)$ (en dólares). Por ejemplo:

x	$C(x)$
1	$20(1)^2 + \frac{180}{1} = 200$
1,5	$20(1,5)^2 + \frac{180}{1,5} = 20 \cdot 2,25 + 120 = 165$
2	$20(2)^2 + \frac{180}{2} = 80 + 90 = 170$
2,5	$20(2,5)^2 + \frac{180}{2,5} = 20 \cdot 6,25 + 72 = 197$

Representación visual: La representación gráfica consiste en dibujar la curva de la función

$$y = C(x) = 20x^2 + \frac{180}{x}, \quad x > 0,$$

en el plano xy , donde el eje horizontal representa el ancho x y el eje vertical representa el costo $C(x)$. Esta gráfica muestra cómo varía el costo total según el ancho de la base.




Figura 3.1: Figura del ejemplo 3.4

Con esto hemos descrito el costo como función del ancho en sus cuatro formas: verbal, numérica, visual y algebraica.

Aunque conocer las cuatro representaciones de una función (verbal, numérica, algebraica y gráfica) es fundamental, en ocasiones una resulta más conveniente que las demás según el contexto. Por ello, es esencial seleccionar la representación más adecuada para cada situación particular. La siguiente es una propiedad clave para identificar gráficas de funciones:

Observación 3.5 (Prueba de la recta vertical). *Una curva en el plano XY es la gráfica de una función $y = f(x)$ si y solo si ninguna recta vertical se interseca con la curva en más de un punto.*

Por ejemplo, la circunferencia de radio 1 centrada en el origen, dada por $x^2 + y^2 = 1$, no representa una función de x , ya que una recta vertical como $x = 0,5$ la interseca dos veces.




Figura 3.2: Circunferencia unitaria fallando la prueba de la recta vertical.

Definición 3.6 (Funciones crecientes y decrecientes). Una función f se denomina **creciente** sobre un intervalo I si $f(x_1) < f(x_2)$ siempre que $x_1 < x_2$ para todo $x \in I$. De manera análoga, f se denomina **decreciente** sobre un intervalo I si $f(x_1) > f(x_2)$ siempre que $x_1 < x_2 \in I$.

Ejemplo 3.7. Determine los intervalos donde la función $f(x) = x^2$ es creciente o decreciente.

Solución: Hagamos inicialmente un bosquejo de la función




Figura 3.3: Bosquejo de $y = x^2$.

Visualmente se observa que la función tiene forma de parábola y vértice en $x = 0$, sugiriendo comportamiento diferente a cada lado. Analizamos por casos.

Caso 1: $x \geq 0$ (**intervalo** $[0, +\infty)$). Sean $x_1, x_2 \geq 0$ con $x_1 < x_2$. Entonces $x_2 - x_1 > 0$.
Calculamos:

$$f(x_2) - f(x_1) = x_2^2 - x_1^2 = (x_2 - x_1)(x_2 + x_1).$$

Como $x_2 - x_1 > 0$ y $x_2 + x_1 \geq x_1 + x_1 = 2x_1 \geq 0$, se tiene $f(x_2) - f(x_1) > 0 \iff f(x_2) > f(x_1)$.
Por tanto, f es estrictamente creciente en $[0, +\infty)$.

Caso 2: $x \leq 0$ (**intervalo** $(-\infty, 0]$). Sean $x_1, x_2 \leq 0$ con $x_1 < x_2 \leq 0$. Entonces $x_2 - x_1 > 0$.
Ahora:

$$f(x_2) - f(x_1) = x_2^2 - x_1^2 = (x_2 - x_1)(x_2 + x_1).$$


Como $x_2 - x_1 > 0$ pero $x_2 + x_1 \leq x_2 + x_2 = 2x_2 \leq 0$, se tiene $f(x_2) - f(x_1) < 0 \iff f(x_2) < f(x_1)$.
Por tanto, f es estrictamente decreciente en $(-\infty, 0]$.

El ejemplo anterior se resolverá con mayor facilidad más adelante, luego de estudiar la derivada. Mientras tanto, observe que hay algunas formas adicionales de representar funciones:

Ejemplo 3.8 (Función definida por partes). A veces las funciones se describen mediante diferentes fórmulas o expresiones en distintas partes de sus dominios. Trace la gráfica de la siguiente función

definida por partes:

$$f(x) = \begin{cases} 3 - \frac{1}{2}x & \text{si } x < 2 \\ 2x - 5 & \text{si } x \geq 2 \end{cases}$$



Definición 3.9 (Funciones pares e impares). Una función $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ se clasifica como **par** si satisface la simetría respecto al eje y :

$$f(-x) = f(x) \quad \forall x \in D \cap (-D),$$

donde $D \cap (-D) \neq \emptyset$ asegura que el dominio contenga pares simétricos respecto al origen.

Análogamente, se clasifica como **impar** si exhibe simetría puntual respecto al origen:

$$f(-x) = -f(x) \quad \forall x \in D \cap (-D).$$

Ejemplo 3.10. La función $f(x) = x^2$ es par, ya que:

$$f(-x) = (-x)^2 = x^2 = f(x) \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

Asimismo, la función $f(x) = x^3$ es impar, pues:

$$f(-x) = (-x)^3 = -x^3 = -f(x) \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

Estas identidades algebraicas verifican las respectivas simetrías geométricas en sus gráficas.

En la sección subsiguiente se presentará un catálogo más completo de funciones elementales, permitiendo explorar sistemáticamente estas propiedades simétricas y otras características relevantes del análisis funcional.

3.2

Funciones elementales fundamentales

Existe un catálogo básico de funciones elementales fundamentales —conocidas también como *modelos matemáticos esenciales*—, que incluye la función potencia, la exponencial, la logarítmica, las trigonométricas y las trigonométricas inversas. Estas constituyen la base para la construcción de modelos matemáticos más complejos, y en este capítulo se analizarán detalladamente sus dominios, rangos y gráficas.

Definición 3.11 (Función potencia). Sea $r \in \mathbb{Q}$ un número racional escrito en su forma reducida $r = \frac{p}{q}$, donde $p \in \mathbb{Z}$ es un entero y $q \in \mathbb{N}^+$ es un entero positivo con $\gcd(p, q) = 1$. La función potencia $f(x) = x^r = \sqrt[q]{x^p}$ tiene dominio que depende de la paridad del denominador q y la señal de r :

- Si q es **impar**, la raíz q -ésima está definida para todo $x \in \mathbb{R}$, por lo que $\text{Dom}(f) = \mathbb{R}$.
- Si q es **par**, la raíz q -ésima de números negativos no está definida en reales, requiriendo $x^p \geq 0$. Para p impar esto equivale a $x \geq 0$, dando $\text{Dom}(f) = [0, +\infty)$.
- Si $r < 0$, la expresión involucra división por x^{-r} , requiriendo excluir $x = 0$: $\text{Dom}(f) = \mathbb{R} \setminus \{0\}$ (o $(0, +\infty)$ si q par).

Como casos particulares, para enteros positivos $n \in \mathbb{N}$, $f(x) = x^n$ es un polinomio definido en todo $\mathbb{R}$. Para enteros negativos $n < 0$, $f(x) = x^n = \frac{1}{x^{-n}}$ está definida en $\mathbb{R} \setminus \{0\}$.

Estas reglas garantizan que x^r produzca valores reales para todo x en su dominio respectivo.

Ejemplo 3.12 (Ejemplos de funciones potencia elementales). Listamos algunos ejemplos representativos




Figura 3.5: $f(x) = x$: $\text{Dom} = \mathbb{R}$.




Figura 3.6: Función cuadrática $f(x) = x^2$: $\text{Dom} = \mathbb{R}$.




Figura 3.7: Función cúbica $f(x) = x^3$: $\text{Dom} = \mathbb{R}$.




Figura 3.8: Función $f(x) = x^4$: Dom = $\mathbb{R}$, par.




Figura 3.9: Función recíproca $f(x) = 1/x$: Dom = $\mathbb{R} \setminus \{0\}$




Figura 3.10: Función $x^{2/3}$: Dom = $\mathbb{R}$.

Definición 3.13 (Función exponencial). Sea a un número real tal que $a > 0$ y $a \neq 1$. Se define la función exponencial como $f(x) = a^x$. El dominio serán todos los números reales.

Ejemplo 3.14 (Ejemplos de funciones exponenciales). Los siguientes son ejemplos de funciones exponenciales:




Figura 3.11: Exponenciales: $f(x) = 2^x$ (Dom = $\mathbb{R}$, $y > 0$), $g(x) = (1/2)^x$ (asíntota $y = 0$).

Definición 3.15 (Función logarítmica). Sea $a > 0$, $a \neq 1$ una base válida. La **función logarítmica** $f(x) = \log_a x$ se define como la función inversa de la exponencial a^x , satisfaciendo la propiedad fundamental:

$$a^{\log_a x} = x = \log_a(a^x) \quad \forall x > 0.$$

Su dominio natural es $(0, +\infty)$ y su rango es $\mathbb{R}$, siendo estrictamente creciente si $a > 1$ y estrictamente decreciente si $0 < a < 1$.

Ejemplo 3.16 (Funciones logarítmicas elementales). Consideremos dos casos representativos:

a) $f(x) = \log_2 x$ (base > 1 , creciente):




Figura 3.12: $\log_2 x$: Dom = $(0, +\infty)$, pasa por $(1, 0)$, creciente.

Antes de seguir con el siguiente tipo de funciones, es necesaria la siguiente definición

Definición 3.17 (Función periódica). Una función $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ se denomina **periódica** si existe un número real positivo $T > 0$, llamado **período** de f , tal que:

$$f(x + T) = f(x) \quad \forall x \in D \text{ con } x + T \in D.$$

El menor número positivo T que satisface esta condición se conoce como **período fundamental**. Equivalentemente, $f(x + nT) = f(x)$ para todo entero $n \in \mathbb{Z}$ tal que $x + nT \in D$.

Observación 3.18. Las funciones periódicas presentan la propiedad geométrica de que su gráfica se compone de copias trasladadas del segmento básico correspondiente a un período. Ejemplos clásicos incluyen las funciones trigonométricas, donde $\sin x$ y $\cos x$ tienen período fundamental 2π , mientras que $\tan x$ tiene período π .

Definición 3.19 (Funciones trigonométricas fundamentales). Las **funciones trigonométricas fundamentales** se definen para $x \in \mathbb{R}$ medido en radianes, originadas en las razones trigonométricas de un ángulo en el círculo unitario. Se distinguen seis funciones periódicas con período fundamental 2π (excepto las secantes y cosecantes), cuyos dominios, rangos y comportamientos se detallan a continuación:

- $\sin x$: Dom = $\mathbb{R}$, Rango = $[-1, 1]$, paridad impar.
- $\cos x$: Dom = $\mathbb{R}$, Rango = $[-1, 1]$, paridad par.
- $\tan x$: Dom = $\mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{\pi}{2} + k\pi \mid k \in \mathbb{Z} \right\}$, Rango = $\mathbb{R}$, período π , paridad impar.
- $\cot x$: Dom = $\mathbb{R} \setminus \{k\pi \mid k \in \mathbb{Z}\}$, Rango = $\mathbb{R}$, período π , paridad impar.
- $\sec x = \frac{1}{\cos x}$: Dom = $\mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{\pi}{2} + k\pi \mid k \in \mathbb{Z} \right\}$, Rango = $(-\infty, -1] \cup [1, +\infty)$.
- $\csc x = \frac{1}{\sin x}$: Dom = $\mathbb{R} \setminus \{k\pi \mid k \in \mathbb{Z}\}$, Rango = $(-\infty, -1] \cup [1, +\infty)$.

Ejemplo 3.20 (Gráficas de las funciones trigonométricas fundamentales). Se presentan a continuación las gráficas de las funciones trigonométricas fundamentales:




Figura 3.13: $\sin x$, $\cos x$: período 2π , rango $[-1, 1]$.




Figura 3.14: $\tan x$, $\cot x$: período π , rango $\mathbb{R}$, asíntotas verticales en $\pi/2$.




Figura 3.15: $\sec x = 1/\cos x$, $\csc x = 1/\sin x$: rango $\mathbb{R} \setminus (-1, 1)$, asíntotas verticales.

Definición 3.21 (Función compuesta). Sean f y g dos funciones tales que g está definida en un conjunto D_g y f está definida en un conjunto D_f . Si para todo $x \in D_g$ se tiene que $g(x) \in D_f$, se puede definir la **función compuesta** de f con g como

$$(f \circ g)(x) = f(g(x)).$$

El dominio de la función compuesta $f \circ g$ está formado por todos aquellos $x \in D_g$ tales que la imagen $g(x)$ pertenece al dominio de f , es decir:

$$\text{Dom}(f \circ g) = \{ x \in D_g : g(x) \in D_f \}.$$

Ejemplo 3.22. La función $y = \sqrt{1 - x^2}$ puede interpretarse como una función compuesta de la siguiente manera:

$$f(u) = \sqrt{u}, \quad u = g(x) = 1 - x^2.$$

Aquí, la función interior es $g(x) = 1 - x^2$ y la función exterior es $f(u) = \sqrt{u}$.

El dominio de g es todo $\mathbb{R}$, mientras que el dominio de f es $[0, +\infty)$, pues la raíz cuadrada sólo está definida para argumentos no negativos. Para que la función compuesta $f(g(x)) = \sqrt{1 - x^2}$ esté definida, se requiere que

$$g(x) = 1 - x^2 \geq 0.$$

Resolvemos la desigualdad:

$$1 - x^2 \geq 0 \iff x^2 \leq 1 \iff -1 \leq x \leq 1.$$

Por lo tanto,

$$\text{Dom}(f \circ g) = [-1, 1].$$

En conclusión, $y = \sqrt{1 - x^2}$ es una función compuesta de $f(u) = \sqrt{u}$ y $g(x) = 1 - x^2$, cuyo dominio está dado por el intervalo cerrado $[-1, 1]$.

Observación 3.23 (Composiciones múltiples). *Es posible componer una función múltiples veces formando cadenas de funciones. Por ejemplo, la función*

$$f(x) = \ln(\sin(x^2 + 1))$$

puede descomponerse en la composición sucesiva de tres funciones elementales:

$$f(x) = \ln \circ \sin \circ p(x),$$

donde:

- $p(x) = x^2 + 1$ (función potencia desplazada),
- $u = \sin(v)$ con $v = p(x)$,
- $y = \ln(u)$ con $u = \sin(p(x))$.

Para determinar su dominio, se analizan las restricciones de cada función desde la exterior hacia la interior:

1. $\ln(u)$ requiere $u > 0$,
2. $\sin(v) \in [-1, 1]$, pero debe satisfacer $\sin(v) > 0$,
3. $v = x^2 + 1 \geq 1 > 0$ (siempre definido).

Así, $\text{Dom}(f) = \{x \in \mathbb{R} : \sin(x^2 + 1) > 0\}$, equivalente a los intervalos donde el seno es positivo.

Definición 3.24 (Función elemental). Una función $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ se denomina **elemental** si puede obtenerse a partir de funciones elementales básicas (potencias, exponenciales, logarítmicas, trigonométricas y sus inversas) y constantes reales, mediante un número *finito* de las siguientes operaciones:

- Suma, resta, multiplicación y división entre funciones,
- Composición de funciones.

Formalmente, el conjunto de funciones elementales $\mathcal{E}$ se define recursivamente como el menor conjunto que contiene:

- Las funciones potencia $x \mapsto x^r$ ($r \in \mathbb{Q}$),
- Las exponenciales $x \mapsto a^x$ ($a > 0, a \neq 1$),
- Las logarítmicas $x \mapsto \log_a x$ ($a > 0, a \neq 1$),
- Las funciones trigonométricas $\sin x, \cos x, \tan x$, etc.,
- Las constantes $x \mapsto c$ ($c \in \mathbb{R}$),
- Y está cerrado bajo suma, producto, cociente y composición.

Las expresiones analíticas usuales en cálculo (polinomios, racionales, exponenciales-trigonométricas, etc.) son funciones elementales.

Un tipo particular de funciones elementales son las **funciones algebraicas**, que se obtienen únicamente mediante operaciones algebraicas (suma, resta, multiplicación, división y raíces) sobre la variable independiente x . Se definen detalladamente a continuación:

Definición 3.25 (Función algebraica). Una función $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ es **algebraica** si puede expresarse mediante una expresión finita que involucre únicamente la variable x , números reales y las operaciones de suma, resta, multiplicación, división y extracción de raíces n -ésimas (con $n \in \mathbb{N}^+$). Equivalentemente, satisface una ecuación polinómica con coeficientes reales:

$$P(x, f(x)) = 0,$$

donde P es un polinomio en dos variables.

Definición 3.26 (Función lineal). Una función $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ es **lineal** si tiene la forma

$$f(x) = mx + b,$$

donde $m, b \in \mathbb{R}$ son constantes. Aquí m es la **pendiente** y b el **intercepto** con el eje y . Su dominio y rango son $\mathbb{R}$, y es inyectiva si $m \neq 0$.

Definición 3.27 (Función polinómica). Una función $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ es **polinómica** si se expresa como

$$f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0,$$

donde $n \in \mathbb{N} \cup \{0\}$ es el **grado**, $a_i \in \mathbb{R}$ y $a_n \neq 0$. Su dominio es $\mathbb{R}$. Cuando $n \geq 2$, se clasifican según su grado (cuadrática $n = 2$, cúbica $n = 3$, etc.).

Definición 3.28 (Función racional). Una función $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ es **racional** si es un cociente de dos polinomios:

$$f(x) = \frac{P(x)}{Q(x)},$$

donde P, Q son polinomios con $Q \not\equiv 0$. Su dominio es

$$D = \mathbb{R} \setminus \{x \in \mathbb{R} : Q(x) = 0\}.$$

Las asíntotas y discontinuidades se determinan por los ceros del denominador.

Definición 3.29 (Función irracional). Una función $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ es **irracional** (o radical) si en su expresión analítica aparece al menos una raíz n -ésima con $n \geq 2$. El dominio se restringe por las condiciones de definición de las raíces:

$$\sqrt[n]{P(x)} \quad \text{requiere } P(x) \geq 0 \text{ si } n \text{ par.}$$

Ejemplos: $f(x) = \sqrt{x}$, $g(x) = \sqrt[3]{x^2 + 1}$.

Las funciones que no son algebraicas se denominan **trascendentes**. Ejemplos incluyen las funciones trigonométricas ($y = \cos x$), exponenciales ($y = 10^x$) y logarítmicas ($y = \ln x$), cuya definición trasciende las operaciones algebraicas elementales.

3.3

Transformaciones de funciones

A partir de las funciones básicas estudiadas previamente, las combinaciones de funciones se producen de manera natural: $(f+g)(x) = f(x)+g(x)$, $(f-g)(x) = f(x)-g(x)$, $(fg)(x) = f(x)g(x)$, y $(\frac{f}{g})(x) = \frac{f(x)}{g(x)}$ con $g(x) \neq 0$. Ahora, es posible generar nuevas funciones mediante **transformaciones geométricas** de sus gráficas: traslaciones, dilataciones, compresiones y reflexiones. Estas operaciones preservan las propiedades fundamentales de la función original, modificando únicamente su posición y escala.

Dados $h, k \in \mathbb{R}$ y $y = f(x)$, las siguientes transformaciones desplazan la gráfica de f :

- $y = f(x - h)$: **Traslación horizontal** de h unidades ($h > 0$ hacia la derecha, $h < 0$ hacia la izquierda).
- $y = f(x) + k$: **Traslación vertical** de k unidades ($k > 0$ hacia arriba, $k < 0$ hacia abajo).
- $y = f(x - h) + k$: **Traslación combinada** (horizontal h , vertical k).




Figura 3.16: Traslaciones de $y = x^2$: vértice se desplaza de $(0, 0)$ a $(h, k) = (1, 2)$.

Suponga que $c > 0$, $c \neq 1$. Las siguientes transformaciones modifican la escala y orientación:

- $y = c \cdot f(x)$ ($c > 1$): **Dilatación vertical** por factor c .
- $y = \frac{1}{c} \cdot f(x)$ ($c > 1$): **Compresión vertical** por factor c .
- $y = f(c \cdot x)$ ($c > 1$): **Compresión horizontal** por factor c .
- $y = f\left(\frac{x}{c}\right)$ ($c > 1$): **Dilatación horizontal** por factor c .
- $y = -f(x)$: **Reflexión respecto al eje x** .
- $y = f(-x)$: **Reflexión respecto al eje y** (preserva paridad).




Figura 3.17: Transformaciones superpuestas de $y = \sin x$: amplitud, compresiones y reflexión.

Estas transformaciones permiten sistematizar el análisis gráfico de funciones complejas a partir de funciones básicas conocidas. Para las funciones trigonométricas periódicas $\sin x$ y $\cos x$, cuya forma canónica tiene amplitud 1, línea media $y = 0$ y período 2π , la forma generalizada es $y = C + A \sin[a(t + b)]$ o $y = C + A \cos[a(t + b)]$, donde los parámetros tienen interpretación geométrica precisa:

- **Amplitud** $|A|$: distancia máxima desde la línea central hasta los valores extremos.

- **Período fundamental** $T = \frac{2\pi}{|a|}$: longitud del ciclo completo ($a > 0$ implica compresión, $0 < a < 1$ dilatación horizontal).
- **Línea central (desfase vertical)** C : valor medio alrededor del cual oscila la función.
- **Desfase horizontal** $-b$: desplazamiento lateral del ciclo básico ($\phi = -b$ comúnmente denotado).




Figura 3.18: Componentes de la forma amplitud-fase.

Esta parametrización es fundamental para modelar fenómenos oscilatorios (resortes, ondas, circuitos AC) donde la amplitud, frecuencia y fase determinan el comportamiento físico observado.

3.4

Funciones inversas

Muchos fenómenos físicos y matemáticos admiten dos perspectivas complementarias. Considere, por ejemplo, el proceso productivo de una planta de muebles: dada una cantidad de tiempo t , podemos determinar la cantidad de muebles producidos $f(t)$; alternatively, dada una cantidad específica de muebles y , podríamos determinar el tiempo necesario para producirlos $t = f^{-1}(y)$.

En este contexto, si $y = f(t)$ describe la producción acumulada en función del tiempo, la función inversa f^{-1} responde a la pregunta “¿en cuánto tiempo se producen y muebles?”. Para que esta operación inversa sea bien definida matemáticamente, es necesario garantizar que cada valor y en el rango de f corresponda a un único x en el dominio, condición que formalizamos mediante el concepto de inyectividad.

Definición 3.30 (Función inyectiva). Una función $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ es **inyectiva** si para todo par de elementos distintos $x_1, x_2 \in D$ se cumple:

$$x_1 \neq x_2 \implies f(x_1) \neq f(x_2).$$

Equivalentemente, $f(a) = f(b)$ implica $a = b$ para todo $a, b \in D$.

Observación 3.31 (Prueba de la recta horizontal). Una función f es inyectiva si y solo si ninguna recta horizontal $y = k$ (con $k \in \mathbb{R}$) interseca su gráfica en más de un punto. Esta condición geométrica es equivalente a la definición algebraica anterior y proporciona un criterio visual directo para verificar la inyectividad.

La inyectividad garantiza que cada valor en el rango de f proviene de exactamente un elemento del dominio, condición necesaria y suficiente para que exista una función inversa bien definida $f^{-1} : \text{Ran}(f) \rightarrow D$ tal que: $f(f^{-1}(y)) = y$ y $f^{-1}(f(x)) = x$.

Este contexto nos permite introducir rigurosamente el concepto de función inversa.

Definición 3.32 (Función inversa). Sea $f : D \rightarrow R$ una función inyectiva, con dominio D y rango (imagen) $R = f(D)$. La **función inversa** de f , denotada por $f^{-1} : R \rightarrow D$, se define mediante la relación

$$f^{-1}(y) = x \iff f(x) = y,$$

para todo $y \in R$ y el único $x \in D$ que satisface dicha igualdad. En otras palabras, f^{-1} “deshace” la acción de f .

Observación 3.33. En general, $f^{-1} \neq \frac{1}{f}$: la notación f^{-1} no denota recíproco, sino función inversa. Además, cuando f es inyectiva se satisfacen las identidades de composición

$$f^{-1}(f(x)) = x \quad \text{para todo } x \in D,$$

$$f(f^{-1}(y)) = y \quad \text{para todo } y \in R.$$

Estas igualdades permiten calcular analíticamente la función inversa: dada la ecuación $y = f(x)$, se despeja x en términos de y y, finalmente, se intercambian los roles de las variables (y se renombra como x).

Ejemplo 3.34. Determine una fórmula para la inversa de las funciones $y = \frac{4x - 1}{2x + 3}$ y $y = 2x - 3$.

Solución: 1. Inversa de $y = \frac{4x - 1}{2x + 3}$.

Partimos de la ecuación

$$y = \frac{4x - 1}{2x + 3}.$$

Paso 1: Intercambiamos x e y para reflejar la inversión:

$$x = \frac{4y - 1}{2y + 3}.$$

Paso 2: Despejamos y en términos de x . Multiplicamos ambos lados por $2y + 3$:

$$x(2y + 3) = 4y - 1.$$

Distribuimos:

$$2xy + 3x = 4y - 1.$$

Paso 3: Reagrupamos los términos que contienen y en un lado:

$$2xy - 4y = -1 - 3x.$$

Factorizamos y :

$$y(2x - 4) = -1 - 3x.$$

Paso 4: Despejamos y :

$$y = \frac{-1 - 3x}{2x - 4}.$$

Podemos multiplicar numerador y denominador por -1 para simplificar:

$$y = \frac{3x + 1}{4 - 2x}.$$

Por lo tanto,

$$f^{-1}(x) = \frac{3x + 1}{4 - 2x}.$$

2. Inversa de $y = 2x - 3$.

Partimos de

$$y = 2x - 3.$$

Paso 1: Intercambiamos x e y :

$$x = 2y - 3.$$

Paso 2: Despejamos y en términos de x :

$$x + 3 = 2y \implies y = \frac{x + 3}{2}.$$

Por tanto,

$$f^{-1}(x) = \frac{x + 3}{2}.$$

En ambos casos, puede verificarse la corrección comprobando que $f^{-1}(f(x)) = x$ y $f(f^{-1}(x)) = x$ en los dominios correspondientes.

Después del contexto establecido sobre funciones inversas, las funciones trigonométricas básicas ($\sin x$, $\cos x$, etc.) no son globalmente inyectivas debido a su periodicidad. Para definir sus inversas, se restringen a intervalos *principales* donde cada una es biyectiva (inyectiva y sobreyectiva) sobre su rango. Estas funciones trigonométricas inversas se definen a continuación:

Definición 3.35 (Funciones trigonométricas inversas). Las seis funciones trigonométricas inversas fundamentales se definen con dominios y rangos específicos que garantizan su inyectividad:

Función	Dominio (principal)	Rango
$\arcsin x$	$[-1, 1]$	$\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$
$\arccos x$	$[-1, 1]$	$[0, \pi]$
$\arctan x$	$\mathbb{R}$	$\left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$
$\operatorname{arccot} x$	$\mathbb{R}$	$(0, \pi)$
$\operatorname{arcsec} x$	$(-\infty, -1] \cup [1, +\infty)$	$[0, \pi] \setminus \{\frac{\pi}{2}\}$
$\operatorname{arccsc} x$	$(-\infty, -1] \cup [1, +\infty)$	$\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right] \setminus \{0\}$




Figura 3.19: Función arcoseno: dominio $[-1, 1]$, rango $[-\pi/2, \pi/2]$




Figura 3.20: Función arcocoseno: dominio $[-1, 1]$, rango $[0, \pi]$




Figura 3.21: Función arcotangente: dominio $(-\infty, \infty)$, rango $(-\pi/2, \pi/2)$

3.5

Operaciones con logaritmos y exponenciales naturales

Concluimos este capítulo presentando las propiedades fundamentales de las funciones exponenciales y logarítmicas, esenciales para el desarrollo del cálculo diferencial. En particular, se destaca el número $e \approx 2,71828$, cuya función asociada $y = e^x$ tiene pendiente igual a 1 en el punto $(0, 1)$. Esta característica se demostrará formalmente en el capítulo de límites. Por ahora, estudiaremos las leyes algebraicas que gobiernan las operaciones con potencias, exponentes y logaritmos.

Teorema 3.36 (Leyes de los exponentes). Sean $a, b > 0$ y $x, y \in \mathbb{R}$. Se cumplen las siguientes propiedades:

- 1. $b^{x+y} = b^x b^y$
- 2. $b^{x-y} = \frac{b^x}{b^y}$
- 3. $(b^x)^y = b^{xy}$
- 4. $(ab)^x = a^x b^x$

Teorema 3.37 (Leyes de los logaritmos). Sea $b > 0$ con $b \neq 1$, y sean $x, y > 0$ y $r \in \mathbb{R}$. Entonces se verifican las siguientes propiedades:

- 1. $\log_b(xy) = \log_b x + \log_b y$
- 2. $\log_b\left(\frac{x}{y}\right) = \log_b x - \log_b y$
- 3. $\log_b(x^r) = r \log_b x$

Además, la definición de logaritmo establece la equivalencia $\log_b x = y \iff b^y = x$.

Definición 3.38 (Función logaritmo natural). El logaritmo natural $\ln x$ es el logaritmo de base e , es decir $\ln x = \log_e x$. Para todo $x > 0$ y $y \in \mathbb{R}$ se cumple $\ln x = y \iff e^y = x$, $\ln(e^x) = x$, y $e^{\ln x} = x$. En particular, en $x = 1$, se obtiene $\ln e = 1$.

Teorema 3.39 (Cambio de base a logaritmos naturales). Sea $b > 0$ y $b \neq 1$. Se cumple que $\log_b x = \frac{\ln x}{\ln b}$.

Demostración. Sea $y = \log_b x$. Por definición, $b^y = x$. Al aplicar logaritmos naturales a ambos lados $y \ln b = \ln x$. Despejando y , se obtiene $y = \frac{\ln x}{\ln b}$, lo que establece la fórmula de cambio de base. $\square$

3.6

Ejercicios del capítulo

Problema 3.40. Calcule el dominio de las siguientes funciones, exprese este dominio en forma de conjunto, en forma de intervalo y realice la gráfica de este intervalo:

1. $\frac{x + 4}{x^2 - 9}$

2. $\frac{2x^3 - 5}{x^2 + x - 6}$
3. $\frac{x + 1}{1 + \frac{1}{x + 1}}$

4. $\sqrt{4 - x^2}$

5. $\sqrt{\frac{(x^2 + 1)(x - 3)}{x^2 - 9}}$

6. $\sqrt{\frac{x^2 - x}{x^2 - 2x}}$

7. $x^2 + 8x + 1.$

8. $\frac{\cos x}{1 - \sin x}.$

9. $\frac{1}{1 - \tan x}.$

Problema 3.41. Construya una representación algebraica, es decir, una fórmula explícita para los siguientes problemas. Calcule el dominio de esa representación.

- 1. Un rectángulo tiene 16 m² de área. Exprese el perímetro del rectángulo en función de la longitud de uno de sus lados.
- 2. Una caja rectangular abierta con 2 m³ de volumen tiene una base cuadrada. Exprese el área superficial de la caja en función de la longitud de uno de los lados de la base.
- 3. Una ventana normanda tiene la forma de un rectángulo coronado por un semicírculo. Si el perímetro de la ventana es de 15 m, exprese el área A de la ventana en función del ancho x de la ventana.




Figura 3.22: Ventana normanda

- 4. En un determinado país, el impuesto sobre la renta se calcula como sigue. No hay impuesto sobre la renta para ingresos de hasta \$10 000. Los ingresos de más de \$10 000 se gravan con una tasa de 10 %, hasta un ingreso de \$20 000. Los ingresos superiores a \$20 000 se gravan en 15 %.
 - a) Trace la gráfica de la tasa de impuestos R en función del ingreso I .
 - b) ¿Qué impuesto corresponde a un ingreso de \$14 000? ¿Y de \$26 000?
 - c) Trace la gráfica del impuesto total T en función del ingreso I .
- 5. A un campo de forma rectangular se le colocaron 240 m de cerca. Encuentre un modelo matemático que exprese el área del terreno como una función de su longitud. ¿Cuál es el dominio de esta función?
- 6. Una página impresa contiene una región de impresión de 50 cm², un margen de 1,5cm en las partes superior e inferior y un margen de 1,5cm en los lados. Encuentre un modelo matemático que exprese el área total de la página como una función del ancho de la región de impresión. ¿Cuál es el dominio de esta función?
- 7. Se va a construir una caja sin tapa, a partir de una hoja rectangular de cartón que tiene dimensiones de 12 por 20 centímetros, recortando cuadrados iguales de lado x en cada una de las esquinas y doblando los lados como se ilustra en la figura. Exprese el volumen V de la caja en función de x .




Figura 3.23: Caja sin tapa: Hoja de cartón de 20×12 cm con cuadrados de lado x recortados en las esquinas

- 8. Un plan de telefonía celular tiene una carga básica de 35 dólares al mes. El plan incluye 400 minutos gratis y cargos de 10 centavos de dólar por cada minuto adicional de uso. Escriba el costo mensual C como una función del número x de minutos utilizados, y trace la gráfica de C como una función de x para $0 \leq x \leq 600$.
- 9. Un almacén que tiene un piso rectangular de $15\,000\text{ m}^2$ se construye de modo que tenga pasillos de 2 m de ancho en el frente y en el fondo del almacén, y pasillos de $1,5\text{ m}$ de ancho en los lados. Encuentre un modelo matemático que exprese el área total del terreno donde se construirá el almacén y los pasillos como una función de la longitud del frente y del fondo del almacén. ¿Cuál es el dominio de esta función?
- 10. Una tienda de acampar (llamada también carpa para *camping*) con forma de pirámide de base cuadrada se construye a partir de una pieza cuadrada de material de 5 cm de lado. En la base de la pirámide sea x metros la distancia del centro a uno de sus lados como se muestra en la figura. Encuentre un modelo matemático que exprese el volumen de la tienda de acampar como función de x y calcule su dominio.




Figura 3.24: Caja armada con pestañas laterales

Sugerencia: La fórmula para el volumen de una pirámide es $V = \frac{1}{3}Bh$, donde V , B y h son, respectivamente, la medida del volumen, el área de la base y la altura. Esta altura se define como la medida del segmento perpendicular del vértice de la pirámide al plano de la base.

11. El volumen de una esfera es función de su radio. Si el radio de una esfera mide r centímetros y $V(r)$ centímetros cúbicos es su volumen, entonces $V(r) = \frac{4}{3}\pi r^3$. Suponga que una bola de nieve de 70 centímetros de radio comenzó a derretirse a una tasa constante de 5 cm/min . Si $f(t)$ es el radio de la bola de nieve después de t minutos:
- a. Calcule $(V \circ f)(t)$, interprete su resultado y calcule su dominio.
 - b. Determine el volumen de la bola de nieve después de 10 minutos.
12. En un ambiente limitado donde A es el número óptimo de bacterias soportado por el ambiente, la tasa de crecimiento bacteriano es conjuntamente proporcional al número presente de bacterias y a la diferencia entre A y el número presente. Suponga que el número óptimo soportable por un ambiente particular es 1 millón de bacterias, y que la tasa de crecimiento es de 60 bacterias por minuto cuando se tienen 1000 bacterias presentes. Encuentre un modelo matemático que exprese la tasa de crecimiento bacteriano en función del número de bacterias presentes. ¿Cuál es la tasa de crecimiento cuando están presentes 100000 bacterias?
13. La población de ciertas especies en un ambiente limitado con una población inicial de 100 y capacidad de carga de 1000 es

$$P(t) = \frac{100000}{100 + 900e^{-2t}}$$

donde t se mide en años.

- a) Grafique esta función y estime cuánto tiempo le toma a la población llegar a 900.
- b) Encuentre la inversa de esta función y explique su significado.
- c) Utilice la función inversa para encontrar el tiempo necesario para que la población llegue a 900. Compare con el resultado del inciso (a).

Problema 3.42. Determine si las siguientes funciones son par, impar o ninguna de las dos.

1. $f(x) = \frac{x^2}{x^4 + 1}$
2. $f(x) = 1 + 3x^3 - x^5$

Problema 3.43. ¿Qué tienen en común todos los miembros de la familia de funciones lineales $f(x) = 1 + m(x + 3)$? Trace la gráfica de varias funciones de esta familia.

Problema 3.44. ¿Qué tienen en común todos los miembros de la familia de funciones lineales $f(x) = c - x$? Trace la gráfica de varias funciones de esta familia.

Problema 3.45. Encuentre una expresión para función cúbica f si $f(1) = 6$ y $f(-1) = f(0) = f(2) = 0$.

Problema 3.46. Algunas de las mareas más altas en el mundo ocurren en la bahía de Fundy en la costa atlántica de Canadá. En Hopewell Cape la profundidad del agua durante la marea baja es de 2.0 m y con la marea alta es de aproximadamente 12.0 m. El período natural de oscilación es de alrededor de 12 horas y el 30 de junio de 2009 la marea alta se produjo a las 6:45. Determine una función que involucre la función coseno que modele la profundidad $D(t)$ (en metros) en función del tiempo t (en horas después de la medianoche) en ese día.

Problema 3.47. Comenzando con la gráfica de $y = e^x$, encuentre la ecuación de la gráfica que resulta de:

- 1. desplazarla 2 unidades hacia abajo.
- 2. desplazarla 2 unidades a la derecha.
- 3. reflejarla con respecto al eje x .
- 4. reflejarla con respecto al eje y .
- 5. reflejarla con respecto al eje x y luego reflejarla con respecto al eje y .

Problema 3.48. Si $f(x) = x^5 + x^3 + x$, determine $f^{-1}(3)$ y $f(f^{-1}(2))$. Además, si $g(x) = 3 + x + e^x$, determine $g^{-1}(4)$.

Problema 3.49. Sea $f(x) = \sqrt{1 - x^2}$, $0 \leq x \leq 1$. Encuentre f^{-1} . ¿Cómo se relaciona con f ? Identifique la gráfica de f y complemente su respuesta anterior.

Problema 3.50. Resuelva cada ecuación para x .

1. $e^{7-4x} = 6$

2. $\ln(3x - 10) = 2$

3. $\ln(x^2 - 1) = 3$

4. $e^{2x} - 3e^x + 2 = 0$
5. $2^{x-5} = 3$

6. $\ln x + \ln(x - 1) = 1$

7. $\ln(\ln x) = 1$

8. $e^{ax} = Ce^{bx}$, donde $a \neq b$

Capítulo

4

Límites y Continuidad

El concepto de límite marca la transición del álgebra clásica al análisis matemático. Inicialmente, Newton y Leibniz basaron el cálculo en intuiciones sobre cantidades infinitamente pequeñas, lo que provocó críticas por falta de rigor, como las de Berkeley en *The Analyst* (1734), quien calificó los infinitésimos de *fantasmas de cantidades que desaparecen*. La formalización llegó con Cauchy (1821), quien definió el límite como un proceso de aproximación, y se consolidó con Weierstrass mediante la rigurosa definición ε - δ . Esta precisión permitió distinguir claramente entre *acercarse* a un valor y el valor mismo, sentando las bases del análisis moderno.

Observación 4.1. *La historia del análisis muestra cómo la intuición práctica suele preceder al rigor formal. Se recomienda complementar este capítulo con los enfoques de Purcell, Spivak y Larson, citados en la bibliografía.*

Informalmente, $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$ significa que $f(x)$ se aproxima a L tanto como se desee cuando x se acerca a a , *sin necesidad de que* $x = a$. Esta condición es crucial: el límite describe el comportamiento *alrededor* de a , no en a . Así, una función puede tener límite en puntos donde no está definida o donde su valor es distinto.

Ejemplo 4.2. Considere $f(x) = \frac{x^2 - 1}{x - 1}$ en $x = 1$.

Solución: Note que la función no está definida en $x = 1$, pero para $x \neq 1$ se simplifica a $f(x) = x + 1$. Al acercarse a 1, $f(x) \rightarrow 2$. Es decir, $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 2$, aunque $f(1)$ no exista. La figura 4.1 ilustra este comportamiento:




Figura 4.1: Representación gráfica de la discontinuidad evitable en $x = 1$.

4.1

Definición Formal: Épsilon-Delta

El trabajo de Weierstrass permite definir este concepto de manera formal:

Definición 4.3. Sea f definida en un intervalo abierto que contiene a c , excepto quizás en c mismo. Se dice que $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = L$ si para todo $\epsilon > 0$ existe $\delta > 0$ tal que

$$0 < |x - c| < \delta \implies |f(x) - L| < \epsilon.$$

Esta definición traduce la noción intuitiva de “acercarse” a una condición cuantitativa. El valor ϵ fija una tolerancia vertical en la imagen, mientras que δ determina la proximidad horizontal requerida en el dominio para cumplirla. La condición $0 < |x - c|$ recalca que el comportamiento de f *exactamente* en c es irrelevante; solo importa su entorno perforado.

Observación 4.4. Puede interpretarse como un **juego adversarial**: un “retador” elige un $\epsilon > 0$ arbitrario y el “defensor” debe hallar un $\delta > 0$ que satisfaga la implicación. Si el defensor siempre puede responder, sin importar cuán pequeño sea ϵ , el límite es L . Esta analogía, destacada por Spivak [Spivak, 2012], es una herramienta pedagógica poderosa para asimilar el concepto.

Ejemplo 4.5. Demostrar que $\lim_{x \rightarrow 3} (2x - 1) = 5$ mediante la definición ϵ - δ .

Solución: Dado $\epsilon > 0$, busquemos $\delta > 0$ tal que

$$0 < |x - 3| < \delta \implies |(2x - 1) - 5| < \epsilon.$$

Observamos que $|(2x - 1) - 5| = |2x - 6| = 2|x - 3|$. Para garantizar $2|x - 3| < \epsilon$, basta exigir $|x - 3| < \epsilon/2$. Elegimos $\delta = \epsilon/2$. Entonces, si $0 < |x - 3| < \delta$:

$$|(2x - 1) - 5| = 2|x - 3| < 2 \cdot \frac{\epsilon}{2} = \epsilon. \quad \square$$




Figura 4.2: Interpretación geométrica del límite

Teorema 4.6 (Unicidad del límite). Si $\lim_{x \rightarrow c} f(x)$ existe, entonces es único.

Solución: Supongamos, por contradicción, que existen dos límites distintos $L_1 \neq L_2$. Sea $\epsilon = \frac{|L_1 - L_2|}{2} > 0$. Por la definición, existen $\delta_1, \delta_2 > 0$ tales que:

$$0 < |x - c| < \delta_1 \implies |f(x) - L_1| < \epsilon, \quad 0 < |x - c| < \delta_2 \implies |f(x) - L_2| < \epsilon.$$

Tomando $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2\}$, para cualquier x con $0 < |x - c| < \delta$ se cumplen ambas desigualdades. Aplicando la desigualdad triangular:

$$|L_1 - L_2| \leq |L_1 - f(x)| + |f(x) - L_2| < \epsilon + \epsilon = 2\epsilon = |L_1 - L_2|,$$

lo cual es absurdo. Por tanto, $L_1 = L_2$. $\square$

4.2

Propiedades Algebraicas de los Límites

Los límites satisfacen las siguientes propiedades algebraicas:

Teorema 4.7 (Leyes de los límites). Sean $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = L$ y $\lim_{x \rightarrow c} g(x) = K$, con $k \in \mathbb{R}$:

- 1. $\lim_{x \rightarrow c} k = k$.
- 2. $\lim_{x \rightarrow c} [f(x) \pm g(x)] = L \pm K$.
- 3. $\lim_{x \rightarrow c} [k \cdot f(x)] = kL$.
- 4. $\lim_{x \rightarrow c} [f(x) \cdot g(x)] = LK$.
- 5. $\lim_{x \rightarrow c} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{L}{K}$, siempre que $K \neq 0$.
- 6. $\lim_{x \rightarrow c} [f(x)]^n = L^n$, $n \in \mathbb{N}$.
- 7. $\lim_{x \rightarrow c} \sqrt[n]{f(x)} = \sqrt[n]{L}$, con $L > 0$ si n es par.

Observación 4.8. Gracias a estas propiedades, el límite de cualquier función polinómica

$$p(x) = a_n x^n + \dots + a_0$$

en un punto c se reduce simplemente a evaluar $p(c)$. Esto justifica el procedimiento de **sustitución directa** que se utiliza en la gran mayoría de los cálculos elementales.

En muchas funciones de interés práctico como la función valor absoluto, la función piso o las funciones definidas por casos el comportamiento difiere según si x se acerca por valores menores o mayores que c .

Definición 4.9 (Límites laterales). L es el **límite por la derecha** de f en c , $\lim_{x \rightarrow c^+} f(x) = L$, si para todo $\epsilon > 0$ existe $\delta > 0$ tal que $0 < x - c < \delta$ implica $|f(x) - L| < \epsilon$. Análogamente, $\lim_{x \rightarrow c^-} f(x) = L$ si $0 < c - x < \delta$ implica $|f(x) - L| < \epsilon$.

Teorema 4.10 (Condición de existencia del límite bilateral). $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = L$ si y solo si $\lim_{x \rightarrow c^+} f(x) = L$ y $\lim_{x \rightarrow c^-} f(x) = L$.

Ejemplo 4.11. Calcular $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{|x|}{x}$.

Solución: El límite por la derecha es 1 y por la izquierda es -1 ; como difieren, $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{|x|}{x}$ no existe.

Ejemplo 4.12. Sea

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + 1 & \text{si } x < 2, \\ 3x - 1 & \text{si } x \geq 2. \end{cases}$$

Determinar si $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$ existe.

Solución: $\lim_{x \rightarrow 2^-} (x^2 + 1) = 5$ y $\lim_{x \rightarrow 2^+} (3x - 1) = 5$. Como ambos límites laterales coinciden, $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = 5$.

4.3

El Teorema del Encaje

Este teorema permite calcular varios límites y es la base de múltiples demostraciones.

Teorema 4.13 (Del encaje o del sándwich). *Si $h(x) \leq f(x) \leq g(x)$ en algún intervalo abierto que contiene a c (salvo posiblemente en c), y $\lim_{x \rightarrow c} h(x) = \lim_{x \rightarrow c} g(x) = L$, entonces $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = L$.*

La idea geométrica es transparente: si f queda permanentemente comprimida entre h y g que convergen al mismo valor, f tampoco tiene escapatoria. Su aplicación más célebre es el límite trigonométrico fundamental.

Teorema 4.14. Demuestre que $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$.

Solución: Sea $0 < x < \frac{\pi}{2}$. Considérese el círculo unitario centrado en el origen y los puntos $O = (0, 0)$, $A = (1, 0)$, $B = (\cos x, \sin x)$ sobre dicho círculo, y $T = (1, \tan x)$ sobre la recta $x = 1$ (véase la figura).




Figura 4.3: Comparación de áreas: triángulo inscrito $\subset$ sector $\subset$ triángulo circunscrito.

Comparando las tres áreas coloreadas se obtiene la cadena

$$\underbrace{\frac{1}{2} \sin x}_{\triangle OAB} \leq \underbrace{\frac{x}{2}}_{\text{sector}} \leq \underbrace{\frac{1}{2} \tan x}_{\triangle OAT}.$$

Dividiendo por $\frac{1}{2} \sin x > 0$ y usando que $\tan x = \sin x / \cos x$:

$$1 \leq \frac{x}{\sin x} \leq \frac{1}{\cos x}.$$

Tomando recíprocos (lo que invierte las desigualdades):

$$\cos x \leq \frac{\sin x}{x} \leq 1.$$

Como $\lim_{x \rightarrow 0^+} \cos x = 1$, el Teorema del Encaje da

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sin x}{x} = 1.$$

La función $f(x) = \frac{\sin x}{x}$ es par (pues $\sin(-x) = -\sin x$), de modo que $f(-x) = f(x)$ y, en consecuencia,

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{\sin x}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sin(-x)}{-x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sin x}{x} = 1.$$

Al coincidir ambos límites laterales se concluye $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$.

Observación 4.15. Como corolario inmediato, usando la identidad $1 - \cos x = 2 \sin^2 \frac{x}{2}$, se puede demostrar que $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x} = 0$. Estos dos límites son la base sobre la que se construyen las fórmulas de derivación de $\sin x$ y $\cos x$.

4.4

Límites Infinitos y en el Infinito

Definición 4.16. Se dice que $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = +\infty$ si para todo $M > 0$ existe $\delta > 0$ tal que $0 < |x - c| < \delta$ implica $f(x) > M$. Geométricamente, la recta $x = c$ es una **asíntota vertical** de la gráfica de f .

Se dice que $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = L$ si para todo $\epsilon > 0$ existe $N > 0$ tal que $x > N$ implica $|f(x) - L| < \epsilon$. En este caso, la recta $y = L$ es una **asíntota horizontal**.

Observación 4.17. El comportamiento de funciones racionales proporciona los ejemplos más instructivos. En $f(x) = \frac{1}{x-2}$, los valores crecen sin cota cuando $x \rightarrow 2$, generando una asíntota vertical en $x = 2$. En cambio, $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x-2} = 0$ da la asíntota horizontal $y = 0$.

Para funciones racionales $\frac{P(x)}{Q(x)}$, el comportamiento en el infinito está completamente determinado por la relación entre los grados de P y Q :

- Si $\deg P < \deg Q$: asíntota horizontal $y = 0$.

- Si $\deg P = \deg Q$: *asíntota horizontal* $y = \frac{a_n}{b_n}$ (cociente de coeficientes líderes).
- Si $\deg P > \deg Q$: *no hay asíntota horizontal*.

4.5

Continuidad

Definición 4.18. f es **continua** en c si se satisfacen simultáneamente:

1. $f(c)$ está definida.
2. $\lim_{x \rightarrow c} f(x)$ existe.
3. $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = f(c)$.

Si alguna condición falla, f es **discontinua** en c . f es continua en un intervalo cerrado $[a, b]$ si es continua en (a, b) , y además $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = f(a)$ y $\lim_{x \rightarrow b^-} f(x) = f(b)$.

La imagen intuitiva de continuidad “se puede trazar la gráfica sin levantar el lápiz” captura bien la idea pero es insuficiente como definición matemática. Nótese que la continuidad en $[a, b]$ requiere únicamente límites laterales en los extremos, lo cual permite que funciones como $f(x) = \sqrt{x}$ sean continuas en $[0, +\infty)$.

Definición 4.19. Sea f discontinua en c . Se distinguen:

- **Removable:** $\lim_{x \rightarrow c} f(x)$ existe pero es distinto de $f(c)$, o bien $f(c)$ no está definida. Se elimina redefiniendo $f(c) := \lim_{x \rightarrow c} f(x)$.
- **De salto:** los límites laterales existen pero $\lim_{x \rightarrow c^-} f(x) \neq \lim_{x \rightarrow c^+} f(x)$. El *salto* mide

$$\left| \lim_{x \rightarrow c^+} f(x) - \lim_{x \rightarrow c^-} f(x) \right|.$$

- **Infinita:** al menos un límite lateral es $\pm\infty$; corresponde a una asíntota vertical.
- **Oscilante:** el límite no existe por oscilación sin convergencia, como $\sin\left(\frac{1}{x}\right)$ en $x = 0$.

Observación 4.20. Una función acotada Riemann-integrable en $[a, b]$ puede tener discontinuidades, pero únicamente en un conjunto de **medida nula** (Lebesgue). Esto explica por qué la función de Thomae discontinua en todos los racionales, pero sobre un conjunto de medida nula es Riemann-integrable, mientras que la función de Dirichlet discontinua en todos los reales no lo es.

4.6

El Teorema del Valor Intermedio

Teorema 4.21 (Teorema del Valor Intermedio (TVI)). Si f es continua en $[a, b]$ y k es cualquier número estrictamente comprendido entre $f(a)$ y $f(b)$ (con $f(a) \neq f(b)$), entonces existe al menos un $c \in (a, b)$ tal que $f(c) = k$.

El TVI es un resultado de *existencia*, no de construcción. Su demostración descansa sobre la **completitud** de $\mathbb{R}$: la ausencia de “huecos” en la recta real. Esta propiedad es lo que distingue fundamentalmente

a $\mathbb{R}$ de $\mathbb{Q}$: la función $f(x) = x^2$ es continua en $\mathbb{Q}$ y satisface $f(1) = 1 < 2 < 4 = f(2)$, pero $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$ implica que $k = 2$ nunca se alcanza dentro de los racionales.

Corolario 4.22 (Localización de ceros de Bolzano). *Si f es continua en $[a, b]$ y $f(a) \cdot f(b) < 0$, entonces existe al menos un $c \in (a, b)$ con $f(c) = 0$.*

Este corolario es la base del **método de bisección**: se evalúa f en el punto medio $m = \frac{a+b}{2}$; según el signo de $f(m)$, la raíz queda en $[a, m]$ o en $[m, b]$. El intervalo de incertidumbre se reduce a la mitad en cada iteración, garantizando convergencia con cualquier precisión deseada.

Ejemplo 4.23. Demostrar que $f(x) = x^3 + 2x - 1$ tiene al menos una raíz en $(0, 1)$.

Solución: f es continua en $[0, 1]$ por ser polinómica. $f(0) = -1 < 0$ y $f(1) = 2 > 0$. Como $f(0) \cdot f(1) < 0$, el Corolario de Bolzano garantiza la existencia de $c \in (0, 1)$ con $f(c) = 0$. $\square$

Ejemplo 4.24. Demostrar que $x = \cos x$ tiene solución en $\left(0, \frac{\pi}{2}\right)$.

Solución: Sea $g(x) = x - \cos x$, continua en $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$. $g(0) = -1 < 0$ y $g\left(\frac{\pi}{2}\right) = \frac{\pi}{2} > 0$. Por Bolzano existe $c \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$ con $g(c) = 0$, es decir, $c = \cos c$. $\square$

4.7

Infinitesimales Equivalentes

Una función $\alpha(x)$ se denomina **infinitesimal** cuando $x \rightarrow a$ si $\lim_{x \rightarrow a} \alpha(x) = 0$. Cuando dos infinitesimales tienden a cero en el mismo proceso límite, la razón entre ellos captura cuál desaparece más rápido.

Definición 4.25. Sean α, β infinitesimales para $x \rightarrow a$:

- 1. β es de **orden superior** a α si $\lim \frac{\beta}{\alpha} = 0$; se escribe $\beta = o(\alpha)$.
- 2. Son del **mismo orden** si $\lim \frac{\beta}{\alpha} = A \neq 0$.
- 3. Son **equivalentes**, escrito $\alpha \sim \beta$, si $\lim \frac{\beta}{\alpha} = 1$.

Observación 4.26. $\alpha \sim \beta$ si y solo si $\alpha - \beta = o(\alpha)$. Por ejemplo, $\sin x \sim x$ cuando $x \rightarrow 0$ porque $x - \sin x \sim \frac{x^3}{6}$, que tiende a cero mucho más rápido que x .

Teorema 4.27 (Sustitución de equivalentes). *Si $\alpha \sim \alpha'$ y $\beta \sim \beta'$ cuando $x \rightarrow a$, entonces*

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{\alpha}{\beta} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{\alpha'}{\beta'}.$$

Observación 4.28. La técnica es plenamente válida en **productos y cocientes**, pero debe usarse con precaución en **sumas y restas**: si los equivalentes se cancelan, es necesario recurrir a términos de orden superior mediante desarrollos de Taylor-Maclaurin.

A continuación se muestra la tabla de equivalencias fundamentales cuando $x \rightarrow 0$:

$f(x)$	$\sim$	$g(x)$	Justificación
$\sin x$	$\sim$	x	$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$
$\tan x$	$\sim$	x	$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x}{x} = 1$
$\arcsin x$	$\sim$	x	consecuencia de $\sin x \sim x$
$\arctan x$	$\sim$	x	consecuencia de $\tan x \sim x$
$1 - \cos x$	$\sim$	$\frac{x^2}{2}$	identidad $1 - \cos x = 2 \sin^2 \frac{x}{2}$
$\ln(1 + x)$	$\sim$	x	$(\ln x)' _{x=1} = 1$
$e^x - 1$	$\sim$	x	$(e^x)' _{x=0} = 1$
$a^x - 1$	$\sim$	$x \ln a$	cambio de base $a^x = e^{x \ln a}$
$(1 + x)^\alpha - 1$	$\sim$	αx	derivada de la potencia en $x = 0$
$\sqrt[n]{1 + x} - 1$	$\sim$	$\frac{x}{n}$	caso $\alpha = \frac{1}{n}$ del anterior

Observación 4.29. Todas las equivalencias de la tabla son instancias del desarrollo de Taylor de primer orden: si $f(0) = 0$, entonces $f(x) \sim f'(0) \cdot x$ cuando $x \rightarrow 0$. Esto convierte la tabla entera en el corolario de una sola idea: $(\sin x)'|_0 = 1$ da $\sin x \sim x$; $(\ln(1 + x))'|_0 = 1$ da $\ln(1 + x) \sim x$; $((1 + x)^\alpha)'|_0 = \alpha$ da $(1 + x)^\alpha - 1 \sim \alpha x$. No es necesario memorizar cada entrada por separado.

Ejemplo 4.30. Calcular $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1 + 3x)}{\sin 2x}$.

Solución: Como $\ln(1 + 3x) \sim 3x$ y $\sin 2x \sim 2x$:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1 + 3x)}{\sin 2x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{3x}{2x} = \frac{3}{2}. \quad \square$$

Ejemplo 4.31. Calcular $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{5x} - 1}{\tan 3x}$.

Solución: Como $e^{5x} - 1 \sim 5x$ y $\tan 3x \sim 3x$:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{5x} - 1}{\tan 3x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{5x}{3x} = \frac{5}{3}. \quad \square$$

Ejemplo 4.32. Calcular $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x \sin x}$.

Solución: Como $1 - \cos x \sim \frac{x^2}{2}$ y $\sin x \sim x$:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x \sin x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2/2}{x \cdot x} = \frac{1}{2}. \quad \square$$

Ejemplo 4.33. Calcular $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arcsin 2x}{\ln(1 + 4x)}$.

Solución: Como $\arcsin 2x \sim 2x$ y $\ln(1 + 4x) \sim 4x$:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arcsin 2x}{\ln(1 + 4x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x}{4x} = \frac{1}{2}. \quad \square$$

4.8

Problemas Propuestos

Problema 4.34. $\lim_{h \rightarrow 0} \left(\frac{1}{h} - \frac{1}{h\sqrt{h+1}} \right)$

Problema 4.35. $\lim_{x \rightarrow 4} \frac{x^2 + 5x + 4}{x^2 - 3x - 4}$

Problema 4.36. $\lim_{x \rightarrow 4} \frac{x^2 - 4x}{x^2 - 3x - 4}$

Problema 4.37. $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{2x^2 + 7x + 3}{x^2 - 9}$

Problema 4.38. $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 1}{x - 1}$

Problema 4.39. $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^4 + 2x + 1}{x^2 + 2x + 1}$

Problema 4.40. $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{x} - 1}{x - 1}$

Problema 4.41. $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{x} - \sqrt{x^2}}{x - 1}$

Problema 4.42. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{2} - \sqrt{1 + \cos x}}{\sin^2 x}$

Problema 4.43. $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^3 + 8}{x^2 + 8}$

Problema 4.44. $\lim_{t \rightarrow 1} \left(\frac{t}{t+1} + \frac{1}{t+1} \right)$

Problema 4.45. $\lim_{t \rightarrow 0} \left(\frac{1}{\sqrt{1+t}} - \frac{1}{t} \right)$

Problema 4.46. $\lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{x^4 - x^3}{x^2 - 1} - \frac{x^3}{x^2 - 1} \right)$

Problema 4.47. $\lim_{u \rightarrow \pi/3} \frac{1 - 2 \cos u}{\sin(u - \frac{\pi}{3})}$

Problema 4.48. $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sin x - \cos x}{\cos 2x}$

Problema 4.49. $\lim_{x \rightarrow \pi/2} \frac{2 \sin^2 x + \sin x - 1}{2 \sin^2 x - 3 \sin x + 1}$

Problema 4.50. $\lim_{x \rightarrow \pi/3} \frac{\tan^3 x - 3 \tan x}{\cos(x + \frac{\pi}{6})}$

Problema 4.51. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{\sqrt{1+x \sin x} - \sqrt{\cos x}}$

Problema 4.52. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)}{x}$

Problema 4.53. $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x^2+1}{x^2-2}\right)^{x^2}$

Problema 4.54. $\lim_{x \rightarrow 0} (1+x^2)^{\cot^2 x}$

Problema 4.55. $\lim_{x \rightarrow 1} (1+\sin \pi x)^{\cot \pi x}$

Problema 4.56. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{5x^2}{3x^2-5}$

Problema 4.57. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x-7}{4x^2+x}$

Problema 4.58. $\lim_{x \rightarrow \pi/2} \tan x$ (analizar límites laterales).

Problema 4.59. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2 - x\sqrt{x^2-1}}{x}$ *Sugerencia: racionalizar el numerador.*

Problema 4.60. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{\sqrt{n^2+1}}$. Determine si la sucesión es convergente.

Problema 4.61. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2}{\sqrt{n^3+2n+1}}$. Determine si la sucesión es convergente.

Problema 4.62. Si $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 4$ y $\lim_{x \rightarrow 1} g(x) = -2$, calcule $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{g(x)}$. Cite explícitamente las propiedades utilizadas.

Problema 4.63. ¿Existe a tal que el límite $\lim_{x \rightarrow -2} \frac{3x^2+ax+a+3}{x^2+x-2}$ exista? Si es así, encuentre a y el valor del límite.

Problema 4.64. Encuentre las asíntotas verticales de $f(x) = \frac{x^2}{16-x^2}$ y verifique el tipo de infinito en cada una.

Problema 4.65. Encuentre las asíntotas horizontales de $f(x) = \frac{x^2}{16-x^2}$.

Problema 4.66. Encuentre todas las asíntotas horizontales y verticales de $f(x) = \frac{x^2}{x^2-4}$. Grafique indicando las asíntotas.

Problema 4.67. Encuentre todas las asíntotas horizontales y verticales de $f(x) = \frac{3x^2+2x+1}{2x^2-3}$.

Problema 4.68. Halle $\lim_{x \rightarrow -5} \frac{5}{x+5}$ e interprete geométricamente.

Problema 4.69. Determinar los puntos de discontinuidad y su carácter para

$f(x) = \frac{x}{(1+x)^2}, \quad x \neq -1; \quad f(-1) = 0.$

Problema 4.70. Encuentre los valores de m y n para que f sea continua en $\mathbb{R}$:

a) $f(x) = \begin{cases} mx & x < 3 \\ n & x = 3 \\ -2x+9 & x > 3 \end{cases}$

b) $f(x) = \begin{cases} mx - n & x < 1 \\ 5 & x = 1 \\ mn + 2 & x > 1 \end{cases}$

c) $f(x) = \begin{cases} 2x + 1 & x \leq 3 \\ mx + n & 3 < x < 5 \\ 2x + 5 & x \geq 5 \end{cases}$

Problema 4.71. Estudie la continuidad de $f(x) = \frac{\sqrt{x^2 - 1}}{x^4 - x^3 - x^2 + x}$ clasificando cada punto de discontinuidad según su tipo.

Problema 4.72. Trace la gráfica de $f(x) = |\sin x|$ e indique y clasifique todos los puntos de discontinuidad, si los hay.

Problema 4.73. Trace la gráfica de $f(x) = |\cos x|$ e indique y clasifique todos los puntos de discontinuidad, si los hay.

Problema 4.74. En febrero del 2000 el costo de enviar una carta era 33 centavos por la primera onza y 22 adicionales por cada onza o fracción hasta 13 onzas.

- a) ¿Cuál es el dominio de la función costo?
- b) ¿Es la función continua en todo su dominio? Justifique.

Problema 4.75. Suponga que f es continua en $[0, 1]$ excepto en $x = 0,25$, y que $f(0) = 1$, $f(1) = 3$. Sea $N = 2$. Trace dos posibles gráficas de f : una en que no satisfaga la conclusión del TVI, y otra en que sí la satisfaga aun sin cumplir la hipótesis de continuidad completa.

Problema 4.76 (El monje tibetano). Un monje sale del monasterio a las 7:00 y llega a la cima a las 19:00. Al día siguiente regresa por la misma ruta en el mismo horario. Mediante el TVI demuestre que existe un punto de la ruta que el monje cruzará exactamente a la misma hora en ambos días.

Problema 4.77. Demuestre que existe un número real que es exactamente uno más que su propio cubo.

Problema 4.78. Demuestre que en $[-3, 1]$ existe un número real igual a su cuadrado menos 7.

Problema 4.79. Demuestre que entre todas las esferas con $5 \leq r \leq 8$, existe al menos una con volumen de 1500 cm^3 .

Problema 4.80. ¿Tiene el polinomio $p(x) = x^{11} + x - x + 2$ raíces en $(0, 1)$? Justifique con el TVI.

Problema 4.81. La fuerza gravitacional sobre una masa unitaria a distancia r del centro de la Tierra es

$$F(r) = \begin{cases} \frac{GM}{R^3} r & r < R, \\ \frac{GM}{r^2} & r \geq R. \end{cases}$$

¿Es F continua? Justifique formalmente.

Problema 4.82. Deduzca si cada afirmación es verdadera o falsa y justifique rigurosamente:

- a) Si $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = 3$ y $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = 0$, entonces $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)}$ no existe.
- b) Si $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ existe y $\lim_{x \rightarrow a} g(x)$ no existe, entonces $\lim_{x \rightarrow a} f(x)g(x)$ no existe.
- c) Si $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \infty$ y $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = \infty$, entonces $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \infty$.
- d) Si $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \infty$ y $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = \infty$, entonces $\lim_{x \rightarrow a} [f(x) - g(x)] = 0$.
- e) Si f es un polinomio, entonces $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty$.
- f) Toda función polinómica es continua sobre $(-\infty, +\infty)$.

- g) Para $f(x) = x^5 + 3x - 1$ existe $c \in [-1, 1]$ con $f(c) = 0$.
- h) Si f y g son continuas en $x = 2$, entonces f/g es continua en 2.
- i) La función techo $f(x) = \lceil x \rceil$ no es continua en $(0, 1]$.
- j) Si $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ y $\lim_{x \rightarrow a} g(x)$ existen, entonces $\lim_{x \rightarrow a} [f(x) + g(x)]$ existe.
- k) Si f es discontinua en $x = 3$, entonces $f(3)$ no está definido.
- l) Si f es discontinua en $x = a$, entonces $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = 0$.
- m) Si f es continua en $[a, b]$ y $f(a)f(b) < 0$, entonces existe al menos una raíz de $f(x) = 0$ en (a, b) .

Capítulo

5

La Derivada

El cálculo diferencial nació de la convergencia histórica de dos problemas aparentemente distintos: uno geométrico y uno mecánico. Ambos conducen, de manera sorprendente, a la misma operación matemática.

El problema de la recta tangente. Euclides definía la tangente a un círculo como la recta que lo toca en un solo punto, definición que resulta insuficiente para curvas generales. Para la parábola $y = x^2$, por ejemplo, la recta $x = 0$ la toca en un solo punto pero no es tangente en ningún sentido útil, mientras que $y = -1$ no la toca pero se comporta “tangencialmente” cerca del vértice. La definición correcta es dinámica: la **recta tangente en P** es la posición límite de las rectas secantes que pasan por P y un punto móvil Q cuando $Q \rightarrow P$ a lo largo de la curva. La pendiente de esta recta límite es precisamente la derivada.

El problema de la velocidad instantánea. Si un objeto ocupa la posición $s(t)$ en el instante t , su **velocidad promedio** en el intervalo $[t, t + h]$ es el cociente

$$v_{\text{prom}} = \frac{s(t + h) - s(t)}{h}.$$

La **velocidad instantánea** en t es el límite de este cociente cuando $h \rightarrow 0$, es decir, la derivada $s'(t)$.

Observación 5.1. La escuela rusa de análisis, representada por Piskunov, subraya que la derivada no debe concebirse como un objeto puramente formal, sino como la **tasa de variación instantánea** de una cantidad respecto a otra. Este punto de vista físico —la derivada como razón entre incrementos infinitamente pequeños $\Delta y/\Delta x$ — complementa la definición abstracta de límite y facilita la intuición en problemas aplicados.

Definición 5.2. Sea f una función definida en un intervalo abierto que contiene a c . La **derivada de f en c** se define como

$$f'(c) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(c + h) - f(c)}{h},$$

siempre que este límite exista y sea finito. Si existe, se dice que f es **derivable** (o **diferenciable**) en c .

Una forma equivalente, obtenida mediante la sustitución $x = c + h$ (de modo que $h \rightarrow 0$ equivale a $x \rightarrow c$), es:

$$f'(c) = \lim_{x \rightarrow c} \frac{f(x) - f(c)}{x - c}.$$

Esta segunda presentación resalta la naturaleza de la derivada como la pendiente de la recta secante cuando un punto se desplaza hacia el otro a lo largo de la curva. Ambas son expresiones del mismo concepto y se usan indistintamente según conveniencia.

Cuando la derivada existe en *todo* punto de un intervalo, se obtiene una nueva función f' llamada la **función derivada** de f :

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x + h) - f(x)}{h}.$$

Ejemplo 5.3. Calcular $f'(x)$ para $f(x) = x^2$ usando la definición.

Solución:

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(x + h)^2 - x^2}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{x^2 + 2xh + h^2 - x^2}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{2xh + h^2}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} (2x + h) = 2x. \quad \square$$

Ejemplo 5.4. Calcular $f'(x)$ para $f(x) = \sqrt{x}$ usando la definición.

Solución: Racionalizamos el numerador multiplicando por el conjugado:

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x+h} - \sqrt{x}}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(\sqrt{x+h} - \sqrt{x})(\sqrt{x+h} + \sqrt{x})}{h(\sqrt{x+h} + \sqrt{x})} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h}{h(\sqrt{x+h} + \sqrt{x})} = \frac{1}{2\sqrt{x}}. \quad \square$$

El cálculo heredó notaciones de distintas escuelas históricas, cada una con ventajas propias:

Notación	Símbolo	Énfasis
Lagrange (prima)	$f'(x), y'$	La derivada como nueva función
Leibniz (fracción)	$\frac{dy}{dx}, \frac{df}{dx}$	Cociente de diferenciales; útil en regla de la cadena
Newton (punto)	$\dot{y}$	Derivada respecto al tiempo (mecánica)
Operador	$D_x f, Df$	La derivación como operador lineal

Para $y = x^3$, las cuatro notaciones expresan el mismo resultado:

$$f'(x) = 3x^2, \quad \frac{dy}{dx} = 3x^2, \quad \dot{y} = 3x^2, \quad D_x(x^3) = 3x^2.$$

Observación 5.5. La notación de Leibniz $\frac{dy}{dx}$ no es una fracción en el sentido usual, pero se comporta como tal en la regla de la cadena y en los cambios de variable. Esta ambigüedad es pedagógicamente útil pero requiere cuidado: $\frac{dy}{dx}$ es el límite de un cociente, no el cociente de dos cantidades independientes. Será en el estudio de las diferenciales donde dy y dx adquirirán significado autónomo preciso.

Una de las propiedades importantes de la derivada se resume a continuación:

Teorema 5.6. Si f es derivable en c , entonces f es continua en c .

Solución: Debemos mostrar que $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = f(c)$, es decir, que $\lim_{x \rightarrow c} [f(x) - f(c)] = 0$. Para $x \neq c$:

$$f(x) - f(c) = \frac{f(x) - f(c)}{x - c} \cdot (x - c).$$

Tomando el límite cuando $x \rightarrow c$ y usando que el primer factor converge a $f'(c)$ y el segundo a 0:

$$\lim_{x \rightarrow c} [f(x) - f(c)] = f'(c) \cdot 0 = 0. \quad \square$$

Observación 5.7. *El recíproco es falso: la continuidad no implica derivabilidad. La función $f(x) = |x|$ es continua en $x = 0$, pero no derivable allí. En efecto:*

$$\lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{|h| - 0}{h} = 1, \quad \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{|h| - 0}{h} = -1.$$

Como los límites laterales difieren, la derivada no existe en $x = 0$. Geométricamente, los puntos de no derivabilidad corresponden a **esquinas** (como en $|x|$), **cúspides** (como en $x^{2/3}$) o puntos con tangente vertical (como en $x^{1/3}$).

Observación 5.8. La función de Weierstrass (1872) fue el primer ejemplo de una función continua en todos los puntos pero derivable en ninguno. Se define como $W(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a^n \cos(b^n \pi x)$, con $0 < a < 1$ y

b un entero impar tal que $ab > 1 + \frac{3\pi}{2}$. Este descubrimiento sacudió la intuición geométrica de la época y subrayó que la continuidad y la derivabilidad son conceptos genuinamente distintos.

5.1

Reglas Algebraicas de Derivación

Las siguientes reglas se demuestran a partir de la definición de límite y permiten derivar cualquier función elemental de manera mecánica.

Teorema 5.9 (Reglas fundamentales de derivación). Sean f y g funciones derivables, $k, n \in \mathbb{R}$:

- 1. **Constante:** $D_x(k) = 0$.
- 2. **Potencia:** $D_x(x^n) = nx^{n-1}$.
- 3. **Múltiplo escalar:** $D_x[kf(x)] = k f'(x)$.
- 4. **Suma / Resta:** $D_x[f(x) \pm g(x)] = f'(x) \pm g'(x)$.
- 5. **Producto:** $D_x[f(x)g(x)] = f(x)g'(x) + g(x)f'(x)$.
- 6. **Cociente:** $D_x\left[\frac{f(x)}{g(x)}\right] = \frac{g(x)f'(x) - f(x)g'(x)}{[g(x)]^2}, \quad \text{con } g(x) \neq 0$.

Para ilustrar, a continuación se demuestra la regla del producto:

Solución: Sea $F(x) = f(x)g(x)$. Sumando y restando $f(x)g(x+h)$ en el numerador del cociente incremental:

$$\begin{aligned} F'(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h)g(x+h) - f(x)g(x)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h)g(x+h) - f(x)g(x+h) + f(x)g(x+h) - f(x)g(x)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \left[g(x+h) \cdot \frac{f(x+h) - f(x)}{h} + f(x) \cdot \frac{g(x+h) - g(x)}{h} \right]. \end{aligned}$$

Como g es derivable y por tanto continua, $\lim_{h \rightarrow 0} g(x+h) = g(x)$. Tomando el límite:

$$F'(x) = g(x)f'(x) + f(x)g'(x). \quad \square$$

Observación 5.10. Las reglas 3 y 4 expresan que D_x es un **operador lineal**: $D_x(af+bg) = aD_xf+bD_xg$ para constantes a, b . Esta propiedad implica que la derivada de cualquier polinomio se obtiene derivando término a término, lo cual justifica el procedimiento estándar de sustitución directa de la regla de la potencia.

Ejemplo 5.11. Derivar $f(x) = (3x^2 - 5x + 1)(2x^3 + x)$.

Solución: Por la regla del producto con $u = 3x^2 - 5x + 1$, $v = 2x^3 + x$:

$$f'(x) = (6x - 5)(2x^3 + x) + (3x^2 - 5x + 1)(6x^2 + 1).$$

Expandiendo y simplificando:

$$f'(x) = 12x^4 + 6x^2 - 10x^3 - 5x + 18x^4 + 3x^2 - 30x^3 - 5x + 6x^2 + 1 = 30x^4 - 40x^3 + 15x^2 - 10x + 1. \quad \square$$

Ejemplo 5.12. Derivar $f(x) = \frac{x^2 + 3}{x^3 - 1}$.

Solución: Por la regla del cociente:

$$f'(x) = \frac{(x^3 - 1)(2x) - (x^2 + 3)(3x^2)}{(x^3 - 1)^2} = \frac{2x^4 - 2x - 3x^4 - 9x^2}{(x^3 - 1)^2} = \frac{-x^4 - 9x^2 - 2x}{(x^3 - 1)^2}. \quad \square$$

5.2

Derivadas de las Funciones Trigonométricas

Teorema 5.13 (Derivadas de las funciones trigonométricas básicas).

$$\begin{aligned} D_x(\sin x) &= \cos x, & D_x(\cos x) &= -\sin x, \\ D_x(\tan x) &= \sec^2 x, & D_x(\cot x) &= -\csc^2 x, \\ D_x(\sec x) &= \sec x \tan x, & D_x(\csc x) &= -\csc x \cot x. \end{aligned}$$

Ejemplo 5.14. Demuestre que $D_x(\sin x) = \cos x$

Solución: Por definición y la identidad de suma del seno:

$$\begin{aligned} D_x(\sin x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin(x + h) - \sin x}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin x \cos h + \cos x \sin h - \sin x}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \left[\sin x \cdot \frac{\cos h - 1}{h} + \cos x \cdot \frac{\sin h}{h} \right]. \end{aligned}$$

Aplicando los límites trigonométricos fundamentales $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin h}{h} = 1$ y $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\cos h - 1}{h} = 0$:

$$D_x(\sin x) = \sin x \cdot 0 + \cos x \cdot 1 = \cos x. \quad \square$$

Observación 5.15. Las cuatro derivadas restantes se obtienen combinando los dos resultados básicos con las identidades trigonométricas y la regla del cociente. Por ejemplo, $D_x(\tan x) = D_x\left(\frac{\sin x}{\cos x}\right) = \frac{\cos^2 x + \sin^2 x}{\cos^2 x} = \sec^2 x$.

5.3

Regla de la Cadena

Teorema 5.16 (Regla de la cadena). Si g es derivable en x y f es derivable en $g(x)$, entonces la función compuesta $h = f \circ g$ es derivable en x y $h'(x) = f'(g(x)) \cdot g'(x)$.

En notación de Leibniz, si $y = f(u)$ y $u = g(x)$ entonces $\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \frac{du}{dx}$.

La demostración de la regla de la cadena se realiza así:

Solución: Definimos la función auxiliar

$$\phi(k) = \begin{cases} \frac{f(g(x) + k) - f(g(x))}{k} & k \neq 0, \\ f'(g(x)) & k = 0, \end{cases}$$

de modo que ϕ es continua en $k = 0$ y satisface $f(g(x) + k) - f(g(x)) = \phi(k) \cdot k$ para todo k . Sea $k = g(x + h) - g(x)$; entonces:

$$\frac{h(x + h) - h(x)}{h} = \frac{f(g(x + h)) - f(g(x))}{h} = \phi(k) \cdot \frac{g(x + h) - g(x)}{h}.$$

Cuando $h \rightarrow 0$, $k \rightarrow 0$ (por continuidad de g), así que $\phi(k) \rightarrow \phi(0) = f'(g(x))$ y el segundo factor tiende a $g'(x)$:

$$h'(x) = f'(g(x)) \cdot g'(x). \quad \square$$

Observación 5.17. La demostración directa con el cociente $\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{\Delta y}{\Delta u} \cdot \frac{\Delta u}{\Delta x}$ es tentadora pero incorrecta: Δu puede ser cero para valores arbitrariamente pequeños de Δx , generando una división por cero. La función auxiliar ϕ corrige exactamente este problema al redefinir el cociente cuando el denominador se anula.

Observación 5.18. Un protocolo útil para aplicar la regla de la cadena es el siguiente:

1. Identificar la función **exterior** f y la función **interior** g , de modo que el integrando sea $f(g(x))$.
2. Derivar f sin tocar el argumento interno: $f'(g(x))$.
3. Multiplicar por la derivada de la función interior: $g'(x)$.

Ejemplo 5.19. Derivar $y = \sin(x^2)$.

Solución: $f(u) = \sin u$, $g(x) = x^2$; $f'(u) = \cos u$, $g'(x) = 2x$:

$$y' = \cos(x^2) \cdot 2x = 2x \cos(x^2). \quad \square$$

Ejemplo 5.20. Derivar $y = (3x^2 + 5)^{10}$.

Solución: $f(u) = u^{10}$, $g(x) = 3x^2 + 5$:

$$y' = 10(3x^2 + 5)^9 \cdot 6x = 60x(3x^2 + 5)^9. \quad \square$$

Ejemplo 5.21. Derivar $y = \sqrt{\sin(e^x)}$.

Solución: Tres capas: $f(u) = \sqrt{u}$, $g(v) = \sin v$, $p(x) = e^x$:

$$y' = \frac{1}{2\sqrt{\sin(e^x)}} \cdot \cos(e^x) \cdot e^x = \frac{e^x \cos(e^x)}{2\sqrt{\sin(e^x)}}. \quad \square$$

Ejemplo 5.22. Derivar $y = \tan^3(5x)$.

Solución: Reescribimos $y = [\tan(5x)]^3$; tres capas: potencia, tangente, lineal:

$$y' = 3 \tan^2(5x) \cdot \sec^2(5x) \cdot 5 = 15 \tan^2(5x) \sec^2(5x). \quad \square$$

5.4

Derivadas de Funciones Exponenciales y Logarítmicas

Teorema 5.23 (Derivadas exponenciales y logarítmicas).

$$D_x(e^x) = e^x, \quad D_x(a^x) = a^x \ln a \quad (a > 0, a \neq 1),$$

$$D_x(\ln x) = \frac{1}{x} \quad (x > 0), \quad D_x(\ln |x|) = \frac{1}{x} \quad (x \neq 0),$$

$$D_x(\log_a x) = \frac{1}{x \ln a}.$$

Ejemplo 5.24. Demuestre que $D_x(\ln x) = \frac{1}{x}$.

Solución:

$$D_x(\ln x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\ln(x+h) - \ln x}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \ln\left(\frac{x+h}{x}\right) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{x} \cdot \frac{x}{h} \ln\left(1 + \frac{h}{x}\right).$$

Sea $t = \frac{h}{x}$; cuando $h \rightarrow 0$, $t \rightarrow 0$:

$$= \frac{1}{x} \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\ln(1+t)}{t} = \frac{1}{x} \cdot 1 = \frac{1}{x},$$

donde se usó la equivalencia $\ln(1+t) \sim t$ demostrada en el capítulo anterior. $\square$

Ejemplo 5.25. Derivar $f(x) = e^{3x^2-1}$.

Solución: Regla de la cadena con $u = 3x^2 - 1$: $f'(x) = e^{3x^2-1} \cdot 6x = 6xe^{3x^2-1}$. $\square$

Ejemplo 5.26. Derivar $f(x) = \ln(\sin x)$.

Solución: $f'(x) = \frac{1}{\sin x} \cdot \cos x = \cot x$. $\square$

Ejemplo 5.27. Derivar $f(x) = x^2 \cdot 3^x$.

Solución: Regla del producto: $f'(x) = 2x \cdot 3^x + x^2 \cdot 3^x \ln 3 = x 3^x(2 + x \ln 3)$. $\square$

5.5

Derivadas de Orden Superior

Si f' es a su vez derivable, se puede calcular su derivada, llamada la **segunda derivada** de f . El proceso puede repetirse indefinidamente.

Definición 5.28. La **derivada de orden n** de f , denotada $f^{(n)}(x)$, $\frac{d^n y}{dx^n}$ o $D_x^n f$, se define inductivamente como la derivada de $f^{(n-1)}$.

Orden	Notación prima	Notación Leibniz
Primera	$f'(x)$	$\frac{dy}{dx}$
Segunda	$f''(x)$	$\frac{d^2y}{dx^2}$
Tercera	$f'''(x)$	$\frac{d^3y}{dx^3}$
n -ésima	$f^{(n)}(x)$	$\frac{d^ny}{dx^n}$

Interpretación física. Si $s(t)$ es la posición de un objeto, entonces $s'(t)$ es la **velocidad**, $s''(t)$ es la **aceleración** y $s'''(t)$ es el **tirón** (*jerk*), que mide la variación de la aceleración y es relevante en ingeniería de confort (diseño de vehículos y elevadores).

Ejemplo 5.29. Sea $y = x^4 - 3x^3 + 2x$. Calcular todas las derivadas no nulas.

Solución:

$y' = 4x^3 - 9x^2 + 2, \quad y'' = 12x^2 - 18x, \quad y''' = 24x - 18, \quad y^{(4)} = 24, \quad y^{(5)} = 0. \quad \square$

Ejemplo 5.30. Demostrar que $y = e^x \sin x$ satisface $y'' - 2y' + 2y = 0$.

Solución: $y' = e^x \sin x + e^x \cos x = e^x(\sin x + \cos x)$. $y'' = e^x(\sin x + \cos x) + e^x(\cos x - \sin x) = 2e^x \cos x$. Sustituyendo:

$y'' - 2y' + 2y = 2e^x \cos x - 2e^x(\sin x + \cos x) + 2e^x \sin x = 2e^x \cos x - 2e^x \cos x = 0. \quad \square$

Teorema 5.31 (Fórmula de Leibniz para el producto). *Si f y g tienen derivadas hasta el orden n :*

$$(fg)^{(n)} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} f^{(k)} g^{(n-k)}.$$

Observación 5.32. *La fórmula de Leibniz es formalmente análoga al binomio de Newton, con potencias reemplazadas por derivadas. Es especialmente útil cuando uno de los factores es un polinomio, pues sus derivadas se anulan a partir de cierto orden.*

5.6

Derivación Implícita

Cuando una relación entre x e y está dada por $F(x, y) = 0$ y despejar y explícitamente es difícil o imposible, se utiliza la **derivación implícita**: se derivan ambos lados respecto a x , aplicando la regla de la cadena cada vez que se derive un término en y (pues y es una función de x).

Observación 5.33. *La derivación implícita se efectúa según el siguiente protocolo:*

- 1. Derivar ambos lados de $F(x, y) = 0$ respecto a x .
- 2. Aplicar la regla de la cadena a cada término en y : $D_x[f(y)] = f'(y) \cdot \frac{dy}{dx}$.
- 3. Agrupar todos los términos con $\frac{dy}{dx}$ en un lado.
- 4. Factorizar $\frac{dy}{dx}$ y despejar.

Ejemplo 5.34. Encontrar $\frac{dy}{dx}$ para $x^3 + y^3 = 6xy$. Esta ecuación es conocida como el folio de Descartes.

Solución: Derivando implícitamente:

$$3x^2 + 3y^2 \frac{dy}{dx} = 6y + 6x \frac{dy}{dx}.$$

Agrupando y factorizando:

$$(3y^2 - 6x) \frac{dy}{dx} = 6y - 3x^2 \implies \frac{dy}{dx} = \frac{6y - 3x^2}{3y^2 - 6x} = \frac{2y - x^2}{y^2 - 2x}. \quad \square$$

Ejemplo 5.35. Encontrar $\frac{dy}{dx}$ para $y^4 + xy = 1$.

Solución:

$$4y^3 \frac{dy}{dx} + y + x \frac{dy}{dx} = 0 \implies (4y^3 + x) \frac{dy}{dx} = -y \implies \frac{dy}{dx} = \frac{-y}{4y^3 + x}. \quad \square$$

Ejemplo 5.36. Encontrar la ecuación de la recta tangente a $x^2 + y^2 = 25$ en el punto $(3, 4)$.

Solución: Derivando: $2x + 2y \frac{dy}{dx} = 0$, así que $\frac{dy}{dx} = -\frac{x}{y}$. En el punto $(3, 4)$, la pendiente de la recta es $-\frac{3}{4}$ y así la ecuación de la tangente es:

$$y - 4 = -\frac{3}{4}(x - 3) \implies 3x + 4y = 25. \quad \square$$

Teorema 5.37 (Derivada de la función inversa). *Sea f una función inyectiva y continua en un intervalo abierto I , y sea $a \in I$. Si f es derivable en a y $f'(a) \neq 0$, entonces su función inversa f^{-1} es derivable en $b = f(a)$ y se cumple que:*

$$(f^{-1})'(b) = \frac{1}{f'(a)}$$

o de manera equivalente:

$$(f^{-1})'(x) = \frac{1}{f'(f^{-1}(x))}$$

Demostración. Para hallar la derivada de f^{-1} en el punto b , partimos de la definición de derivada como límite del cociente de incrementos:

$$(f^{-1})'(b) = \lim_{y \rightarrow b} \frac{f^{-1}(y) - f^{-1}(b)}{y - b}$$

Haciendo el cambio de variable $x = f^{-1}(y)$, tenemos que $y = f(x)$. Sabemos también que $a = f^{-1}(b)$, luego $b = f(a)$. Como f^{-1} es continua en b , cuando $y \rightarrow b$, se tiene de forma equivalente que $x \rightarrow a$.

Sustituyendo estos valores en el límite, obtenemos:

$$(f^{-1})'(b) = \lim_{x \rightarrow a} \frac{x - a}{f(x) - f(a)}$$

Podemos reescribir la fracción anterior dividiendo el numerador y el denominador por $(x - a)$, notando que $x \neq a$:

$$(f^{-1})'(b) = \lim_{x \rightarrow a} \frac{1}{\frac{f(x) - f(a)}{x - a}}$$

Por las propiedades de los límites, y dado que por hipótesis f es derivable en a y $f'(a) \neq 0$, podemos aplicar el límite al denominador:

$$(f^{-1})'(b) = \frac{1}{\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)-f(a)}{x-a}}$$

Reconociendo que el límite del denominador es exactamente la definición de $f'(a)$, concluimos que:

$$(f^{-1})'(b) = \frac{1}{f'(a)}$$

Lo que concluye la demostración. □

Ejemplo 5.38. Sea $f(x) = x^3 + x$. Calcula la derivada de la función inversa en el punto $x = 2$, es decir, halla $(f^{-1})'(2)$.

Solución:

Sabemos por el teorema de la derivada de la función inversa que:

$$(f^{-1})'(2) = \frac{1}{f'(f^{-1}(2))}$$

Primero, necesitamos encontrar el valor de $f^{-1}(2)$. Esto equivale a encontrar el valor de x tal que $f(x) = 2$:

$$x^3 + x = 2$$

Por inspección, es fácil ver que $x = 1$ es una solución, ya que $1^3 + 1 = 2$. Como la derivada $f'(x) = 3x^2 + 1$ es estrictamente positiva para todo número real, la función f es estrictamente creciente e inyectiva. Por lo tanto, $x = 1$ es la única solución y $f^{-1}(2) = 1$. A continuación, calculamos la derivada de $f(x)$:

$$f'(x) = 3x^2 + 1$$

Evaluamos la derivada en el punto encontrado, $x = 1$:

$$f'(1) = 3(1)^2 + 1 = 4$$

Finalmente, sustituimos este valor en la fórmula del teorema:

$$(f^{-1})'(2) = \frac{1}{f'(1)} = \frac{1}{4}$$

Ejemplo 5.39. Sea $f(x) = e^x + x$. Halla el valor de $(f^{-1})'(1)$.

Solución:

Nuevamente, aplicamos la fórmula de la derivada de la función inversa:

$$(f^{-1})'(1) = \frac{1}{f'(f^{-1}(1))}$$

Primero buscamos $f^{-1}(1)$, lo que requiere resolver la ecuación $f(x) = 1$:

$$e^x + x = 1$$

Observamos que si $x = 0$, la ecuación se satisface puesto que $e^0 + 0 = 1 + 0 = 1$. Dado que $f(x)$ es la suma de dos funciones estrictamente crecientes, también es estrictamente creciente e inyectiva. Así, deducimos que $f^{-1}(1) = 0$. Luego, derivamos la función original $f(x)$:

$$f'(x) = e^x + 1$$

Evaluamos dicha derivada en $x = 0$:

$$f'(0) = e^0 + 1 = 1 + 1 = 2$$

Para concluir, sustituimos este resultado en la fórmula del teorema:

$$(f^{-1})'(1) = \frac{1}{f'(0)} = \frac{1}{2}$$

5.7

Derivación Logarítmica

La **derivación logarítmica** combina las propiedades del logaritmo con la diferenciación implícita. Es la técnica más eficiente para derivar funciones que son productos o cocientes de muchos factores, o funciones de la forma $[f(x)]^{g(x)}$ (potencias con exponente variable).

Observación 5.40. Para efectuar la derivación logarítmica se sigue el siguiente protocolo:

- 1. Tomar logaritmo natural en ambos lados: $\ln y = \ln f(x)$.
- 2. Simplificar con las propiedades del logaritmo ($\ln(AB) = \ln A + \ln B$, $\ln(A/B) = \ln A - \ln B$, $\ln(A^k) = k \ln A$).
- 3. Derivar implícitamente: $\frac{y'}{y} = [\text{lado derecho}]'$.
- 4. Despejar $y' = y \cdot [\text{lado derecho}]'$ y sustituir y .

Ejemplo 5.41. Derivar $y = \frac{x^{3/4}\sqrt{x^2+1}}{(3x+2)^5}$.

Solución: Tomamos $\ln y = \frac{3}{4} \ln x + \frac{1}{2} \ln(x^2+1) - 5 \ln(3x+2)$. Derivando implícitamente:

$$\frac{y'}{y} = \frac{3}{4x} + \frac{x}{x^2+1} - \frac{15}{3x+2}.$$

Multiplicando por y :

$$y' = \frac{x^{3/4}\sqrt{x^2+1}}{(3x+2)^5} \left(\frac{3}{4x} + \frac{x}{x^2+1} - \frac{15}{3x+2} \right). \quad \square$$

Ejemplo 5.42. Derivar $y = x^x \quad (x > 0)$.

Solución: $\ln y = x \ln x$. Derivando implícitamente:

$$\frac{y'}{y} = \ln x + x \cdot \frac{1}{x} = \ln x + 1.$$

$$y' = x^x(\ln x + 1). \quad \square$$

Ejemplo 5.43. Derivar $y = (\sin x)^{\cos x}$.

Solución: $\ln y = \cos x \cdot \ln(\sin x)$. Derivando:

$$\frac{y'}{y} = -\sin x \ln(\sin x) + \cos x \cdot \frac{\cos x}{\sin x} = -\sin x \ln(\sin x) + \frac{\cos^2 x}{\sin x}.$$

$$y' = (\sin x)^{\cos x} \left(\frac{\cos^2 x}{\sin x} - \sin x \ln(\sin x) \right). \quad \square$$

Observación 5.44. La diferenciación logarítmica revela la derivada de a^x de manera natural: si $y = a^x$, entonces $\ln y = x \ln a$, y derivando $\frac{y'}{y} = \ln a$, es decir, $y' = a^x \ln a$. Este resultado explica por qué e^x es la función exponencial con derivada más simple: es la única base para la que $\ln a = 1$.

5.8

Derivadas de las Funciones Trigonométricas Inversas

Teorema 5.45 (Derivadas de las inversas trigonométricas).

$$\begin{aligned} D_x(\arcsin x) &= \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}, & D_x(\arccos x) &= \frac{-1}{\sqrt{1-x^2}}, \\ D_x(\arctan x) &= \frac{1}{1+x^2}, & D_x(\operatorname{arccot} x) &= \frac{-1}{1+x^2}, \\ D_x(\operatorname{arcsec} x) &= \frac{1}{|x|\sqrt{x^2-1}}, & D_x(\operatorname{arccsc} x) &= \frac{-1}{|x|\sqrt{x^2-1}}. \end{aligned}$$

Ejemplo 5.46. Demuestre que $D_x(\arcsin x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$

Solución: Sea $y = \arcsin x$, de modo que $\sin y = x$ con $y \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$. Derivando implícitamente respecto a x :

$$\cos y \cdot \frac{dy}{dx} = 1 \implies \frac{dy}{dx} = \frac{1}{\cos y}.$$

En el intervalo considerado, $\cos y \geq 0$, por lo que $\cos y = \sqrt{1 - \sin^2 y} = \sqrt{1 - x^2}$. Sustituyendo:

$$D_x(\arcsin x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}. \quad \square$$

Observación 5.47. El mismo argumento aplicado anteriormente de derivar la relación $f(y) = x$ implícitamente y usar una identidad pitagórica para eliminar y produce todas las demás fórmulas de la tabla. Nótese que $D_x(\arcsin x) = -D_x(\arccos x)$ y $D_x(\arctan x) = -D_x(\operatorname{arccot} x)$: este hecho refleja la identidad $\arcsin x + \arccos x = \frac{\pi}{2}$, cuya derivada es cero.

Ejemplo 5.48. Derive $f(x) = \arctan(x^2)$.

Solución: Aplicando la regla de la cadena: $f'(x) = \frac{1}{1+(x^2)^2} \cdot 2x = \frac{2x}{1+x^4}$. $\square$

Ejemplo 5.49. Derivar $f(x) = x \arcsin x + \sqrt{1-x^2}$.

Solución:

$$f'(x) = \arcsin x + \frac{x}{\sqrt{1-x^2}} + \frac{-2x}{2\sqrt{1-x^2}} = \arcsin x + \frac{x}{\sqrt{1-x^2}} - \frac{x}{\sqrt{1-x^2}} = \arcsin x. \quad \square$$

La siguiente tabla resume las derivadas de las funciones más comunes:

$D_x f(x)$	=	Resultado
$D_x(k)$	=	0
$D_x(x^n)$	=	nx^{n-1}
$D_x(e^x)$	=	e^x
$D_x(a^x)$	=	$a^x \ln a$
$D_x(\ln x)$	=	$\frac{1}{x}$
$D_x(\log_a x)$	=	$\frac{1}{x \ln a}$
$D_x(\sin x)$	=	$\cos x$
$D_x(\cos x)$	=	$-\sin x$
$D_x(\tan x)$	=	$\sec^2 x$
$D_x(\cot x)$	=	$-\csc^2 x$
$D_x(\sec x)$	=	$\sec x \tan x$
$D_x(\csc x)$	=	$-\csc x \cot x$
$D_x(\arcsin x)$	=	$\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$
$D_x(\arccos x)$	=	$\frac{-1}{\sqrt{1-x^2}}$
$D_x(\arctan x)$	=	$\frac{1}{1+x^2}$
$D_x(\operatorname{arccot} x)$	=	$\frac{-1}{1+x^2}$
$D_x(\operatorname{arcsec} x)$	=	$\frac{1}{ x \sqrt{x^2-1}}$
$D_x(\operatorname{arccsc} x)$	=	$\frac{-1}{ x \sqrt{x^2-1}}$

Observación 5.50. Toda fórmula de la tabla admite una versión general por la regla de la cadena: reemplazando x por una función derivable $u(x)$, se multiplica por $u'(x)$. Por ejemplo, $D_x(\sin u) = \cos u \cdot u'$ o $D_x(\ln u) = \frac{u'}{u}$.

5.9

Problemas Propuestos

Problema 5.51. Use la definición de derivada para calcular $f'(x)$ en cada caso:

1. $f(x) = 3x^2 - 2x + 1$

2. $f(x) = \frac{1}{x+1}$

3. $f(x) = \sqrt{3x-1}$

4. $f(x) = x^3$

5. $f(x) = \frac{x}{x+2}$

6. $f(x) = \sqrt[3]{x}$

Problema 5.52. Determine si $f(x) = |x^2 - 4|$ es derivable en $x = 2$ y en $x = -2$. Justifique calculando los límites laterales del cociente incremental.

Problema 5.53. Encuentre los valores de a y b para que

$$f(x) = \begin{cases} ax^2 + 1 & x \leq 1 \\ bx + 2 & x > 1 \end{cases}$$

sea derivable en $x = 1$.

Problema 5.54. Derive cada función. No simplifique.

1. $f(x) = 5x^4 - 3x^3 + 7x - 2$

2. $g(x) = (2x^3 - 1)(x^2 + 3x)$

3. $h(x) = \frac{x^2 - 1}{x^2 + 1}$

4. $p(x) = (3x - 1)^5$

5. $q(x) = \frac{(x + 1)^3}{x^2}$

6. $r(x) = \sqrt{x^2 + 2x + 5}$

7. $s(x) = x^2 \sin x - 3 \cos x$

8. $t(x) = \frac{\tan x}{1 + \sec x}$

9. $u(x) = \ln(x^2 + 1)$

10. $v(x) = e^{x^2} \cos x$

11. $w(x) = \sec^2(3x)$

12. $z(x) = \arctan \sqrt{x}$

Problema 5.55. Derive usando la regla de la cadena:

1. $f(x) = \cos^3(\sin x)$

2. $g(x) = e^{\sqrt{\ln x}}$

3. $h(x) = \ln\left(\frac{\sqrt{1+x^2}}{1-x}\right)$

4. $k(x) = \arcsin(e^{-x^2})$

Problema 5.56. Calcule $f''(x)$ para cada función:

1. $f(x) = x^5 - 2x^3 + x$

2. $f(x) = \sin(2x)$

3. $f(x) = xe^x$

4. $f(x) = \ln x$

5. $f(x) = \arctan x$

6. $f(x) = x \cos x$

Problema 5.57. Demuestre que $y = A \sin(\omega t) + B \cos(\omega t)$ satisface la ecuación $y'' + \omega^2 y = 0$.

Problema 5.58. Si $f(x) = x^n$, pruebe por inducción que $f^{(k)}(x) = \frac{n!}{(n-k)!} x^{n-k}$ para $k \leq n$, y $f^{(k)}(x) = 0$ para $k > n$.

Problema 5.59. Encuentre una fórmula cerrada para la n -ésima derivada de:

- a) $f(x) = e^{ax}$

b) $f(x) = \sin x$

c) $f(x) = \ln x$

d) $f(x) = \frac{1}{1-x}$

Problema 5.60. Encuentre $\frac{dy}{dx}$ mediante diferenciación implícita:

1. $x^2 + y^2 = r^2$

2. $x^3 + y^3 = 1$

3. $\sin(x + y) = xy$

4. $e^{xy} = x + y$

5. $\ln(x^2 + y^2) = \arctan \frac{y}{x}$

6. $\sqrt{x} + \sqrt{y} = \sqrt{a}$

7. $y \sin x = x \cos y$

8. $x^{2/3} + y^{2/3} = 1$

Problema 5.61. Para la elipse $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$, encuentre la ecuación de la recta tangente en el punto (x_0, y_0) y verifique que tiene la forma $\frac{x_0x}{a^2} + \frac{y_0y}{b^2} = 1$.

Problema 5.62. Encuentre los puntos de la curva $x^2 + xy + y^2 = 7$ donde la recta tangente es horizontal y donde es vertical.

Problema 5.63. Si $g(x) = f^{-1}(x)$ y $f(3) = 5$, $f'(3) = 4$, calcule $g'(5)$. Enuncie el teorema de la derivada de la función inversa que utiliza.

Problema 5.64. Use diferenciación logarítmica para derivar:

1. $y = x^{\sin x}$

2. $y = (\ln x)^x$

3. $y = \frac{x^2\sqrt{x+1}}{(2x-1)^3}$

4. $y = \left(\frac{x+1}{x-1}\right)^{3/2}$

5. $y = (\cos x)^x$

6. $y = x^{x^2}$

7. $y = \frac{x^5 \sin^2 x}{\sqrt{1+x^2}}$

8. $y = (1+x)^{1/x}$

Problema 5.65. Una partícula se mueve según $s(t) = t^3 - 6t^2 + 9t + 2$ donde la distancia se mide en metros y el tiempo en segundos.

- a) Encuentre la velocidad y aceleración en función de t .
- b) ¿Cuándo está en reposo la partícula?
- c) ¿Cuándo se mueve en sentido positivo?
- d) Calcule la aceleración cuando la velocidad es cero.

Problema 5.66. La posición de un objeto oscilante está dada por $s(t) = A \cos(\omega t + \phi)$. Demuestre que la aceleración es proporcional al negativo de la posición, es decir, $s''(t) = -\omega^2 s(t)$, la cual se conoce como la ley de Hooke para oscilación armónica.

Problema 5.67. Encuentre la ecuación de la recta tangente y la recta normal a la curva $y = x^3 - 4x$ en el punto $(2, 0)$.

Problema 5.68. Dado el polinomio cúbico $f(x) = x^3 - 3x^2 - 9x + 5$:

- a) Verifique que los puntos $(-1, 10)$ y $(3, -22)$ pertenecen a la curva.
- b) Demuestre que la recta tangente a f en cada uno de esos puntos es horizontal.
- c) Grafique el polinomio y las rectas tangentes horizontales en los puntos dados.

Problema 5.69. Sea $y = \sqrt{x}$.

- a) Halle la pendiente de la recta tangente en un punto genérico $x = a$.
- b) Encuentre las ecuaciones de las tangentes en $(1, 1)$ y $(4, 2)$.

Problema 5.70. Si se lanza una roca verticalmente hacia arriba en el planeta Marte con una velocidad inicial de 10 m/s, su altura (en metros) después de t segundos es $H(t) = 10t - 1,86t^2$.

- a) Halle la velocidad de la roca después de un segundo.
- b) Halle la velocidad de la roca cuando $t = a$.

- c) ¿Cuándo caerá la roca a la superficie?
- d) ¿Con qué velocidad chocará la roca contra la superficie?

Problema 5.71. Suponga que un círculo de radio r y centro $(0, c)$ está inscrito en la parábola $y = x^2$ como lo muestra la figura 5.71. En el punto de tangencia, las pendientes de ambas curvas deben coincidir. Encuentre la pendiente de la circunferencia implícitamente y muestre que en el punto de tangencia $y = c - \frac{1}{2}$. Luego use las ecuaciones de la circunferencia y la parábola para mostrar que $c = r^2 + \frac{1}{4}$.




Figura 5.1: Un círculo de radio r inscrito en la parábola $y = x^2$.

Problema 5.72. Determine el valor de verdad de las siguientes afirmaciones. Justifique adecuadamente su respuesta.

- a) Si f es continua en c , entonces f es derivable en c .
- b) Si f es derivable en c , entonces f es continua en c .
- c) Si $f'(c) = 0$, entonces f tiene un extremo local en c .
- d) $D_x[f(x)g(x)] = f'(x)g'(x)$.
- e) Si $f(x) = g(x)$ para todo x , entonces $f'(x) = g'(x)$.
- f) $\frac{d}{dx}[\sin^2 x + \cos^2 x] = 2 \sin x \cos x - 2 \cos x \sin x = 0$.
- g) Si $f'(x) = g'(x)$ para todo x , entonces $f = g$.
- h) $(f \circ g)'(x) = f'(g(x)) \cdot g'(x)$.
- i) Si f es par, entonces f' es impar.
- j) Si f es impar, entonces f' es par.
- k) La expresión $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\sin x - 1}{x - \frac{\pi}{2}}$ es la derivada de $f(x) = \sin x$ en $x = \frac{\pi}{2}$.
- l) Si $y = f(x)g(x)$, entonces $\frac{d^2 y}{dx^2} = f(x)g''(x) + g(x)f''(x)$.
- m) Una ecuación de la recta tangente a la parábola $y = x^2$ en $(-2, 4)$ es $y - 4 = 2x(x + 2)$.
- n) Si f es derivable, entonces $\frac{d}{dx} \sqrt{f(x)} = \frac{f'(x)}{2\sqrt{f(x)}}$.
- ñ) $\frac{d}{dx} \ln \pi = \frac{1}{\pi}$.
- o) Sea f una función diferenciable, c una constante, $g(x) = f(x + c)$ y $h(x) = f(x) + c$. Entonces $f'(x) = g'(x) = h'(x)$.

- p) Si $f'(r)$ existe, entonces $\lim_{x \rightarrow r} f(x) = f(r)$.
- q) Si f es continua en a , entonces f es derivable en a .
- r) La única función para la cual $f'(x) = f(x)$ es $f(x) = e^x$.

Problema 5.73. Encuentre la ecuación de la recta perpendicular a la recta tangente en el punto $(1, 2)$ sobre la gráfica de $f(x) = -4x^2 + 6x$.

Problema 5.74. Halle la ecuación de la recta tangente a $y = f(x)$ en $x = 5$, sabiendo que $f(5) = 3$ y $f'(5) = 4$.

Problema 5.75. Dibuje la gráfica de una función f para la cual $f(0) = 0$, $f'(0) = 3$, $f(1) = 0$ y $f(2) = 1$.

Problema 5.76. Suponiendo que cada una de las ecuaciones define una función derivable de x , encuentre $\frac{dy}{dx}$. Exprese cada derivada en su forma más simplificada posible.

- 1. $y = \tan^2 x + \ln(\cos x)$.
- 2. $xy + \arctan\left(\frac{x}{y}\right) = 0$.
- 3. $y = x^{x^3}$.
- 4. $y = \frac{1}{\sin^4 x + 1} + \ln\left(\frac{\sin^4 x}{\sin^4 x + 1}\right)$.
- 5. $\arctan\left(\frac{x}{y}\right) = \frac{1}{2} \ln(x^2 + y^2)$.
- 6. $y = x^{x^3}$.
- 7. $y = \ln\left(\frac{\sqrt{3} - \sqrt{2} \cos x}{\sqrt{3} + \sqrt{2} \cos x}\right)$.
- 8. $\sqrt[3]{x^2} + \sqrt[3]{y^2} = \sqrt[3]{a^2}$.
- 9. $y = 3^{x^x}$.

Problema 5.77. Lea cuidadosamente cada pregunta y seleccione la opción correcta.

- 1. La recta tangente a la gráfica de $y + \ln y - xy = 1$ en el punto $(0, 1)$ tiene pendiente:
 - a. 0
 - b. $\frac{1}{2}$
 - c. 1
 - d. No existe recta tangente en ese punto.
- 2. Si $f(x) = \cos\left(\sqrt{\sin(\tan(\pi x))}\right)$, entonces $f'(x)$ es:
 - a. $\frac{\pi \sec^2(\pi x) \cos(\tan(\pi x)) \sin\left(\sqrt{\sin(\tan(\pi x))}\right)}{2\sqrt{\sin(\tan(\pi x))}}$
 - b. $\frac{\pi \sec^2(\pi x) \cos(\tan(\pi x)) \sin\left(\sqrt{\sin(\tan(\pi x))}\right)}{2\sqrt{\cos(\tan(\pi x))}}$
 - c. $-\frac{\pi \sec^2(\pi x) \cos(\tan(\pi x)) \sin\left(\sqrt{\sin(\tan(\pi x))}\right)}{2\sqrt{\sin(\tan(\pi x))}}$
 - d. Ninguna de las anteriores.

3. El valor del límite $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+2x}-1}{x}$ es:
- a. 2
 - b. 1
 - c. $\frac{1}{3}$
 - d. 0

Problema 5.78. Compruebe que la función $y = \frac{1}{2}x^2e^x$ satisface la ecuación diferencial

$$\frac{d^2y}{dx^2} - 2 \frac{dy}{dx} + y = e^x.$$

Problema 5.79. Determine la ecuación de la recta normal (perpendicular a la tangente) a la curva $8(x^2 + y^2)^2 = 100(x^2 - y^2)$ en el punto $(3, 1)$.

Problema 5.80. Sean p y q dos números reales. Calcule las ecuaciones de las rectas tangentes a la curva $y = ax^2 + bx + c$ en los puntos de abscisas p y q . Compruebe que estas rectas se cortan en el punto de abscisa $\frac{p+q}{2}$.

Problema 5.81. Encuentre los puntos P y Q sobre la parábola $y = 1 - x^2$ de modo que el triángulo formado por el eje x y las rectas tangentes en P y Q sea equilátero. Vea la figura 5.81.




Figura 5.2: Triángulo equilátero formado por el eje x y las rectas tangentes.

Problema 5.82. Se trazan las rectas tangentes T_1 y T_2 en dos puntos P_1 y P_2 sobre la parábola $y = x^2$, y se llama P a su intersección. Una tercera tangente T , trazada en un punto entre P_1 y P_2 , corta a T_1 en Q_1 y a T_2 en Q_2 . Demuestre que

$$\frac{|PQ_1|}{|PP_1|} + \frac{|PQ_2|}{|PP_2|} = 1.$$

Problema 5.83. Suponga que tres puntos sobre la parábola $y = x^2$ tienen la propiedad de que sus rectas normales se intersecan en un punto común. Demuestre que la suma de sus abscisas es cero.

Problema 5.84. En la figura 5.84 se muestra una lámpara colocada tres unidades a la derecha del eje y y una sombra creada por la región elíptica $x^2 + 4y^2 = 5$. Si el punto $(-5, 0)$ está en el borde de la sombra, ¿a qué altura sobre el eje x está colocada la lámpara?




Figura 5.3: Lámpara en $(3, h)$, elipse $x^2 + 4y^2 = 5$ y borde de sombra en $(-5, 0)$.

Problema 5.85. Una banda elástica cuelga de un gancho con una masa sujeta en su extremo inferior. Al jalarsse y soltarse, la masa vibra con movimiento armónico descrito por $s(t) = 2 \cos t + 3 \sin t$, $t \geq 0$, donde s está en centímetros y t en segundos (positivo hacia abajo).

- (a) Encuentre la velocidad y la aceleración en el instante t .
- (b) Dibuje las gráficas de velocidad y aceleración.
- (c) ¿Para qué valor de t ocurre por primera vez que $s(t) = 0$? ¿Qué significa físicamente?
- (d) ¿Para qué t es cero por primera vez la velocidad? Determine la elongación máxima de la banda.

Sugerencia: Use la función arcotangente para encontrar los valores de t .

Problema 5.86. Una piedra se suelta desde un edificio de 256 ft de altura. (Aceleración de la gravedad: 32 ft/s².)

- (a) Determine la ecuación del movimiento de la piedra.
- (b) Determine la velocidad instantánea en función de t .
- (c) Determine cuándo llega al suelo y con qué rapidez lo hace.

Problema 5.87. ¿Puede existir una función diferenciable f tal que $f(2) = 1$ y $f'(2) = 0$, pero $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x)}{x - 2} = 1$? Justifique.

Capítulo

6

Aplicaciones de la Derivada

La derivada no es únicamente un objeto teórico: es el instrumento central para analizar el comportamiento de funciones y resolver problemas cuantitativos en física, ingeniería, economía y geometría. Este capítulo desarrolla las aplicaciones más importantes, organizadas en un orden pedagógico natural: primero el análisis del comportamiento local (extremos, monotonía, concavidad), luego las aplicaciones al trazado sistemático de curvas y a la optimización, y finalmente las herramientas analíticas transversales (Teorema del Valor Medio, regla de L'Hôpital) y numéricas (Newton-Raphson, bisección).

Observación 6.1. *El hilo conductor de este capítulo es el siguiente principio: la derivada mide la **tasa de variación instantánea**. Según el contexto, esta idea adquiere formas distintas como lo son la velocidad, pendiente de la recta tangente, el crecimiento marginal y la tasa de llenado pero el aparato matemático es siempre el mismo. Reconocer esta unidad subyacente facilita la transferencia de las técnicas entre contextos aparentemente dispares.*

6.1

Razones de Cambio Relacionadas

Si una cantidad y depende del tiempo t , su derivada $\frac{dy}{dt}$ es su **razón de cambio respecto al tiempo**. Cuando dos o más cantidades están ligadas por una ecuación geométrica o física, sus derivadas temporales también están ligadas: son las llamadas **razones de cambio relacionadas**. La clave es que la ecuación que relaciona las cantidades vale para *todo instante* t , por lo que puede derivarse implícitamente respecto a t .


Construcción 6.2. Las razones de cambio relacionadas pueden resolverse siguiendo el siguiente protocolo:

1. **Diagrama y variables.** Dibujar un esquema de la situación y asignar variables a las cantidades que cambian con t .
2. **Identificar razones.** Listar las derivadas temporales conocidas y la que se desea encontrar.
3. **Ecuación fundamental.** Escribir una ecuación que relacione las variables y que sea válida para todo t .
4. **Derivación implícita.** Derivar ambos lados respecto a t aplicando la regla de la cadena.
5. **Sustitución y despeje.** Solo *después* de derivar, sustituir los valores del instante particular y despejar la razón buscada.

Observación 6.3. *El error más frecuente consiste en sustituir los valores numéricos antes de derivar. Al hacerlo, las variables se convierten en constantes y sus derivadas desaparecen, destruyendo la información que se busca. Los valores numéricos solo entran en el paso 5.*

Ejemplo 6.4. Un tanque cónico invertido tiene altura 12 m y radio basal 6 m. El agua entra a razón de 2 m³/min. ¿A qué rapidez sube el nivel cuando el agua tiene 4 m de profundidad?

Solución:



Paso 1. Diagrama y variables. Se tiene un cono invertido de altura total $H = 12$ m y radio basal $R = 6$ m. En el instante t , el agua ocupa un cono similar de altura $h(t)$ y radio superficial $r(t)$. Las cantidades que cambian con el tiempo son:

- $h = h(t)$: profundidad del agua (m),
- $r = r(t)$: radio de la superficie libre (m),
- $V = V(t)$: volumen de agua (m³).

Paso 2. Identificar razones.

- Razón conocida: $\frac{dV}{dt} = 2 \text{ m}^3/\text{min}$ (el agua entra).
- Razón buscada: $\frac{dh}{dt}$ en el instante en que $h = 4$ m.

Paso 3. Ecuación fundamental. El volumen de un cono es $V = \frac{1}{3}\pi r^2 h$. Para eliminar la variable r y trabajar con una sola variable geométrica, se usa semejanza de triángulos entre el cono de agua y el cono del tanque:

$$\frac{r}{h} = \frac{R}{H} = \frac{6}{12} = \frac{1}{2} \implies r = \frac{h}{2}.$$

Sustituyendo en la fórmula del cono se obtiene la ecuación fundamental, válida para todo t :

$$V = \frac{1}{3}\pi \left(\frac{h}{2}\right)^2 h = \frac{1}{3}\pi \cdot \frac{h^2}{4} \cdot h = \frac{\pi h^3}{12}.$$

Paso 4. Derivación implícita. Se deriva ambos lados respecto a t , aplicando la regla de la cadena al lado derecho:

$$\frac{dV}{dt} = \frac{\pi}{12} \cdot 3h^2 \cdot \frac{dh}{dt} = \frac{\pi h^2}{4} \cdot \frac{dh}{dt}.$$

Paso 5. Sustitución y despeje. Se sustituyen $h = 4$ m y $\frac{dV}{dt} = 2 \text{ m}^3/\text{min}$:

$$2 = \frac{\pi(4)^2}{4} \cdot \frac{dh}{dt} = \frac{16\pi}{4} \cdot \frac{dh}{dt} = 4\pi \frac{dh}{dt}.$$

Despejando:

$$\frac{dh}{dt} = \frac{2}{4\pi} = \frac{1}{2\pi} \approx 0,159 \text{ m/min.} \quad \square$$

Ejemplo 6.5. Una escalera de 10 m de largo se apoya en una pared vertical. La base se aleja de la pared a 0,5 m/s. ¿A qué velocidad descende el extremo superior cuando la base está a 6 m de la pared?

Solución: Paso 1. Diagrama y variables.

Diagrama de un triángulo rectángulo formado por una pared vertical, el suelo y una escalera de 10 m. El extremo superior está a una altura y sobre la pared, y la base está a una distancia x del pie de la pared. Se indica que $x = 6$ m y $y = 8$ m en ese instante. La velocidad de la base es $\frac{dx}{dt} = 0,5$ m/s. Se pide encontrar $\frac{dy}{dt}$.

La escalera, la pared y el suelo forman un triángulo rectángulo. Las cantidades que cambian con el tiempo son: $x = x(t)$: distancia horizontal de la base a la pared (m),
 $y = y(t)$: altura del extremo superior sobre el suelo (m).
La longitud de la escalera, 10 m, permanece constante.

Paso 2. Identificar razones.

- Razón conocida: $\frac{dx}{dt} = 0,5$ m/s (la base se aleja).
- Razón buscada: $\frac{dy}{dt}$ en el instante en que $x = 6$ m.

Paso 3. Ecuación fundamental. Por el teorema de Pitágoras, para todo instante t :

$$x^2 + y^2 = 10^2 = 100.$$

Paso 4. Derivación implícita. Se deriva ambos lados respecto a t :

$$2x \frac{dx}{dt} + 2y \frac{dy}{dt} = 0.$$

Dividiendo entre 2 y despejando $\frac{dy}{dt}$:

$$\frac{dy}{dt} = -\frac{x}{y} \cdot \frac{dx}{dt}.$$

Paso 5. Sustitución y despeje. Primero se obtiene y cuando $x = 6$ m usando la ecuación fundamental:

$$y = \sqrt{100 - x^2} = \sqrt{100 - 36} = \sqrt{64} = 8 \text{ m}.$$

Sustituyendo $x = 6$, $y = 8$ y $\frac{dx}{dt} = 0,5$:

$$\frac{dy}{dt} = -\frac{6}{8} \cdot 0,5 = -\frac{6}{16} = -\frac{3}{8} \text{ m/s}.$$

El signo negativo indica que el extremo superior *desciende*; su rapidez de descenso es $\frac{3}{8}$ m/s. $\square$

Ejemplo 6.6. Un globo esférico se infla a razón de 100π cm³/s. ¿A qué rapidez crece el radio cuando el radio mide 5 cm?

Solución: **Paso 1. Diagrama y variables.** El globo es una esfera de radio $r(t)$ y volumen $V(t)$, ambos funciones del tiempo t .

Paso 2. Identificar razones.

- Razón conocida: $\frac{dV}{dt} = 100\pi \text{ cm}^3/\text{s}$ (el globo se infla).
- Razón buscada: $\frac{dr}{dt}$ en el instante en que $r = 5 \text{ cm}$.

Paso 3. Ecuación fundamental. El volumen de una esfera de radio r es, para todo t :

$$V = \frac{4}{3}\pi r^3.$$

Paso 4. Derivación implícita. Se deriva ambos lados respecto a t , aplicando la regla de la cadena:

$$\frac{dV}{dt} = \frac{4}{3}\pi \cdot 3r^2 \cdot \frac{dr}{dt} = 4\pi r^2 \frac{dr}{dt}.$$

Paso 5. Sustitución y despeje. Se sustituyen $r = 5 \text{ cm}$ y $\frac{dV}{dt} = 100\pi \text{ cm}^3/\text{s}$:

$$100\pi = 4\pi(5)^2 \frac{dr}{dt} = 4\pi \cdot 25 \frac{dr}{dt} = 100\pi \frac{dr}{dt}.$$

Despejando:

$$\frac{dr}{dt} = \frac{100\pi}{100\pi} = 1 \text{ cm/s.} \quad \square$$

6.2

Valores Extremos

Una de las aplicaciones más importantes de la derivada es la localización de los extremos de una función, a continuación su definición.

Definición 6.7. Sea f definida en un conjunto S . Se dice que:

- $f(c)$ es el **máximo absoluto** de f en S si $f(c) \geq f(x)$ para todo $x \in S$.
- $f(c)$ es el **mínimo absoluto** de f en S si $f(c) \leq f(x)$ para todo $x \in S$.

Definición 6.8. Se dice que c es un **punto crítico** de f si es un punto interior del dominio donde $f'(c) = 0$ (**punto estacionario**) o donde $f'(c)$ no existe (**punto singular**).

Teorema 6.9 (Teorema del Valor Extremo de Weierstrass). *Si f es continua en el intervalo cerrado $[a, b]$, entonces f alcanza un máximo absoluto y un mínimo absoluto en $[a, b]$.*

Observación 6.10. *El Teorema de Weierstrass es un resultado de existencia que descansa sobre la completitud de $\mathbb{R}$ y la compacidad de $[a, b]$: en un conjunto abierto o en una función discontinua, el extremo puede no alcanzarse. La función $f(x) = x$ en $(0, 1)$ es el ejemplo elemental: está acotada pero no tiene ni máximo ni mínimo en el intervalo abierto.*

Teorema 6.11 (Fermat). *Si f tiene un extremo local en un punto interior c del dominio, y $f'(c)$ existe, entonces $f'(c) = 0$.*

Construcción 6.12. El siguiente protocolo permite realizar la Localización de extremos absolutos en $[a, b]$

1. Encontrar todos los puntos críticos de f en (a, b) .

- 2. Evaluar f en cada punto crítico y en los extremos a, b .
- 3. El mayor valor es el máximo absoluto; el menor, el mínimo absoluto.

Ejemplo 6.13. Encontrar los extremos absolutos de $f(x) = x^3 - 3x^2 + 1$ en $[-\frac{1}{2}, 4]$.

Solución: Paso 1. Encontrar todos los puntos críticos de f en $(-\frac{1}{2}, 4)$.

Se calcula la derivada de f :

$$f'(x) = 3x^2 - 6x = 3x(x - 2).$$

Como f es un polinomio, f' existe en todo punto, de modo que los únicos puntos críticos son aquellos donde $f'(x) = 0$:

$$3x(x - 2) = 0 \implies x = 0 \quad \text{o} \quad x = 2.$$

Ambos valores pertenecen al intervalo abierto $(-\frac{1}{2}, 4)$, por lo que los dos son puntos críticos válidos.

Paso 2. Evaluar f en cada punto crítico y en los extremos del intervalo.

Se evalúa f en los puntos críticos $x = 0, x = 2$ y en los extremos $x = -\frac{1}{2}, x = 4$:

x	Cálculo	$f(x)$
$-\frac{1}{2}$	$(-\frac{1}{2})^3 - 3(-\frac{1}{2})^2 + 1 = -\frac{1}{8} - \frac{3}{4} + 1 = -\frac{1}{8} - \frac{6}{8} + \frac{8}{8}$	$\frac{1}{8}$
0	$0 - 0 + 1$	1
2	$8 - 12 + 1$	-3
4	$64 - 48 + 1$	17

Paso 3. Identificar el máximo y el mínimo absolutos.

Comparando los cuatro valores obtenidos,

$$-3 < \frac{1}{8} < 1 < 17,$$

se concluye:

- **Máximo absoluto:** $f(4) = 17$, alcanzado en el extremo derecho del intervalo.
- **Mínimo absoluto:** $f(2) = -3$, alcanzado en el punto crítico interior $x = 2$.

En ocasiones, una función mantiene un comportamiento uniforme a lo largo de un intervalo: siempre sube, siempre baja o permanece constante. Esta regularidad se conoce como **monotonía** y constituye una de las propiedades cualitativas más importantes de una función, pues permite anticipar su comportamiento global sin necesidad de evaluar cada punto. El cálculo diferencial ofrece una herramienta precisa para detectarla: el signo de la derivada. Si $f'(x) > 0$, la función crece; si $f'(x) < 0$, decrece. Este vínculo entre la derivada y el comportamiento de f queda formalizado en el siguiente criterio.

Teorema 6.14 (Criterio de monotonía). Sea f continua en $[a, b]$ y derivable en (a, b) :

- Si $f'(x) > 0$ para todo $x \in (a, b)$, entonces f es **estrictamente creciente** en $[a, b]$.
- Si $f'(x) < 0$ para todo $x \in (a, b)$, entonces f es **estrictamente decreciente** en $[a, b]$.
- Si $f'(x) = 0$ para todo $x \in (a, b)$, entonces f es **constante** en $[a, b]$.

Ejemplo 6.15. Determinar los intervalos de crecimiento y decrecimiento de $f(x) = x^3 - 3x$.

Solución: Paso 1. Calcular f' y encontrar los puntos críticos.

$$f'(x) = 3x^2 - 3 = 3(x^2 - 1) = 3(x - 1)(x + 1).$$

Los puntos críticos se obtienen igualando $f'(x) = 0$:

$$3(x - 1)(x + 1) = 0 \implies x = -1 \quad \text{o} \quad x = 1.$$

Estos dos valores dividen la recta real en tres intervalos: $(-\infty, -1)$, $(-1, 1)$ y $(1, +\infty)$.

Paso 2. Analizar el signo de f' en cada intervalo.

Intervalo	Signo de $(x + 1)$	Signo de $(x - 1)$	Signo de $f'(x)$
$(-\infty, -1)$	−	−	+
$(-1, 1)$	+	−	−
$(1, +\infty)$	+	+	+

Paso 3. Concluir la monotonía.

- $f'(x) > 0$ en $(-\infty, -1)$: f es **estrictamente creciente**.
- $f'(x) < 0$ en $(-1, 1)$: f es **estrictamente decreciente**.
- $f'(x) > 0$ en $(1, +\infty)$: f es **estrictamente creciente**.

Los valores $f(-1) = 2$ y $f(1) = -2$ corresponden respectivamente a un máximo local y un mínimo local de f . □




Figura 6.1: Monotonía de $f(x) = x^3 - 3x$: la curva se colorea según el signo de f' .

La **concavidad** describe hacia qué lado «abre» la curva de f en cada intervalo: como una taza ($\smile$) o como una cúpula ($\frown$). Geométricamente, una figura es *convexa* si el segmento que une cualquier par de puntos interiores permanece dentro de ella, y *cóncava* en caso contrario. En el análisis de funciones, este comportamiento lo detecta la segunda derivada: su signo indica si la pendiente f' crece o decrece a medida que x avanza.

Definición 6.16. La gráfica de f es **cóncava hacia arriba** en (a, b) si f' es creciente en ese intervalo, y **cóncava hacia abajo** si f' es decreciente. Equivalentemente:

$f''(x) > 0 \implies$ cóncava hacia arriba, $f''(x) < 0 \implies$ cóncava hacia abajo.

Un punto c es un **punto de inflexión** de f si f es continua en c y la concavidad cambia de signo en c .

Observación 6.17. Un punto donde $f''(c) = 0$ no es necesariamente un punto de inflexión: se requiere que f'' cambie de signo en c . La función $f(x) = x^4$ satisface $f''(0) = 0$, pero la concavidad no cambia en $x = 0$ (es cóncava hacia arriba en todo $\mathbb{R}$), por lo que $x = 0$ no es punto de inflexión.

Ejemplo 6.18. Determinar los intervalos de concavidad y los puntos de inflexión de $f(x) = x^4 - 4x^3$.

Solución: Paso 1. Calcular f'' y encontrar los puntos candidatos a inflexión.

$f'(x) = 4x^3 - 12x^2$, $f''(x) = 12x^2 - 24x = 12x(x - 2)$. Los ceros de f'' son los candidatos a puntos de inflexión: $12x(x - 2) = 0 \implies x = 0$ o $x = 2$. Estos valores dividen la recta real en tres intervalos: $(-\infty, 0)$, $(0, 2)$ y $(2, +\infty)$.

Paso 2. Analizar el signo de f'' en cada intervalo.

Intervalo	Signo de $12x$	Signo de $(x - 2)$	Signo de $f''(x)$	Concavidad
$(-\infty, 0)$	$-$	$-$	$+$	hacia arriba $\smile$
$(0, 2)$	$+$	$-$	$-$	hacia abajo $\frown$
$(2, +\infty)$	$+$	$+$	$+$	hacia arriba $\smile$

Paso 3. Identificar los puntos de inflexión.
En $x = 0$ y $x = 2$ la concavidad cambia de signo, por lo que ambos son puntos de inflexión. Sus imágenes son: $f(0) = 0$, $f(2) = 16 - 32 = -16$. Los puntos de inflexión son $(0, 0)$ y $(2, -16)$.




Figura 6.2: Concavidad de $f(x) = x^4 - 4x^3$: en azul los tramos donde $f'' > 0$ (curva abre hacia arriba) y en rojo donde $f'' < 0$ (curva abre hacia abajo). Los puntos negros señalan los puntos de inflexión.

Las herramientas desarrolladas hasta ahora de monotonía y concavidad permiten caracterizar puntos especiales que son máximos o mínimos, no en el dominio completo de f , sino en una vecindad reducida alrededor de un punto. Estos se denominan **extremos locales** y representan los *picos* y *valles* de la gráfica. Su localización se apoya en los puntos críticos y puede abordarse mediante dos criterios: uno basado en el cambio de signo de f' y otro, más ágil cuando es aplicable, basado en el signo de f'' .

Definición 6.19. $f(c)$ es un **máximo local** si existe un intervalo abierto (a, b) que contiene a c tal que $f(c) \geq f(x)$ para todo $x \in (a, b)$. Análogamente se define el **mínimo local**.

Teorema 6.20 (Criterio de la primera derivada). *Sea c un punto crítico de f :*

- Si f' cambia de $+$ a $-$ en c : **máximo local**.
- Si f' cambia de $-$ a $+$ en c : **mínimo local**.
- Si f' no cambia de signo en c : no hay extremo local.

Teorema 6.21 (Criterio de la segunda derivada). Si $f'(c) = 0$ y $f''(c)$ existe:

- $f''(c) < 0$: **máximo local** (la curva es cóncava hacia abajo en c).
- $f''(c) > 0$: **mínimo local** (la curva es cóncava hacia arriba en c).
- $f''(c) = 0$: el criterio es **inconcluso**; puede haber máximo, mínimo o punto de inflexión.

Observación 6.22. El caso $f''(c) = 0$ ilustra la importancia de no abandonar el análisis prematuramente. Para $f(x) = x^4$, se tiene $f'(0) = 0$ y $f''(0) = 0$, pero $x = 0$ es un mínimo local; para $f(x) = x^3$, las mismas condiciones se cumplen en $x = 0$, pero se trata de un punto de inflexión. El criterio de la segunda derivada no distingue estos casos, por lo que siempre debe recurrirse al de la primera derivada cuando $f''(c) = 0$.

Ejemplo 6.23. Analizar completamente $f(x) = x^4 - 4x^3$.

Solución: Paso 1. Dominio e información básica.

f es un polinomio, por lo que su dominio es $\mathbb{R}$, es continua y derivable en todo punto. Como el término dominante es $x^4 > 0$, la función tiende a $+\infty$ en ambos extremos.

Paso 2. Puntos críticos y monotonía.

Se calcula la primera derivada y se factoriza:

$$f'(x) = 4x^3 - 12x^2 = 4x^2(x - 3).$$

Los puntos críticos, donde $f'(x) = 0$, son $x = 0$ y $x = 3$. Estos dos valores dividen la recta real en tres intervalos. Se analiza el signo de cada factor en cada uno de ellos:

Intervalo	Signo de $4x^2$	Signo de $(x - 3)$	Signo de $f'(x)$	Monotonía
$(-\infty, 0)$	+	-	-	decreciente
$(0, 3)$	+	-	-	decreciente
$(3, +\infty)$	+	+	+	creciente

Nótese que f' mantiene el signo negativo a ambos lados de $x = 0$: la función sigue decreciendo sin interrupciones al pasar por ese punto, de modo que **no hay extremo local en $x = 0$** . En cambio, en $x = 3$ la derivada cambia de $-$ a $+$, lo que por el criterio de la primera derivada confirma un **mínimo local**:

$$f(3) = 81 - 108 = -27.$$

Paso 3. Concavidad y puntos de inflexión.

Se calcula la segunda derivada:

$$f''(x) = 12x^2 - 24x = 12x(x - 2).$$

Los candidatos a puntos de inflexión son $x = 0$ y $x = 2$. Se analiza el signo de f'' en los tres intervalos resultantes:

Intervalo	Signo de $12x$	Signo de $(x - 2)$	Signo de $f''(x)$	Concavidad
$(-\infty, 0)$	-	-	+	hacia arriba $\smile$
$(0, 2)$	+	-	-	hacia abajo $\frown$
$(2, +\infty)$	+	+	+	hacia arriba $\smile$

Como f'' cambia de signo en $x = 0$ (de $+$ a $-$) y en $x = 2$ (de $-$ a $+$), ambos son **puntos de inflexión**. Sus imágenes son:

$$f(0) = 0, \quad f(2) = 16 - 32 = -16.$$

Se puede aplicar también el criterio de la segunda derivada en $x = 3$ para confirmar el mínimo: $f''(3) = 12(3)(1) = 36 > 0$, lo que indica concavidad hacia arriba, consistente con un mínimo

local. En $x = 0$, en cambio, $f''(0) = 0$, por lo que el criterio de la segunda derivada es inconcluso allí; fue el análisis de la primera derivada el que permitió concluir que no hay extremo en ese punto.

Resumen del análisis completo.

Punto	Clasificación
$x = 0$	Punto de inflexión en $(0, 0)$; no es extremo local.
$x = 2$	Punto de inflexión en $(2, -16)$.
$x = 3$	Mínimo local en $(3, -27)$.

La función decrece en $(-\infty, 3)$, alcanza su único mínimo local en $x = 3$, y crece en $(3, +\infty)$. La concavidad cambia en $x = 0$ y $x = 2$, que son los únicos puntos de inflexión. El bosquejo de la función puede revisarse nuevamente en la figura 6.2.

6.3

Trazado Sistemático de Curvas

El análisis desarrollado en las secciones anteriores no es un fin en sí mismo: monotonía, concavidad, extremos locales y puntos de inflexión son piezas de un mismo rompecabezas cuyo resultado final es la comprensión global del comportamiento de una función. Reunir todas estas herramientas en un procedimiento ordenado permite **bosquejar la gráfica de cualquier función** de manera rigurosa, sin depender de tablas de valores construidas punto a punto. La ventaja de este enfoque es doble: por un lado, la gráfica resultante refleja fielmente la estructura matemática de f ; por el otro, el proceso mismo de análisis obliga a comprender la función antes de representarla. El protocolo que se presenta a continuación organiza ese proceso en cuatro etapas progresivas, donde cada paso alimenta al siguiente.

Construcción 6.24. Para bosquejar la gráfica de una función es posible seguir el siguiente proceso sistemático:

- 1. **Análisis previo.** Determinar dominio, rango (si es posible), simetría (par/impar/periódica), intersecciones con los ejes y comportamiento asintótico ($x \rightarrow \pm\infty$, puntos singulares).
- 2. **Primera derivada.** Calcular f' , hallar puntos críticos, determinar intervalos de crecimiento y decrecimiento, clasificar extremos locales.
- 3. **Segunda derivada.** Calcular f'' , determinar intervalos de concavidad y localizar puntos de inflexión.
- 4. **Tabla y bosquejo.** Resumir toda la información en una tabla de puntos clave. Trazar primero las asíntotas, luego los puntos especiales, y conectarlos respetando la monotonía y la concavidad.

Ejemplo 6.25. Trazar la curva $f(x) = \frac{x^2}{x^2 - 4}$.

Solución: Paso 1. Análisis previo.

Dominio. El denominador $x^2 - 4 = (x - 2)(x + 2)$ se anula en $x = \pm 2$, de modo que el dominio es $\mathbb{R} \setminus \{-2, 2\}$.

Simetría. Como $f(-x) = \frac{(-x)^2}{(-x)^2 - 4} = \frac{x^2}{x^2 - 4} = f(x)$, la función es **par**: su gráfica es simétrica respecto al eje y . Esto permite analizar $x \geq 0$ y reflejar.

Intersecciones. En $x = 0$: $f(0) = 0$, luego la curva pasa por el origen. La ecuación $f(x) = 0$ implica $x^2 = 0$, es decir, $x = 0$ es la única intersección con ambos ejes.

Asíntotas verticales. En $x = 2$ y $x = -2$ el denominador se anula y el numerador no, por lo que existen asíntotas verticales en ambos puntos. Analizando los límites laterales en $x = 2$:

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = -\infty, \qquad \lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = +\infty,$$

y por simetría los comportamientos en $x = -2$ son opuestos.
Asíntota horizontal. Dividiendo numerador y denominador entre x^2 :

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{1}{1 - 4/x^2} = 1,$$

de modo que $y = 1$ es asíntota horizontal. Nótese además que $f(x) = 1$ no tiene solución ($x^2 = x^2 - 4$ es imposible), así que la curva nunca toca su propia asíntota horizontal.

Paso 2. Primera derivada: monotonía y extremos locales.

Aplicando la regla del cociente:

$$f'(x) = \frac{2x(x^2 - 4) - x^2 \cdot 2x}{(x^2 - 4)^2} = \frac{2x^3 - 8x - 2x^3}{(x^2 - 4)^2} = \frac{-8x}{(x^2 - 4)^2}.$$

El único punto crítico interior al dominio es $x = 0$, pues $f'(x) = 0$ implica $x = 0$. Como $(x^2 - 4)^2 > 0$ siempre, el signo de f' queda determinado únicamente por $-8x$:

Intervalo	Signo de $f'(x)$	Monotonía
$(-\infty, -2)$	+	creciente
$(-2, 0)$	+	creciente
$(0, 2)$	-	decreciente
$(2, +\infty)$	-	decreciente

En $x = 0$ la derivada cambia de $+$ a $-$, lo que indica un **máximo local** con valor $f(0) = 0$. Obsérvese que, aunque la función crece en $(-\infty, -2)$ y en $(-2, 0)$, estos son intervalos separados por la discontinuidad en $x = -2$; no se puede afirmar que f crece en $(-\infty, 0)$ en su conjunto.

Paso 3. Segunda derivada: concavidad y puntos de inflexión.

Derivando $f'(x) = \frac{-8x}{(x^2 - 4)^2}$ mediante la regla del cociente:

$$f''(x) = \frac{-8(x^2 - 4)^2 - (-8x) \cdot 2(x^2 - 4) \cdot 2x}{(x^2 - 4)^4} = \frac{-8(x^2 - 4) + 32x^2}{(x^2 - 4)^3} = \frac{8(3x^2 + 4)}{(x^2 - 4)^3}.$$

El numerador $8(3x^2 + 4) > 0$ para todo $x \in \mathbb{R}$, de modo que el signo de f'' depende exclusivamente del denominador $(x^2 - 4)^3$:

Intervalo	Signo de $(x^2 - 4)^3$	Signo de $f''(x)$	Concavidad
$(-\infty, -2)$	+	+	hacia arriba $\smile$
$(-2, 2)$	-	-	hacia abajo $\frown$
$(2, +\infty)$	+	+	hacia arriba $\smile$

Como $f''(x) = 0$ no tiene solución real, **no hay puntos de inflexión**. La concavidad cambia únicamente en las asíntotas verticales, que no pertenecen al dominio.

Paso 4. Tabla resumen y bosquejo.

Intervalo	f'	f''	Comportamiento
$(-\infty, -2)$	+	+	creciente, cóncava $\uparrow$
$(-2, 0)$	+	-	creciente, cóncava $\downarrow$
$(0, 2)$	-	-	decreciente, cóncava $\downarrow$
$(2, +\infty)$	-	+	decreciente, cóncava $\uparrow$

Puntos clave: máximo local en $(0, 0)$; asíntotas verticales $x = \pm 2$; asíntota horizontal $y = 1$. $\square$




Figura 6.3: Bosquejo de $f(x) = \frac{x^2}{x^2 - 4}$. Las ramas azules son cóncavas hacia arriba y las rojas hacia abajo. Las líneas grises punteadas indican las asíntotas $x = \pm 2$ e $y = 1$.

6.4

Optimización

El trazado sistemático de curvas muestra que el cálculo diferencial permite entender el comportamiento global de una función: dónde crece, dónde decrece, dónde alcanza sus picos y valles. Este mismo aparato puede orientarse hacia una pregunta de enorme utilidad práctica: ¿cuál es el *mejor* valor posible de una cantidad? Diseñar un envase con el menor material posible, determinar el precio que maximiza los ingresos de una empresa, o encontrar la trayectoria de menor tiempo entre dos puntos son problemas que, en apariencia, pertenecen a dominios muy distintos. Sin embargo, todos comparten la misma estructura matemática: existe una **función objetivo** que se desea maximizar o minimizar, y una o varias **restricciones** que acotan los valores admisibles de las variables. El cálculo diferencial resuelve esta clase de problemas de forma exacta, localizando los puntos críticos de la función objetivo y clasificándolos mediante los criterios de la primera o la segunda derivada. El procedimiento sistemático es el siguiente.


Construcción 6.26. El siguiente es un procedimiento sistemático para resolver problemas de optimización:

1. **Diagrama y variables.** Asignar símbolos a todas las cantidades relevantes y realizar un diagrama representativo.
2. **Función objetivo.** Escribir la fórmula de la cantidad Q que se desea optimizar.
3. **Reducción a una variable.** Usar las restricciones para expresar Q en función de una sola variable y determinar su dominio.
4. **Localizar puntos críticos.** Resolver $\frac{dQ}{dx} = 0$ y verificar singularidades o extremos del dominio.
5. **Clasificar el extremo.** Usar el criterio de la primera o segunda derivada para confirmar que se trata de un máximo o mínimo.

Ejemplo 6.27. De una hoja rectangular de 24×9 cm se recortan cuadrados iguales en las esquinas y se doblan los bordes para formar una caja abierta. ¿Qué tamaño deben tener los cuadrados para maximizar el volumen?

Solución: Paso 1. Diagrama y variables.

Sea x el lado (en cm) de cada cuadrado recortado en las esquinas. Al doblar los bordes, la caja resultante tiene: base de $(24 - 2x) \times (9 - 2x)$ cm y altura x cm.



Paso 2. Función objetivo.

La cantidad a maximizar es el volumen de la caja:

$$V = \text{base} \times \text{altura} = (24 - 2x)(9 - 2x) \cdot x.$$

Paso 3. Reducción a una variable y dominio.

Expandiendo el producto:

$$V(x) = x(24 - 2x)(9 - 2x) = x(216 - 48x - 18x + 4x^2) = 4x^3 - 66x^2 + 216x.$$

Para que la caja exista se necesita $x > 0$ y $9 - 2x > 0$, de modo que el dominio es $x \in (0, \frac{9}{2})$.

Paso 4. Localizar puntos críticos.

$$V'(x) = 12x^2 - 132x + 216 = 12(x^2 - 11x + 18) = 12(x - 2)(x - 9).$$

Las raíces son $x = 2$ y $x = 9$. Como $x = 9 \notin (0, \frac{9}{2})$, el único punto crítico interior es $x = 2$.

Paso 5. Clasificar el extremo.

Se aplica el criterio de la segunda derivada:

$$V''(x) = 24x - 132 \implies V''(2) = 48 - 132 = -84 < 0.$$

El signo negativo confirma un **máximo local** en $x = 2$. Comparando con los extremos del dominio, donde $V(0) = V(\frac{9}{2}) = 0$, se concluye que $x = 2$ produce el **máximo absoluto** en el intervalo. El volumen máximo es:


$$V(2) = 2(24 - 4)(9 - 4) = 2 \cdot 20 \cdot 5 = \boxed{200 \text{ cm}^3}.$$

Los cuadrados deben tener **2 cm de lado**. $\square$

Ejemplo 6.28. Se desea construir una lata cilíndrica sin tapa de volumen V_0 . Encontrar las dimensiones que minimizan el área total de material utilizado.

Solución: Paso 1. Diagrama y variables.

Sean r el radio de la base y h la altura del cilindro.



Paso 2. Función objetivo.

El área total de material (base circular más pared lateral) es:

$$A = \pi r^2 + 2\pi rh.$$

Paso 3. Reducción a una variable y dominio.

La restricción de volumen es $\pi r^2 h = V_0$, de donde $h = \frac{V_0}{\pi r^2}$. Sustituyendo en A :

$$A(r) = \pi r^2 + 2\pi r \cdot \frac{V_0}{\pi r^2} = \pi r^2 + \frac{2V_0}{r}, \quad r \in (0, +\infty).$$

Paso 4. Localizar puntos críticos.

$$A'(r) = 2\pi r - \frac{2V_0}{r^2} = 0 \implies 2\pi r = \frac{2V_0}{r^2} \implies r^3 = \frac{V_0}{\pi} \implies r = \left(\frac{V_0}{\pi}\right)^{1/3}.$$

Paso 5. Clasificar el extremo.

$$A''(r) = 2\pi + \frac{4V_0}{r^3} > 0 \quad \text{para todo } r > 0,$$

lo que confirma un **mínimo**. La altura óptima vale:


$$h = \frac{V_0}{\pi r^2} = \frac{\pi r^3}{\pi r^2} = r.$$

La lata de menor material se obtiene cuando **la altura iguala al radio**: $h = r = \left(\frac{V_0}{\pi}\right)^{1/3}$. $\square$

Ejemplo 6.29. Una tubería debe ir desde el punto A en una orilla de un río de 3 km de ancho hasta el punto B , situado 8 km aguas abajo en la orilla opuesta. Tender tubería por el río cuesta \$200/km y por tierra \$100/km. ¿Dónde debe cruzar el río para minimizar el costo total?

Solución: Paso 1. Diagrama y variables.

Sea C el punto de cruce en la orilla de B , y sea x la distancia horizontal desde el punto directamente opuesto a A hasta C , con $x \in [0, 8]$.



Paso 2. Función objetivo.

El costo total combina el tramo subacuático $A \rightarrow C$ y el tramo terrestre $C \rightarrow B$:

$$\text{Costo}(x) = 200\sqrt{9 + x^2} + 100(8 - x), \quad x \in [0, 8].$$

Paso 3. Reducción a una variable y dominio.

La función ya depende de una sola variable x . El dominio es el intervalo cerrado $[0, 8]$, lo que garantiza la existencia del mínimo absoluto por el Teorema del Valor Extremo.

Paso 4. Localizar puntos críticos.

$$\begin{aligned} \text{Costo}'(x) = \frac{200x}{\sqrt{9 + x^2}} - 100 = 0 &\implies \frac{2x}{\sqrt{9 + x^2}} = 1 \\ &\implies 4x^2 = 9 + x^2 \\ &\implies 3x^2 = 9 \implies x = \sqrt{3} \approx 1,73 \text{ km.} \end{aligned}$$

El valor negativo $x = -\sqrt{3}$ queda fuera del dominio y se descarta.

Paso 5. Clasificar el extremo.

$$\text{Costo}''(x) = \frac{200 \cdot 9}{(9 + x^2)^{3/2}} > 0 \quad \text{para todo } x \in [0, 8],$$

lo que confirma un **mínimo**. Comparando con los extremos del intervalo:

$$\begin{aligned} \text{Costo}(0) &= 200(3) + 100(8) = 1400 \text{ USD} \\ \text{Costo}(8) &= 200\sqrt{73} \approx 1709 \text{ USD} \\ \text{Costo}(\sqrt{3}) &= 200(2\sqrt{3}) + 100(8 - \sqrt{3}) \approx \boxed{1292,8 \text{ USD}}. \end{aligned}$$

El cruce óptimo se ubica a $\sqrt{3} \approx 1,73 \text{ km}$ del punto P directamente opuesto a A , produciendo el costo mínimo de aproximadamente \$1292,8 USD. $\square$

6.5

El Teorema del Valor Medio

Los criterios de monotonía y optimización desarrollados en las secciones anteriores descansan sobre una garantía más profunda: si una función es suficientemente regular en un intervalo, su derivada no puede comportarse de forma arbitraria. El resultado que formaliza esta idea es el **Teorema del Valor Medio**, uno de los teoremas más importantes del cálculo diferencial. Su punto de partida es un caso particular elemental, conocido como el Lema de Rolle, que captura una observación geométrica sencilla: si una curva comienza y termina a la misma altura, en algún punto intermedio debe ser horizontal.

Lema 6.30 (Rolle). *Si f es continua en $[a, b]$, derivable en (a, b) y $f(a) = f(b)$, entonces existe al menos un $c \in (a, b)$ tal que $f'(c) = 0$.*

El Teorema del Valor Medio generaliza esta idea eliminando la exigencia de que los extremos tengan la misma imagen: ahora se garantiza la existencia de un punto donde la pendiente de la tangente coincide con la pendiente de la recta que une los dos extremos de la curva.

Teorema 6.31 (del Valor Medio de Lagrange). *Si f es continua en $[a, b]$ y derivable en (a, b) , existe al menos un $c \in (a, b)$ tal que*

$$f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}.$$

Geométricamente, el TVM garantiza que existe un punto en la curva donde la recta tangente es **paralela** a la recta secante que une los extremos del intervalo. La interpretación física es igualmente iluminadora: si un automóvil recorre 120 km en 2 horas (velocidad promedio 60 km/h), en algún instante exacto su velocidad instantánea fue exactamente 60 km/h. El siguiente ejemplo muestra que el TVM no es un resultado independiente, sino una consecuencia directa del Lema de Rolle.

Ejemplo 6.32. Demostrar el Teorema del Valor Medio a partir del Lema de Rolle.

Solución: La idea es construir una función auxiliar que «aplane» la secante, transformando el problema general en uno al que Rolle puede aplicarse. Se define:

$$h(x) = f(x) - f(a) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a}(x - a).$$

Geométricamente, $h(x)$ mide la distancia vertical entre la curva f y la recta secante que une $(a, f(a))$ con $(b, f(b))$. Se verifican las hipótesis del Lema de Rolle:

- h es continua en $[a, b]$ y derivable en (a, b) , pues f lo es y la función lineal restada también.
- $h(a) = f(a) - f(a) - 0 = 0$.
- $h(b) = f(b) - f(a) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a}(b - a) = f(b) - f(a) - (f(b) - f(a)) = 0$.

Como $h(a) = h(b) = 0$, el Lema de Rolle garantiza la existencia de $c \in (a, b)$ con $h'(c) = 0$. Calculando h' :

$$h'(x) = f'(x) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a},$$

de modo que $h'(c) = 0$ equivale exactamente a:

$$f'(c) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a} = 0 \implies f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}. \quad \square$$

Una consecuencia inmediata del TVM es el siguiente corolario, que constituye el fundamento teórico de la integración indefinida.

Corolario 6.33. Si $F'(x) = G'(x)$ para todo $x \in (a, b)$, entonces $F(x) = G(x) + C$ para alguna constante C .

Observación 6.34. Este corolario justifica el “+C” que aparece en toda antiderivada: dos funciones que tienen la misma derivada en un intervalo solo pueden diferir en una constante aditiva. Sin el TVM, esta afirmación, que parece obvia, carecería de demostración rigurosa.

Ejemplo 6.35. Verificar el Teorema del Valor Medio para $f(x) = x^3 - x$ en $[0, 2]$ y encontrar el valor c garantizado por el teorema.

Solución: Como f es un polinomio, es continua en $[0, 2]$ y derivable en $(0, 2)$, por lo que el TVM es aplicable.

Paso 1. Calcular la pendiente de la recta secante. $f(0) = 0$, $f(2) = 8 - 2 = 6$. La pendiente de la secante que une los extremos del intervalo es:

$$m = \frac{f(2) - f(0)}{2 - 0} = \frac{6 - 0}{2} = 3.$$

Paso 2. Igualar la derivada a dicha pendiente. $f'(x) = 3x^2 - 1$. El TVM garantiza que existe $c \in (0, 2)$ tal que $f'(c) = 3$:

$$3c^2 - 1 = 3 \implies c^2 = \frac{4}{3} \implies c = \frac{2}{\sqrt{3}} = \frac{2\sqrt{3}}{3} \approx 1,155.$$

La raíz negativa $c = -\frac{2}{\sqrt{3}}$ queda fuera de $(0, 2)$ y se descarta.

Paso 3. Verificar.

El valor $c = \frac{2\sqrt{3}}{3} \approx 1,155$ pertenece efectivamente a $(0, 2)$, lo que confirma la conclusión del TVM: en ese punto la tangente a la curva es paralela a la recta secante de pendiente 3. $\square$

6.6

Regla de L'Hôpital

Al calcular límites, es frecuente encontrar expresiones donde numerador y denominador tienden simultáneamente a cero o a infinito. En estos casos, la forma del cociente no permite determinar directamente el valor del límite, pues se obtienen expresiones sin significado algebraico definido como $\frac{0}{0}$ o $\frac{\infty}{\infty}$: se habla entonces de **formas indeterminadas**. La Regla de L'Hôpital ofrece una herramienta sistemática para resolver esta clase de límites recurriendo a las derivadas del numerador y del denominador. Su potencia radica en que convierte un problema de límites en un nuevo problema de límites (generalmente más sencillo) sin alterar el valor buscado. Sin embargo, debe aplicarse con precisión: solo es válida bajo condiciones específicas, y su uso incorrecto conduce a resultados erróneos.

Teorema 6.36 (Regla de L'Hôpital). *Supóngase que $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = 0$ y $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = 0$ tiene forma $\frac{0}{0}$, o que ambos tienden a $\pm\infty$ tiene forma $\frac{\infty}{\infty}$. Si f y g son derivables cerca de a , $g'(x) \neq 0$ allí, y el límite $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)}$ existe (o es $\pm\infty$), entonces*

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)}.$$

El resultado también vale para $a = \pm\infty$ y para límites laterales.

Observación 6.37. La regla exige derivar **numerador y denominador por separado**, no aplicar la regla del cociente. Dos errores frecuentes merecen atención especial: el primero es aplicarla cuando el límite no es una forma indeterminada, lo que produce resultados incorrectos; y el segundo aplicarla repetidamente sin verificar que el nuevo cociente siga siendo indeterminado. Si tras una aplicación el límite permanece indeterminado, la regla puede reiterarse; si el cociente de derivadas oscila sin converger, conviene buscar un método alternativo.

Además de $\frac{0}{0}$ y $\frac{\infty}{\infty}$, existen otras formas indeterminadas que no son cocientes directos. La tabla siguiente muestra cómo reducirlas a una de las dos formas en que L'Hôpital es aplicable.

Forma	Transformación	Reduce a
$0 \cdot \infty$	$f \cdot g = \frac{f}{1/g} \text{ o } \frac{g}{1/f}$	$0/0 \text{ o } \infty/\infty$
$\infty - \infty$	denominador común o racionalización	$0/0$
$0^0, 1^\infty, \infty^0$	$y = f^g \Rightarrow \ln y = g \ln f$; hallar $\lim \ln y = L$	$0/0 \text{ o } \infty/\infty$; resultado: e^L

Los cuatro ejemplos que siguen ilustran cada tipo de forma indeterminada.

Ejemplo 6.38. Calcular $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1 - x}{x^2}$.

Solución: **Identificación de la forma.** Al sustituir $x = 0$ se obtiene $\frac{e^0 - 1 - 0}{0^2} = \frac{0}{0}$: forma indeterminada, L'Hôpital es aplicable.

Primera aplicación. Se derivan numerador y denominador:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1 - x}{x^2} \stackrel{\text{L'H}}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{2x}.$$

Al sustituir $x = 0$: $\frac{0}{0}$. La forma sigue siendo indeterminada, por lo que se puede aplicar la regla una segunda vez.

Segunda aplicación.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{2x} \stackrel{\text{L'H}}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x}{2} = \frac{e^0}{2} = \frac{1}{2}.$$

Esta vez el límite existe y es finito. Concluimos:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1 - x}{x^2} = \frac{1}{2}. \quad \square$$

Ejemplo 6.39. Calcular $\lim_{x \rightarrow \infty} x e^{-x}$.

Solución: Identificación de la forma. Cuando $x \rightarrow \infty$, el factor $x \rightarrow \infty$ y el factor $e^{-x} \rightarrow 0$: forma indeterminada $\infty \cdot 0$. L'Hôpital no se aplica directamente a productos, por lo que se reescribe como cociente. Se elige poner e^{-x} en el denominador:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} x e^{-x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x}{e^x}.$$

Ahora la forma es $\frac{\infty}{\infty}$, sobre la que L'Hôpital sí actúa.

Aplicación de la regla.

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x}{e^x} \stackrel{\text{L'H}}{=} \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{e^x} = 0.$$

El exponencial domina al polinomio, y el límite vale:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} x e^{-x} = 0. \quad \square$$

Ejemplo 6.40. Calcular $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^x$.

Solución: Identificación de la forma. Cuando $x \rightarrow 0^+$, la base tiende a 0 y el exponente también: forma indeterminada 0^0 . Se aplica la estrategia logarítmica. Sea $y = x^x$; tomando logaritmo natural:

$$\ln y = x \ln x.$$

Cuando $x \rightarrow 0^+$, esto es una forma $0 \cdot (-\infty)$, que se convierte en cociente:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln x}{1/x}.$$

Ahora la forma es $\frac{-\infty}{+\infty}$, a la que se aplica L'Hôpital:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln x}{1/x} \stackrel{\text{L'H}}{=} \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1/x}{-1/x^2} = \lim_{x \rightarrow 0^+} (-x) = 0.$$

Luego $\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln y = 0$. Como la función exponencial es continua, se puede pasar el límite al exponente:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} y = e^{\lim \ln y} = e^0 = 1.$$

Por tanto:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} x^x = 1. \quad \square$$

Ejemplo 6.41. Calcular $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{a}{x}\right)^x$.

Solución: **Identificación de la forma.** Cuando $x \rightarrow \infty$, la base tiende a 1 y el exponente a ∞ : forma indeterminada 1^∞ . Se aplica de nuevo la estrategia logarítmica. Sea $y = \left(1 + \frac{a}{x}\right)^x$; entonces:

$$\ln y = x \ln \left(1 + \frac{a}{x}\right).$$

Cuando $x \rightarrow \infty$, esto es $\infty \cdot 0$. Se reescribe como cociente para aplicar L'Hôpital:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} x \ln \left(1 + \frac{a}{x}\right) = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln(1 + a/x)}{1/x}.$$

La forma es $\frac{0}{0}$. Derivando numerador y denominador respecto a x :

$$\stackrel{\text{L'H}}{=} \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{1 + a/x} \cdot \frac{-a}{x^2}}{-\frac{1}{x^2}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{a}{1 + a/x} = \frac{a}{1 + 0} = a.$$

Luego $\lim_{x \rightarrow \infty} \ln y = a$, y por continuidad del exponencial:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{a}{x}\right)^x = e^a.$$

En particular, para $a = 1$ se recupera el célebre límite notable $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e$. $\square$

6.7

Métodos Numéricos para la Localización de Raíces

Las herramientas del cálculo diferencial permiten analizar y graficar funciones con precisión, pero no siempre garantizan expresiones cerradas para sus raíces. Ecuaciones como $e^x = 3x$ o $\cos x = x$ no admiten solución algebraica exacta, y sin embargo sus raíces tienen plena existencia y significado. En estos casos se recurre a los **métodos numéricos**: algoritmos iterativos que construyen sucesiones de aproximaciones cada vez más próximas a la raíz buscada. En esta sección se estudian tres métodos clásicos, los métodos de bisección, Newton-Raphson y punto fijo, cada uno con distintos requisitos, velocidad de convergencia y grado de robustez. La tabla al final de la sección permite compararlos de un vistazo.

6.7.1

Bisección

El método de bisección es una aplicación directa del Teorema del Valor Intermedio (Bolzano): si f es continua en $[a, b]$ y $f(a) \cdot f(b) < 0$, la función cambia de signo en el intervalo y, por tanto, tiene al menos una raíz en su interior. El método explota esta garantía de forma sistemática: en cada paso se evalúa el punto medio $m = \frac{a+b}{2}$ y se determina en cuál de los dos subintervalos $[a, m]$ o $[m, b]$ persiste el cambio de signo; ese subintervalo se convierte en el nuevo intervalo de búsqueda y el proceso se repite. Tras n iteraciones, la raíz está acotada con un error menor que

$$\varepsilon_n < \frac{b-a}{2^n},$$

lo que permite estimar de antemano cuántas iteraciones son necesarias para alcanzar una precisión dada.

Observación 6.42. La bisección es el método más **robusto**: converge siempre que se cumplan las hipótesis de continuidad y cambio de signo, sin importar la forma de f . Su desventaja es la velocidad: la convergencia es **lineal**, es decir, el número de cifras decimales correctas crece a razón de una cifra cada $\log_2 10 \approx 3,32$ iteraciones. Para obtener k cifras adicionales de precisión se requieren aproximadamente $3,32 k$ iteraciones.

6.7.2

Método de Newton-Raphson

El método de Newton-Raphson parte de una idea geométrica: si se conoce una aproximación x_n a la raíz, la recta tangente a la curva en el punto $(x_n, f(x_n))$ suele cruzar el eje x en un punto x_{n+1} más próximo a la raíz verdadera. Repitiendo este proceso se construye la sucesión:

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}.$$

Ejemplo 6.43. Construya geoméricamente el método de Newton-Raphson

Solución: La recta tangente a f en el punto $(x_n, f(x_n))$ tiene ecuación

$$y - f(x_n) = f'(x_n)(x - x_n).$$

Igualando $y = 0$ para hallar su intersección con el eje x :

$$x = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)} =: x_{n+1}. \quad \square$$

La convergencia de Newton-Raphson es **cuadrática**: el número de cifras decimales correctas se *duplica* en cada iteración cuando la aproximación es suficientemente cercana a la raíz. Esta velocidad lo convierte en el método preferido en la práctica. Sin embargo, presenta limitaciones importantes: falla si $f'(x_n) = 0$ en algún paso (división por cero), puede diverger si la aproximación inicial x_0 está lejos de la raíz, y es sensible a oscilaciones de f que desvíen las iteraciones. La elección de un buen punto de partida, guiada por el análisis previo de la función, es parte esencial de su uso correcto.

Ejemplo 6.44. Aproximar $\sqrt{2}$ resolviendo $f(x) = x^2 - 2 = 0$ con Newton-Raphson y valor inicial $x_0 = 1$.

Solución: Con $f(x) = x^2 - 2$ y $f'(x) = 2x$, la iteración se simplifica a:

$$x_{n+1} = x_n - \frac{x_n^2 - 2}{2x_n} = \frac{x_n + 2/x_n}{2},$$

que es la media aritmética de x_n y $2/x_n$. Aplicando la fórmula repetidamente:

n	x_n
0	1
1	1,5
2	1,41 $\bar{6}$
3	1,41421356...

Con apenas tres iteraciones se obtienen ocho cifras decimales correctas, ilustrando la velocidad cuadrática del método. □

6.7.3

Método de Punto Fijo

El método de punto fijo aborda la ecuación $f(x) = 0$ desde una perspectiva distinta: se reescribe algebraicamente en la forma $x = g(x)$ y se itera la sucesión $x_{n+1} = g(x_n)$. Un **punto fijo** de g es un valor x^* tal que $g(x^*) = x^*$; si la reescritura es correcta, todo punto fijo de g es raíz de f . La convergencia de la sucesión depende de qué tan fuertemente g «contrae» el espacio en torno a x^* .

Teorema 6.45 (Convergencia del punto fijo). *Si $|g'(x)| < 1$ para todo x en un intervalo que contiene a la raíz, las iteraciones $x_{n+1} = g(x_n)$ convergen a ella desde cualquier punto inicial en ese intervalo.*

Observación 6.46. *La condición $|g'(x)| < 1$ se denomina **condición de contracción**: garantiza que g acerca entre sí los puntos sucesivos en cada iteración. Si $|g'(x)| > 1$, las iteraciones se alejan de la raíz. La reescritura $x = g(x)$ no es única: una misma ecuación puede admitir versiones convergentes y divergentes, por lo que elegir la adecuada es parte esencial del método. En la práctica, Newton-Raphson es un caso particular de punto fijo con $g(x) = x - \frac{f(x)}{f'(x)}$, cuya condición de contracción se satisface automáticamente cerca de raíces simples.*

Finalmente se realiza una comparación de los tres métodos

Método	Convergencia	Robustez	Requisitos
Bisección	Lineal	Alta	f continua y cambio de signo en $[a, b]$
Newton-Raphson	Cuadrática	Media	f derivable y buena aproximación x_0
Punto fijo	Lineal/variable	Baja	$ g' < 1$ en un entorno de la raíz

6.8

Problemas Propuestos

Problema 6.47. Determine el valor de verdad de las siguientes afirmaciones. Justifique su respuesta.


1. La función $f(x) = \frac{x + 1}{x - 1}$ en el intervalo $[-2, -1]$ satisface las hipótesis del Teorema del Valor Medio.
2. La recta tangente a $f(x) = 5 - x^2 + e^{2x-2}$ es horizontal en el punto $(1, 5)$.
3. Si f es derivable y $f(-1) = f(1)$, entonces existe $c \in (-1, 1)$ tal que $f'(c) = 0$.

4. Si f es creciente y positiva en I , entonces $g(x) = \frac{1}{f(x)}$ es positiva y decreciente en I .
5. El valor de $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{1+x^2}}{x+1}$ es 1.
6. El dominio de $f(x) = \sqrt{2x+5} + \ln(6-8x)$ es $\left[-\frac{5}{2}, \frac{3}{4}\right)$.

6.8.1

Razones de cambio relacionadas

- Problema 6.48.** El radio de un círculo crece a razón de 3 cm/s. ¿A qué tasa crece el área cuando el radio mide 10 cm?
- Problema 6.49.** Dos autos parten desde una intersección: uno hacia el norte a 60 km/h y otro hacia el este a 80 km/h. ¿A qué velocidad se separan 2 horas después?
- Problema 6.50.** Un globo esférico pierde aire a razón de 2 cm³/min. ¿A qué tasa decrece el radio cuando $r = 5$ cm?
- Problema 6.51.** Una cámara está situada 500 m de la base de un cohete en lanzamiento vertical. ¿A qué velocidad angular debe girar la cámara para seguir al cohete cuando este ha alcanzado 500 m de altura y sube a 300 m/s?
- Problema 6.52.** Un depósito tiene forma de tronco de cono, su radio inferior mide 2 m mientras que el radio superior mide 4 m y su altura mide 6 m. Este depósito se está llenando con agua a 3 m³/min. ¿A qué velocidad sube el nivel cuando $h = 3$ m?
- Problema 6.53.** Una embarcación parte al mediodía hacia el Norte a 30 km/h. Una hora después, una segunda embarcación parte del mismo lugar hacia el Este a 40 km/h. ¿Con qué rapidez se separan las dos embarcaciones a la 1:30 pm?
- Problema 6.54.** Un tanque lleno de agua tiene forma de cilindro recto de bases con diámetro 2 m y altura 6 m. Dentro hay un sólido cónico invertido cuya base coincide con la tapa superior del cilindro. Si el agua sale a razón de $\frac{1}{3}$ m³/hr, ¿con qué rapidez desciende el nivel del agua cuando la profundidad es de 3 m?
- Problema 6.55.** Un vaso de papel tiene forma cónica de altura 12 cm y radio 4 cm en la parte superior. Si se vierte agua a razón de 3 cm³/s, ¿qué tan rápido sube el nivel cuando la profundidad es de 6 cm?
- Problema 6.56.** Un recipiente cónico invertido tiene altura 16 cm y radio 5 cm en la parte superior. Un líquido escurre por las paredes a una tasa proporcional al área lateral en contacto con el líquido. Si se vierte líquido a razón de 2 cm³/min, el nivel desciende a 0,3 cm/min cuando la altura del líquido es 10 cm. ¿Con qué rapidez debe verse líquido para mantener una altura constante de 10 cm? Recuerde que el área lateral de un cono es $A = \pi r \ell$.
- Problema 6.57.** De un tanque hemisférico de radio 10 m entra agua a razón de 1 m³/min y sale por un orificio inferior a razón de $\frac{1}{5}$ m³/min. ¿A qué razón cambia la altura h del agua cuando la profundidad es de 5 m?
- Problema 6.58.** Un cono de radio r cm y altura h cm es introducido punta abajo a 2 cm/s dentro de un cilindro de radio R cm que contiene agua a altura h_2 . ¿Qué tan rápido sube el nivel del agua en el instante en que el cono queda totalmente sumergido?
- Problema 6.59.** Un cuadrado está inscrito en un círculo de radio r . ¿A qué razón cambia el área del cuadrado cuando el radio del círculo crece a razón de 4 pulg/min? Vea la figura:



Problema 6.60. Se deja caer una pelota desde una altura de 100 pies. Un segundo después, se deja caer otra pelota desde una altura de 75 pies. ¿Cuál de ellas llega primero al suelo?

Problema 6.61. Un niño va en bicicleta por un camino recto a 15 pies/s. A 45 pies del camino hay un globo que asciende verticalmente a 5 pies/s. Si el niño pasa bajo el globo, ¿qué tan rápido incrementa la distancia entre ellos 3 segundos después?

Problema 6.62. El dispositivo mostrado en la figura consta de dos ruedas dentadas, A y B , conectadas por una cadena que no desliza. Un brazo extendible une un punto fijo P con un punto T situado sobre el borde de la rueda B . El segmento PO mide 4 dm, y los radios de las ruedas A y B son 1 dm y 2 dm, respectivamente. Los segmentos AO y OP son perpendiculares. La rueda A gira a razón de una vuelta por segundo en sentido antihorario. Si inicialmente el punto T se encuentra sobre el segmento OP , ¿con qué rapidez cambia la longitud $x = PT$ cuando el ángulo $\theta = \angle POT$ es de 60° ?




Figura 6.4: Disposición geométrica del mecanismo y definición de variables.

6.8.2

Valores extremos y trazado de curvas

Problema 6.63. Encuentre los extremos absolutos de cada función en el intervalo dado:

- a) $f(x) = x^3 - 3x + 1$ en $[-2, 2]$
- b) $f(x) = \frac{x}{x^2 + 1}$ en $[-2, 2]$
- c) $f(x) = \sin x + \cos x$ en $[0, 2\pi]$
- d) $f(x) = x^{2/3}(x - 1)$ en $[-1, 2]$

Problema 6.64. Determine si la función $f(x) = x^{2/3}$ tiene extremos locales en $x = 0$. Justifique aunque la segunda derivada no exista en ese punto.

Problema 6.65. Para cada función, determine los intervalos de crecimiento, los intervalos de concavidad y los puntos de inflexión:

1. $f(x) = x^4 - 6x^2$

2. $f(x) = xe^{-x}$

3. $f(x) = \ln(x^2 + 1)$
4. $f(x) = x - \arctan x$

5. $f(x) = x^{2/3}(6 - x)$

6. $f(x) = e^{-x^2}$


Problema 6.66. Use el protocolo de trazado sistemático de curvas para las siguientes funciones:

- a) $f(x) = \frac{x^2 - 1}{x^2 + 1}$
- b) $f(x) = x + \frac{1}{x}$
- c) $f(x) = x \ln x$ en $(0, +\infty)$
- d) $f(x) = e^x - x$
- e) $f(x) = \frac{x^2 + 2x + 4}{x + 2}$
- f) $f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x$
- g) $y = f(x) = x^4 + x + 1$

Problema 6.67. Traza la gráfica de una función que cumpla con todas las siguientes condiciones simultáneamente:

- f es par.
- $f(0) = 1$.
- $f(x) > 0$ para $x \in (1, 2) \cup (3, 5)$.
- $f(x) < 0$ para $x \in (2, 3) \cup (5, +\infty)$.
- $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 2$.

Problema 6.68. La gráfica a continuación es la de la derivada f' de una cierta función f . A partir de ella determine los intervalos de crecimiento y decrecimiento de f , sus extremos locales, sus intervalos de concavidad y realice un bosquejo de f .



6.8.3

Optimización

Problema 6.69. Encuentre las dimensiones del rectángulo de área máxima que puede inscribirse en un círculo de radio r .

Problema 6.70. Una lata cilíndrica con tapa debe contener 500 cm^3 . Encuentre las dimensiones que minimizan el área total de material.

Problema 6.71. Un terreno rectangular debe cercarse con 200 m de malla. Un lado del rectángulo es un muro existente el cual no necesita cerca. ¿Qué dimensiones maximizan el área del terreno?

Problema 6.72. Un rectángulo está inscrito bajo la parábola $y = 8 - x^2$ con su base sobre el eje x . Encuentre las dimensiones del rectángulo de área máxima.

Problema 6.73. Sea $\ell > 0$ una constante dada. Se quiere diseñar un canal de sección transversal trapezoidal isósceles en el que el fondo y los dos taludes se recubren con material impermeable, quedando la superficie superior abierta al terreno. La longitud total revestida por metro lineal de canal es fija:

$$b + 2s = \ell, \quad b > 0, \quad s > 0,$$


donde b es el ancho del fondo y s la longitud de cada talud inclinado. El ángulo de inclinación de los taludes respecto a la horizontal es $\theta \in (0, \frac{\pi}{2})$.

La profundidad del canal es $h = s \sin \theta$, y el área de la sección transversal mojada es

$$A = (b + s \cos \theta) s \sin \theta.$$

Como el caudal es proporcional a A , maximizar el caudal equivale a maximizar A . Se pide resolver los siguientes ítem:

- 1. Usando la restricción $b = \ell - 2s$, exprese A únicamente en función de s y θ .
- 2. Determine los valores óptimos b^* , s^* y θ^* en términos de ℓ .
- 3. Interprete geoméricamente la configuración óptima.



Problema 6.74. El costo de construir la pared frontal de un edificio es el triple del costo de las demás paredes. El edificio debe tener volumen $V_0\text{ m}^3$ y planta rectangular. Encuentre la relación entre largo y ancho de la base que minimiza el costo total.

Problema 6.75. Se desea construir una pecera sin tapa, con base cuadrada y paredes verticales, de capacidad 2000 m^3 . La base es de concreto y las paredes de vidrio. El costo por m^2 del vidrio es el doble del del concreto. ¿Cuál debe ser la altura de la pecera para que el costo total sea mínimo?


Problema 6.76. En una hoja rectangular se deben dejar márgenes laterales de 2 pulgadas y márgenes superior e inferior de 1 pulgada. El área impresa es de 32 pulg^2 . Encuentre las dimensiones de la hoja que minimicen el área total del papel.

Problema 6.77. El equipo Alianza Petrolera juega en un estadio con capacidad de 12 000 espectadores. Con entrada a \$20 000 la asistencia promedio es de 4 000. Un estudio estima que si el precio baja \$2 000, la asistencia sube 1 000 espectadores. ¿Qué precio de entrada y cuántos espectadores maximizan los ingresos por boletería?

Problema 6.78. Se proyecta construir un jardín en forma de sector circular de radio r y ángulo central θ . El área del jardín ha de ser $10\,000\text{ m}^2$. Encuentre los valores de r y θ que minimizan el perímetro del jardín.

Problema 6.79. Un hombre debe escapar desde el punto A , ubicado en la costa de una isla, hasta el punto B en una isla vecina, donde un helicóptero lo espera hasta máximo 4 horas. La distancia de A a B es de 13 km y el punto B se encuentra a 5 km de la costa de manera perpendicular. El hombre puede trotar a 5 km/h a lo largo de la costa y nadar a 3 km/h. Planea trotar desde A hasta un punto C en la costa y luego nadar en línea recta desde C hasta B .

- (a) ¿A qué distancia de A debe ubicarse el punto C para minimizar el tiempo total de viaje?
- (b) ¿Llegará al helicóptero antes de que deba partir?




Problema 6.80. Ana asiste a una sala de cine cuya pantalla se modela como un segmento vertical de 2 m de altura, ubicado sobre el eje y entre los puntos $A(0, 1)$ y $B(0, 3)$ (todas las distancias están dadas en metros). Las butacas están distribuidas sobre la recta $y = x$ con $x > 0$. Ana desea ocupar un lugar sobre dicha recta que maximice su ángulo de visión θ de la pantalla.

1. Expresa θ en función de la coordenada x de la posición de Ana.
2. Determine el punto exacto (x, x) donde debe sentarse para maximizar θ .
3. Calcule la distancia horizontal desde la pantalla hasta dicho punto óptimo.

Sugerencia: Use la identidad trigonométrica


$$\tan(\alpha + \theta) = \frac{\tan \alpha + \tan \theta}{1 - \tan \alpha \tan \theta}$$

aplicada a los ángulos que forman las líneas de visión con la horizontal.



Problema 6.81 (Optimización de la longitud del cable). Dos astas de bandera se encuentran instaladas verticalmente sobre un terreno plano. La distancia entre las bases de las astas es de 3 metros. Se desea sujetar ambas astas con un cable que parte de la parte superior de cada asta y se ancla en un único punto sobre el suelo situado entre ambas.

Se conoce que la altura de la primera asta es de 2 metros y la altura de la segunda es de 1 metro. Determine la distancia x desde la base de la asta más alta hasta el punto de anclaje en el suelo, de modo que la longitud total del cable $(d_1 + d_2)$ sea mínima.



6.8.4

Teorema del Valor Medio

- Problema 6.82.** Verifique el TVM para $f(x) = \sqrt{x}$ en $[1, 4]$ y encuentre el valor de c garantizado por el teorema.
- Problema 6.83.** Use el TVM para demostrar que $|\sin a - \sin b| \leq |a - b|$ para todo $a, b \in \mathbb{R}$.
- Problema 6.84.** Demuestre que la ecuación $x^5 + 10x + 3 = 0$ tiene exactamente una raíz real. *Sugerencia:* use el TVI para existencia y el TVM para unicidad.
- Problema 6.85.** Un automóvil sale de un semáforo en rojo y, 60 s después, pasa frente a un radar que registra 80 km/h. Demuestre que en algún momento entre los 0 y 60 s su aceleración fue positiva.
- Problema 6.86.** Sea $f(x) = \alpha x^2 + \beta x + \gamma$ con $\alpha \neq 0$. Demuestre que el número c garantizado por el Teorema del Valor Medio en cualquier intervalo $[a, b]$ es siempre el punto medio $\frac{a + b}{2}$.
- Problema 6.87.** La función $f(x) = x^2 - 1$ no satisface las hipótesis del TVM en $[-1, 8]$; sin embargo, ¿es posible encontrar $c \in (-1, 8)$ tal que $f'(c) = 10$?
- Problema 6.88.** Usando trigonometría, ¿por qué para $x \neq \pi/2$ es posible encontrar $c \in (-1, 8)$ tal que $\cos c = 1$? ¿Contradice esto el TVM?

6.8.5

Regla de L'Hôpital

Problema 6.89. Calcule cada límite:

1. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \sin x}{x^3}$

2. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln x}{x^p}, p > 0$

3. $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^p \ln x, p > 0$

4. $\lim_{x \rightarrow \infty} x^{1/x}$

5. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - e^{-x} - 2x}{x - \sin x}$
6. $\lim_{x \rightarrow 0} (\csc x - \cot x)$

7. $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{x^2} - \cot^2 x \right)$

8. $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^x - x}{1 - x + \ln x}$

9. $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\sqrt{x^2 + x} - x \right)$

10. $\lim_{x \rightarrow 0^+} (\tan x)^{\sin x}$

Problema 6.90. Observe que en el límite

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{12 - x^2} - \sqrt{12}}{x^2}$$

el numerador y el denominador se anulan en $x = 0$. ¿Cuál de las condiciones de la regla de L'Hôpital no se satisface? Determine el valor del límite y justifique.

Problema 6.91. Deduzca si cada afirmación es verdadera o falsa y justifique:

- a) Si $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)}$ es de la forma $\frac{0}{0}$, entonces $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)}$.
- b) Si $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = 2$ y $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = 0$, puede aplicarse L'Hôpital a $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)}$.
- c) Si L'Hôpital se aplica y el nuevo límite no existe, entonces el límite original tampoco existe.

Problema 6.92. Demuestre que $\lim_{x \rightarrow \infty} (1 + x)^{1/x} = 1$ usando diferenciación logarítmica para analizar el comportamiento de $\ln y$. Compare con el límite $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = e$.

6.8.6

Métodos numéricos para la localización de raíces

Problema 6.93. Use la bisección para aproximar la raíz de $f(x) = x^3 + x - 1$ en $[0, 1]$ con un error menor que 0,01. Construya una tabla de iteraciones.

Problema 6.94. Aplique el método de Newton-Raphson a $f(x) = \cos x - x$ con $x_0 = 1$ hasta obtener 5 cifras decimales correctas. Verifique la convergencia cuadrática comparando los errores en cada iteración.

Problema 6.95. La ecuación $x = \cos x$ puede reescribirse como punto fijo de dos maneras distintas: $g_1(x) = \cos x$ y $g_2(x) = \arccos x$. Para cada una, analice si la condición $|g'| < 1$ se cumple cerca de la raíz $c \approx 0,739$ y prediga cuál convergerá.

Problema 6.96. Demuestre que la iteración de Newton-Raphson aplicada a $f(x) = x^2 - a$ (con $a > 0$) produce la sucesión

$$x_{n+1} = \frac{1}{2} \left(x_n + \frac{a}{x_n} \right),$$

conocida como **algoritmo babilónico** de la raíz cuadrada. Verifique que converge cuadráticamente.

Capítulo

7

Integrales indefinidas y técnicas de integración

Múltiples operaciones matemáticas vienen en pares de inversas: la suma y la resta, la multiplicación y la división, la potenciación y la radicación. Para el caso de la derivada, su operación inversa es la **antiderivada** o **integral indefinida**. Así como la derivada responde a la pregunta «¿cómo cambia esta función?», la integral indefinida responde a la pregunta «¿qué función tiene esta derivada?». La definimos a continuación:

Definición 7.1. Se dice que F es una **antiderivada** de f en un intervalo I si $D_x F(x) = f(x)$ para todo $x \in I$, es decir, $F'(x) = f(x)$ para toda x en I .

Generalmente, la antiderivada tiene un símbolo especial que obtendrá sentido completo para nosotros en el próximo capítulo:

$$\int f(x) \, dx,$$

notación introducida por Leibniz en la que $\int$ es una S estilizada que alude a una *suma*, $f(x)$ recibe el nombre de **integrand** y dx indica la variable de integración.

Antes de cualquier cálculo de antiderivadas, recordemos un resultado importante sobre derivación:

Corolario 7.2. Si $F'(x) = G'(x)$ para todo $x \in (a, b)$, entonces

$$F(x) = G(x) + C$$

para alguna constante C .

Esto implica que no existe una única antiderivada: en realidad existen infinitas, pues para cada valor de C la función $F(x) + C$ sigue siendo antiderivada de f . Por esta razón, al calcular integrales indefinidas siempre se añade $+C$ —la llamada **constante de integración**— al resultado.

Al ser operaciones inversas, es natural pensar que si $D_x(\sin x) = \cos x$ entonces $\int \cos x \, dx = \sin x + C$.

Esto nos proporciona, en general, una lista básica de antiderivadas que se obtiene simplemente «leyendo al revés» la tabla de derivadas:

Además, la integral indefinida es un operador lineal, por lo cual cumple las siguientes propiedades:

Teorema 7.3 (Linealidad de la integral indefinida). Suponga que f y g tienen antiderivadas (integrales indefinidas) y sea k una constante. Entonces:

$$(I) \int k f(x) \, dx = k \int f(x) \, dx;$$

$$(II) \int [f(x) + g(x)] \, dx = \int f(x) \, dx + \int g(x) \, dx;$$

$$(III) \int [f(x) - g(x)] \, dx = \int f(x) \, dx - \int g(x) \, dx.$$

Función $f(x)$	Antiderivada $\int f(x) \, dx$
k (k constante)	$kx + C$
x^r ($r \neq -1$)	$\frac{x^{r+1}}{r+1} + C$
$\frac{1}{x}$	$\ln x + C$
e^x	$e^x + C$
a^x ($a > 0, a \neq 1$)	$\frac{a^x}{\ln a} + C$
$\text{sen } x$	$-\cos x + C$
$\cos x$	$\text{sen } x + C$
$\sec^2 x$	$\tan x + C$
$\csc^2 x$	$-\cot x + C$
$\sec x \tan x$	$\sec x + C$
$\csc x \cot x$	$-\csc x + C$
$\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$	$\text{arc sen } x + C$
$\frac{1}{1+x^2}$	$\text{arctan } x + C$
$\frac{1}{x\sqrt{x^2-1}}$	$\text{arcsec } x + C$

Cuadro 7.1: Integrales indefinidas básicas.

Solución: Sean F y G antiderivadas de f y g respectivamente, es decir, $F'(x) = f(x)$ y $G'(x) = g(x)$.

(i) Calculamos la derivada de $kF(x)$:

$$D_x[kF(x)] = kF'(x) = k f(x).$$

Por definición de antiderivada, $kF(x)$ es antiderivada de $k f(x)$, luego $\int k f(x) \, dx = kF(x) + C = k \int f(x) \, dx$.

(ii) Calculamos la derivada de $F(x) + G(x)$:

$$D_x[F(x) + G(x)] = F'(x) + G'(x) = f(x) + g(x).$$

Entonces $F(x) + G(x)$ es antiderivada de $f(x) + g(x)$, es decir,

$$\int [f(x) + g(x)] \, dx = F(x) + G(x) + C = \int f(x) \, dx + \int g(x) \, dx.$$

(iii) Análogamente, como

$$D_x[F(x) - G(x)] = F'(x) - G'(x) = f(x) - g(x),$$

se concluye que

$$\int [f(x) - g(x)] \, dx = F(x) - G(x) + C = \int f(x) \, dx - \int g(x) \, dx.$$

Teorema 7.4 (Regla generalizada de la potencia). *Sean g una función derivable y r un número racional con $r \neq -1$. Entonces*

$$\int [g(x)]^r g'(x) \, dx = \frac{[g(x)]^{r+1}}{r+1} + C.$$

Solución: Basta verificar que la derivada del lado derecho coincide con el integrando. Aplicando la regla de la cadena:

$$D_x \left[\frac{[g(x)]^{r+1}}{r+1} + C \right] = \frac{1}{r+1} \cdot (r+1) [g(x)]^r \cdot g'(x) = [g(x)]^r g'(x).$$

El Segundo Teorema Fundamental del Cálculo, el cual estudiaremos en el próximo capítulo, convierte el problema de calcular una integral definida en el problema de encontrar una antiderivada. Sin embargo, mientras que la diferenciación es un proceso completamente algorítmico —pues la regla de la cadena, del producto y del cociente bastan para diferenciar cualquier función elemental—, la integración carece de un algoritmo universal. Existen funciones perfectamente continuas, como e^{-x^2} o $\frac{\text{sen } x}{x}$, cuya antiderivada no puede expresarse en términos de funciones elementales. Esta asimetría profunda entre derivación e integración motivó el desarrollo histórico de un repertorio de **técnicas de transformación** que permiten reducir integrales complicadas a formas conocidas.

En este capítulo se estudian cinco técnicas fundamentales: la **sustitución simple**, contraparte de la regla de la cadena; la **integración por partes**, contraparte de la regla del producto; la **integración de potencias trigonométricas**, basada en las identidades pitagóricas; la **sustitución trigonométrica**, para eliminar radicales mediante geometría del triángulo; y la **descomposición en fracciones parciales**, herramienta algebraica para integrar funciones racionales. Dominar estas técnicas requiere práctica sistemática: el reconocimiento de la forma adecuada en cada situación se desarrolla con la experiencia.

Observación 7.5. *El matemático francés Joseph Liouville (1809–1882) desarrolló la teoría que determina con precisión cuándo una función elemental tiene antiderivada elemental. El resultado central —teorema de Liouville, formalizado algorítmicamente por Risch en 1969— establece que la integrabilidad en términos de funciones elementales es la excepción, no la regla. Este hecho justifica tanto la importancia de las técnicas algebraicas de este capítulo como la de los métodos numéricos de integración que se abordan más adelante.*

7.1

Sustitución Simple

7.1.1

Fundamento teórico

La regla de sustitución es la contraparte de la regla de la cadena. Si F es antiderivada de f , entonces

$$\frac{d}{dx} [F(g(x))] = F'(g(x)) \cdot g'(x) = f(g(x)) \cdot g'(x).$$

Integrando ambos lados se obtiene la identidad fundamental de la técnica:

Teorema 7.6 (Regla de sustitución — integral indefinida). Si $u = g(x)$ es diferenciable en su dominio y f es continua en el rango de g , entonces

$$\int f(g(x)) g'(x) dx = \int f(u) du.$$

La sustitución opera formalmente como si $du = g'(x) dx$ fuera un cambio de variable literal: se reemplaza $g(x)$ por u y el diferencial $g'(x) dx$ por du , transformando la integral original en una nueva integral en u .

Construcción 7.7. El procedimiento sistemático es:

1. Identificar una subexpresión $u = g(x)$ cuya derivada $g'(x)$ aparezca (o pueda aislarse) en el integrando.
2. Calcular $du = g'(x) dx$ y despejar dx si es necesario.
3. Reescribir la integral *completamente* en términos de u y du .
4. Evaluar la integral resultante en u .
5. Sustituir $u = g(x)$ para regresar a la variable original.

Observación 7.8. La elección de u es el paso más crítico y no tiene una regla infalible. Como orientación general: probar con la expresión bajo un radical, el exponente de una función exponencial, el argumento de una función trigonométrica, o la expresión elevada a una potencia. Si la primera elección no simplifica la integral, se debe intentar otra.

7.1.2

Sustitución en integrales definidas

Teorema 7.9 (Regla de sustitución — integral definida). Si g' es continua en $[a, b]$ y f es continua en el rango de g , entonces

$$\int_a^b f(g(x)) g'(x) dx = \int_{g(a)}^{g(b)} f(u) du.$$

Al transformar los límites de integración junto con la variable, se evita la necesidad de regresar a la variable original. Este enfoque es generalmente más eficiente para integrales definidas.

7.1.3

Ejemplos

Ejemplo 7.10. Calcular $\int \sin^5 x \cos x dx$.

Solución: Observamos que $\cos x$ es la derivada de $\sin x$. Tomamos $u = \sin x$, $du = \cos x dx$:

$$\int \sin^5 x \cos x dx = \int u^5 du = \frac{u^6}{6} + C = \frac{\sin^6 x}{6} + C. \quad \square$$

Ejemplo 7.11. Calcular $\int \frac{dx}{x \ln x}$.

Solución: Como $\frac{1}{x}$ es la derivada de $\ln x$, tomamos $u = \ln x$, $du = \frac{dx}{x}$:

$$\int \frac{dx}{x \ln x} = \int \frac{du}{u} = \ln |u| + C = \ln |\ln x| + C. \quad \square$$

Ejemplo 7.12. Calcular $\int \sqrt{2x+1} \, dx$.

Solución: Sea $u = 2x + 1$, $du = 2 \, dx$:

$$\int \sqrt{2x+1} \, dx = \frac{1}{2} \int u^{1/2} \, du = \frac{1}{2} \cdot \frac{u^{3/2}}{3/2} + C = \frac{1}{3}(2x+1)^{3/2} + C. \quad \square$$

Ejemplo 7.13. Calcular $\int \tan x \, dx$.

Solución: Escribimos $\tan x = \frac{\sin x}{\cos x}$ y tomamos $u = \cos x$, $du = -\sin x \, dx$:

$$\int \tan x \, dx = - \int \frac{du}{u} = -\ln |u| + C = \ln |\sec x| + C. \quad \square$$

Ejemplo 7.14. Calcular $\int_0^4 \frac{x}{\sqrt{x^2+9}} \, dx$.

Solución: Sea $u = x^2 + 9$, $du = 2x \, dx$. Límites: $x = 0 \Rightarrow u = 9$; $x = 4 \Rightarrow u = 25$:

$$\int_0^4 \frac{x}{\sqrt{x^2+9}} \, dx = \frac{1}{2} \int_9^{25} u^{-1/2} \, du = \left[\sqrt{u} \right]_9^{25} = \sqrt{25} - \sqrt{9} = 2. \quad \square$$

7.2

Integración por Partes

7.2.1

Fundamento teórico

La integración por partes es la contraparte de la regla del producto. De $\frac{d}{dx}[uv] = u v' + v u'$, integrando y despejando:

Teorema 7.15 (Fórmula de integración por partes). Si u y v son funciones con derivadas continuas:

$$\int u \, dv = u v - \int v \, du.$$

Para integrales definidas:

$$\int_a^b u \, dv = \left[u v \right]_a^b - \int_a^b v \, du.$$

La técnica transforma $\int u \, dv$ en $\int v \, du$. Para que sea útil, la segunda integral debe ser más simple que la primera. La elección de u y dv es la clave del método.

7.2.2

La regla LIATE

Una guía práctica para elegir u es el acrónimo **LIATE**:

Logarítmicas $\rightarrow$ Inversas trigonométricas $\rightarrow$ Algebraicas $\rightarrow$ Trigonométricas $\rightarrow$ Exponenciales

Se elige u según la función que aparezca más a la izquierda, y dv como el resto del integrando. Las funciones logarítmicas e inversas trigonométricas tienen derivadas más simples que ellas mismas (simplifican $\int v \, du$), mientras que las exponenciales conservan su forma al integrarse (conveniente para dv).

Observación 7.16. La regla LIATE es una guía, no una ley. Existen tres patrones que la trascienden: (1) la **aplicación repetida**, cuando el integrando es un polinomio multiplicado por una exponencial o trigonométrica (como $\int x^2 e^x \, dx$ o $\int x^2 \sin x \, dx$); (2) el truco de escribir $f(x) = f(x) \cdot 1$ para integrar sola una función como $\ln x$ o $\arcsin x$; y (3) la **integral cíclica**, cuando el integrando del tipo $e^{ax} \sin(bx)$ reaparece en el lado derecho, permitiendo resolver algebraicamente.

7.2.3

Ejemplos

Ejemplo 7.17. Calcular $\int x e^x \, dx$.

Solución: Por LIATE: $u = x$, $dv = e^x \, dx$; $du = dx$, $v = e^x$:

$$\int x e^x \, dx = x e^x - \int e^x \, dx = e^x(x - 1) + C. \quad \square$$

Ejemplo 7.18. Calcular $\int \ln x \, dx$.

Solución: Escribimos $\ln x = \ln x \cdot 1$; tomamos $u = \ln x$, $dv = dx$; $du = \frac{dx}{x}$, $v = x$:

$$\int \ln x \, dx = x \ln x - \int x \cdot \frac{1}{x} \, dx = x \ln x - x + C. \quad \square$$

Ejemplo 7.19. Calcular $\int \arcsin x \, dx$.

Solución: $u = \arcsin x$, $dv = dx$; $du = \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}}$, $v = x$:

$$\int \arcsin x \, dx = x \arcsin x - \int \frac{x}{\sqrt{1-x^2}} \, dx.$$

La integral residual se resuelve con $w = 1 - x^2$, $dw = -2x \, dx$:

$$-\frac{1}{2} \int w^{-1/2} dw = -\sqrt{w} + C = -\sqrt{1 - x^2} + C.$$

Por tanto:

$$\int \arcsin x \, dx = x \arcsin x + \sqrt{1 - x^2} + C. \quad \square$$

Ejemplo 7.20. Calcular $\int x^2 \sin x \, dx$.

Solución: Se aplican dos rondas de integración por partes.
Primera ronda: $u = x^2$, $dv = \sin x \, dx$; $du = 2x \, dx$, $v = -\cos x$:

$$\int x^2 \sin x \, dx = -x^2 \cos x + 2 \int x \cos x \, dx.$$

Segunda ronda sobre $\int x \cos x \, dx$: $u = x$, $dv = \cos x \, dx$; $du = dx$, $v = \sin x$:

$$\int x \cos x \, dx = x \sin x - \int \sin x \, dx = x \sin x + \cos x + C.$$

Combinando:

$$\int x^2 \sin x \, dx = -x^2 \cos x + 2x \sin x + 2 \cos x + C. \quad \square$$

Ejemplo 7.21. Calcular $\int x^3 e^{2x} \, dx$ usando integración por partes tabular.

Solución: Cuando el integrando es un polinomio multiplicado por una función que se integra conservando su forma (exponencial, seno, coseno), la **integración por partes tabular** organiza las rondas sucesivas en una tabla, evitando la repetición algebraica. Se construyen dos columnas: la de **derivadas sucesivas** del factor polinómico (hasta anularse) y la de **antiderivadas sucesivas** del factor trascendente. Los signos alternan $+$, $-$, $+$, $-$, $\dots$

Signo	Derivadas	Antiderivadas
+	x^3	e^{2x}
-	$3x^2$	$\frac{1}{2}e^{2x}$
+	$6x$	$\frac{1}{4}e^{2x}$
-	6	$\frac{1}{8}e^{2x}$
+	0	$\frac{1}{16}e^{2x}$

El resultado es la suma de los productos diagonales (elemento de la columna de derivadas por el elemento inmediatamente abajo en la columna de antiderivadas), con los signos indicados:

$$\int x^3 e^{2x} \, dx = x^3 \cdot \frac{e^{2x}}{2} - 3x^2 \cdot \frac{e^{2x}}{4} + 6x \cdot \frac{e^{2x}}{8} - 6 \cdot \frac{e^{2x}}{16} + C = e^{2x} \left(\frac{x^3}{2} - \frac{3x^2}{4} + \frac{3x}{4} - \frac{3}{8} \right) + C. \quad \square$$

Ejemplo 7.22. Calcular $\int e^x \sin x \, dx$.

Solución: $u = \sin x$, $dv = e^x dx$; $du = \cos x dx$, $v = e^x$:

$$\int e^x \sin x dx = e^x \sin x - \int e^x \cos x dx.$$

Sobre $\int e^x \cos x dx$: $u = \cos x$, $dv = e^x dx$; $du = -\sin x dx$, $v = e^x$:

$$\int e^x \cos x dx = e^x \cos x + \int e^x \sin x dx.$$

Sustituyendo en la primera ecuación:

$$\int e^x \sin x dx = e^x \sin x - e^x \cos x - \int e^x \sin x dx.$$

La integral original reaparece. Sumando $\int e^x \sin x dx$ a ambos lados:

$$2 \int e^x \sin x dx = e^x (\sin x - \cos x) + C \implies \int e^x \sin x dx = \frac{e^x (\sin x - \cos x)}{2} + C. \quad \square$$

Para notar!!! 7.23. El ejemplo anterior ilustra la **integral cíclica**: al aplicar integración por partes dos veces a un producto del tipo $e^{ax} \cdot \text{trig}(bx)$, la integral original reaparece y puede despejarse algebraicamente. Este patrón se presenta invariablemente para $\int e^{ax} \sin(bx) dx$ e $\int e^{ax} \cos(bx) dx$, cuyo resultado general es

$$\int e^{ax} \sin(bx) dx = \frac{e^{ax}(a \sin bx - b \cos bx)}{a^2 + b^2} + C, \quad \int e^{ax} \cos(bx) dx = \frac{e^{ax}(a \cos bx + b \sin bx)}{a^2 + b^2} + C.$$

7.3

Identidades Trigonométricas Esenciales

Antes de abordar las siguientes técnicas conviene consolidar el catálogo de identidades que las sustentan. Estas identidades son consecuencias del teorema de Pitágoras y de las definiciones de las funciones trigonométricas sobre el círculo unitario; no deben memorizarse como fórmulas aisladas, sino comprenderse como relaciones geométricas.

Teorema 7.24 (Identidades pitagóricas). Para todo $x \in \mathbb{R}$ donde las funciones estén definidas:

$$\sin^2 x + \cos^2 x = 1, \quad 1 + \tan^2 x = \sec^2 x, \quad \cot^2 x + 1 = \csc^2 x.$$

Teorema 7.25 (Identidades de reducción de potencia y ángulo doble).

$$\sin^2 x = \frac{1 - \cos 2x}{2}, \quad \cos^2 x = \frac{1 + \cos 2x}{2}, \quad \sin x \cos x = \frac{\sin 2x}{2}.$$

Teorema 7.26 (Fórmulas de producto a suma).

$$\begin{aligned} \sin A \cos B &= \frac{1}{2}[\sin(A + B) + \sin(A - B)], \\ \sin A \sin B &= \frac{1}{2}[\cos(A - B) - \cos(A + B)], \\ \cos A \cos B &= \frac{1}{2}[\cos(A - B) + \cos(A + B)]. \end{aligned}$$

Observación 7.27. Las identidades de reducción de potencia $\sin^2 x = \frac{1 - \cos 2x}{2}$ y $\cos^2 x = \frac{1 + \cos 2x}{2}$ son las herramientas más frecuentes en la integración de potencias pares. Su uso iterativo permite reducir cualquier potencia entera de $\sin x$ o $\cos x$ a una combinación lineal de funciones de ángulos múltiples, que se integran directamente.

7.4

Integración de Potencias Trigonómicas

7.4.1

Integrales de la forma $\int \sin^m x \cos^n x \, dx$

La estrategia depende de la paridad de los exponentes. La idea central es aislar un diferencial natural para sustitución algebraica y convertir el resto del integrando a la nueva variable.

Construcción 7.28. Caso 1: m impar. Separar $\sin^m x = \sin^{m-1} x \cdot \sin x$, reservar $\sin x \, dx$ para la sustitución $u = \cos x$ ($du = -\sin x \, dx$), y convertir $\sin^{m-1} x$ a cosenos con $\sin^2 x = 1 - \cos^2 x$.

Caso 2: n impar. Separar $\cos^n x = \cos^{n-1} x \cdot \cos x$, reservar $\cos x \, dx$ para $u = \sin x$ ($du = \cos x \, dx$), y convertir $\cos^{n-1} x$ a senos con $\cos^2 x = 1 - \sin^2 x$.

Caso 3: m y n ambos pares. No hay sustitución algebraica directa. Aplicar las identidades de reducción de potencia para disminuir los exponentes hasta obtener integrales de ángulos múltiples.

Ejemplo 7.29. Calcular $\int \sin^3 x \cos^2 x \, dx$.

Solución: El exponente de $\sin x$ es impar ($m = 3$): aplicamos el Caso 1.

$$\int \sin^3 x \cos^2 x \, dx = \int \sin^2 x \cos^2 x \cdot \sin x \, dx.$$

Sea $u = \cos x$, $du = -\sin x \, dx$; reemplazamos $\sin^2 x = 1 - u^2$:

$$= - \int (1 - u^2)u^2 \, du = - \int (u^2 - u^4) \, du = -\frac{u^3}{3} + \frac{u^5}{5} + C = -\frac{\cos^3 x}{3} + \frac{\cos^5 x}{5} + C. \quad \square$$

Ejemplo 7.30. Calcular $\int \sin^2 x \cos^2 x \, dx$.

Solución: Ambos exponentes son pares: Caso 3. Usamos $\sin x \cos x = \frac{\sin 2x}{2}$:

$$\sin^2 x \cos^2 x = \frac{\sin^2 2x}{4} = \frac{1 - \cos 4x}{8}.$$

$$\int \sin^2 x \cos^2 x \, dx = \frac{x}{8} - \frac{\sin 4x}{32} + C. \quad \square$$

Teorema 7.31 (Fórmulas de reducción). Para $n \geq 2$ entero:

$$\int \sin^n x \, dx = -\frac{\sin^{n-1} x \cos x}{n} + \frac{n-1}{n} \int \sin^{n-2} x \, dx,$$
$$\int \cos^n x \, dx = \frac{\cos^{n-1} x \sin x}{n} + \frac{n-1}{n} \int \cos^{n-2} x \, dx.$$

Observación 7.32. Las fórmulas de reducción se demuestran por integración por partes. Permiten bajar el exponente dos unidades en cada aplicación hasta llegar a $\int \sin x \, dx$ o $\int \cos x \, dx$ (si n es impar), o a $\int dx$ (si n es par). Son especialmente útiles para potencias altas y para establecer identidades recursivas.

7.4.2

Integrales de la forma $\int \tan^m x \sec^n x \, dx$

El tratamiento es análogo al caso anterior, utilizando la identidad $1 + \tan^2 x = \sec^2 x$ y las derivadas $(\sec x)' = \sec x \tan x$, $(\tan x)' = \sec^2 x$.

Construcción 7.33. Caso 1: n par. Reservar $\sec^2 x \, dx$ para $u = \tan x$ ($du = \sec^2 x \, dx$); convertir $\sec^{n-2} x$ a tangentes con $\sec^2 x = 1 + \tan^2 x$.

Caso 2: m impar. Reservar $\sec x \tan x \, dx$ para $u = \sec x$ ($du = \sec x \tan x \, dx$); convertir $\tan^{m-1} x$ a secantes con $\tan^2 x = \sec^2 x - 1$.

Caso 3: m par, n impar. Convertir todo a secantes y usar fórmulas de reducción o integración por partes.

Ejemplo 7.34. Calcular $\int \tan^3 x \sec^4 x \, dx$.

Solución: $n = 4$ es par: Caso 1. Reservamos $\sec^2 x \, dx$ y escribimos $\sec^2 x = 1 + \tan^2 x$:

$$\int \tan^3 x (1 + \tan^2 x) \sec^2 x \, dx.$$

Sea $u = \tan x$, $du = \sec^2 x \, dx$:

$$= \int u^3 (1 + u^2) \, du = \frac{u^4}{4} + \frac{u^6}{6} + C = \frac{\tan^4 x}{4} + \frac{\tan^6 x}{6} + C. \quad \square$$

Ejemplo 7.35. Calcular $\int \sec^3 x \, dx$.

Solución: Este es el caso arquetípico del Caso 3 con $m = 0$, $n = 3$ (impar). Escribimos $\sec^3 x = \sec x \cdot \sec^2 x$ e integramos por partes: $u = \sec x$, $dv = \sec^2 x \, dx$; $du = \sec x \tan x \, dx$, $v = \tan x$:

$$\int \sec^3 x \, dx = \sec x \tan x - \int \sec x \tan^2 x \, dx.$$

Usamos $\tan^2 x = \sec^2 x - 1$:

$$= \sec x \tan x - \int \sec^3 x \, dx + \int \sec x \, dx.$$

La integral original reaparece. Sumándola a ambos lados y usando $\int \sec x \, dx = \ln |\sec x + \tan x|$:

$$2 \int \sec^3 x \, dx = \sec x \tan x + \ln |\sec x + \tan x| + C,$$

$$\int \sec^3 x \, dx = \frac{\sec x \tan x + \ln |\sec x + \tan x|}{2} + C. \quad \square$$

Observación 7.36. El resultado $\int \sec^3 x \, dx$ es un estándar del Cálculo que reaparece frecuentemente como subproblema —por ejemplo, en el cálculo de la longitud de arco de la parábola y en la integración de $\int \sec^5 x \, dx$ mediante la fórmula de reducción para secantes.

7.4.3

Integrales de productos $\sin(mx) \cos(nx)$, $\sin(mx) \sin(nx)$, $\cos(mx) \cos(nx)$

Cuando el integrando es un producto de trigonométricas con distintos ángulos, se utilizan las fórmulas de producto a suma para convertirlo en una suma de funciones simples integrable término a término.

Ejemplo 7.37. Calcular $\int \sin(3x) \cos(5x) \, dx$.

Solución: Aplicamos $\sin A \cos B = \frac{1}{2}[\sin(A + B) + \sin(A - B)]$ con $A = 3x$, $B = 5x$:

$$\sin(3x) \cos(5x) = \frac{1}{2}[\sin 8x + \sin(-2x)] = \frac{1}{2}[\sin 8x - \sin 2x].$$

$$\int \sin(3x) \cos(5x) \, dx = \frac{1}{2} \left(-\frac{\cos 8x}{8} + \frac{\cos 2x}{2} \right) + C = -\frac{\cos 8x}{16} + \frac{\cos 2x}{4} + C. \quad \square$$

7.5

Sustitución Trigonométrica

7.5.1

Idea geométrica y fundamento

La sustitución trigonométrica permite eliminar radicales del integrando mediante la introducción de un ángulo θ como nueva variable. El fundamento es geométrico: si se identifica la expresión bajo el radical con un lado de un triángulo rectángulo, las identidades pitagóricas simplifican el radical a una función trigonométrica sin raíz.

La técnica opera en tres fases: (1) elegir la sustitución apropiada según la forma del radical; (2) transformar el integrando y el diferencial completo a la variable θ ; (3) evaluar la integral trigonométrica


resultante y utilizar el **triángulo de referencia** para regresar a x .

Observación 7.38. En integrales definidas es más eficiente transformar los límites al hacer la sustitución y no regresar a x . En integrales indefinidas, el triángulo de referencia es indispensable para expresar θ y todas las funciones trigonométricas en términos de x .

7.5.2

Caso 1: Radical $\sqrt{a^2 - u^2}$

Sustitución: $u = a \sin \theta$, $\theta \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$; $du = a \cos \theta d\theta$; $\sqrt{a^2 - u^2} = a \cos \theta$.



Ejemplo 7.39. Calcular $\int \frac{dx}{\sqrt{9 - x^2}}$.

Solución: Con $a = 3$: $x = 3 \sin \theta$, $dx = 3 \cos \theta d\theta$, $\sqrt{9 - x^2} = 3 \cos \theta$:

$$\int \frac{3 \cos \theta d\theta}{3 \cos \theta} = \int d\theta = \theta + C = \arcsin\left(\frac{x}{3}\right) + C. \quad \square$$

Ejemplo 7.40. Calcular $\int x^2 \sqrt{4 - x^2} dx$.

Solución: Con $a = 2$: $x = 2 \sin \theta$, $dx = 2 \cos \theta d\theta$, $\sqrt{4 - x^2} = 2 \cos \theta$, $x^2 = 4 \sin^2 \theta$:

$$\int 4 \sin^2 \theta \cdot 2 \cos \theta \cdot 2 \cos \theta d\theta = 16 \int \sin^2 \theta \cos^2 \theta d\theta = 16 \int \frac{\sin^2 2\theta}{4} d\theta = 4 \int \frac{1 - \cos 4\theta}{2} d\theta = 2\theta - \frac{\sin 4\theta}{2} + C.$$


Del triángulo: $\theta = \arcsin\left(\frac{x}{2}\right)$, $\sin \theta = \frac{x}{2}$, $\cos \theta = \frac{\sqrt{4 - x^2}}{2}$. Usando $\sin 4\theta = 4 \sin \theta \cos \theta (1 - 2 \sin^2 \theta)$:

$$\int x^2 \sqrt{4 - x^2} dx = 2 \arcsin\left(\frac{x}{2}\right) - \frac{x \sqrt{4 - x^2} (4 - 2x^2)}{8} + C. \quad \square$$

7.5.3

Caso 2: Radical $\sqrt{a^2 + u^2}$

Sustitución: $u = a \tan \theta$, $\theta \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$; $du = a \sec^2 \theta d\theta$; $\sqrt{a^2 + u^2} = a \sec \theta$.



Ejemplo 7.41. Calcular $\int \frac{dx}{\sqrt{x^2 + 16}}$.

Solución: Con $a = 4$: $x = 4 \tan \theta$, $dx = 4 \sec^2 \theta d\theta$, $\sqrt{x^2 + 16} = 4 \sec \theta$:

$$\int \frac{4 \sec^2 \theta d\theta}{4 \sec \theta} = \int \sec \theta d\theta = \ln |\sec \theta + \tan \theta| + C.$$


Del triángulo: $\tan \theta = \frac{x}{4}$, $\sec \theta = \frac{\sqrt{x^2 + 16}}{4}$:

$$\int \frac{dx}{\sqrt{x^2 + 16}} = \ln \left| \frac{\sqrt{x^2 + 16} + x}{4} \right| + C = \ln |\sqrt{x^2 + 16} + x| + C_1. \quad \square$$

7.5.4

Caso 3: Radical $\sqrt{u^2 - a^2}$

Sustitución: $u = a \sec \theta$, $\theta \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right) \cup \left(\frac{\pi}{2}, \pi\right]$; $du = a \sec \theta \tan \theta d\theta$; $\sqrt{u^2 - a^2} = a \tan \theta$.



Ejemplo 7.42. Calcular $\int \frac{\sqrt{x^2 - 9}}{x} dx$.

Solución: Con $a = 3$: $x = 3 \sec \theta$, $dx = 3 \sec \theta \tan \theta d\theta$, $\sqrt{x^2 - 9} = 3 \tan \theta$:

$$\int \frac{3 \tan \theta \cdot 3 \sec \theta \tan \theta d\theta}{3 \sec \theta} = 3 \int \tan^2 \theta d\theta = 3 \int (\sec^2 \theta - 1) d\theta = 3 \tan \theta - 3\theta + C.$$

Del triángulo: $\tan \theta = \frac{\sqrt{x^2 - 9}}{3}$, $\theta = \operatorname{arcsec}\left(\frac{x}{3}\right)$:

$$\int \frac{\sqrt{x^2 - 9}}{x} dx = \sqrt{x^2 - 9} - 3 \operatorname{arcsec}\left(\frac{x}{3}\right) + C. \quad \square$$

7.5.5

Tabla resumen de sustituciones

Radical	Sustitución	Diferencial	Simplificación
$\sqrt{a^2 - u^2}$	$u = a \sin \theta$	$du = a \cos \theta d\theta$	$\sqrt{a^2 - u^2} = a \cos \theta$
$\sqrt{a^2 + u^2}$	$u = a \tan \theta$	$du = a \sec^2 \theta d\theta$	$\sqrt{a^2 + u^2} = a \sec \theta$
$\sqrt{u^2 - a^2}$	$u = a \sec \theta$	$du = a \sec \theta \tan \theta d\theta$	$\sqrt{u^2 - a^2} = a \tan \theta$

Observación 7.43. Cuando el radical involucra una cuadrática general $\sqrt{ax^2 + bx + c}$, el primer paso es **completar el cuadrado** para reducirla a una de las tres formas estándar. Por ejemplo, $\sqrt{x^2 + 4x + 5} = \sqrt{(x + 2)^2 + 1}$ corresponde al Caso 2 con $u = x + 2$, $a = 1$.

7.6

Integración por Fracciones Parciales

7.6.1

Fundamento algebraico

Una **función racional** es un cociente de polinomios $\frac{P(x)}{Q(x)}$. El teorema de descomposición en fracciones parciales, basado en el **teorema fundamental del álgebra**, establece que todo polinomio real $Q(x)$ se factoriza completamente en factores lineales $(ax + b)^k$ y factores cuadráticos irreducibles $(ax^2 + bx + c)^k$ (con discriminante negativo). Sobre esta factorización se construye la descomposición, que expresa $\frac{P(x)}{Q(x)}$ como suma de fracciones más simples, cada una directamente integrable.

Observación 7.44. Toda función racional es integrable en términos de funciones elementales: el resultado siempre es combinación de logaritmos y arcotangentes. El obstáculo práctico suele ser la factorización de $Q(x)$, que para polinomios de grado alto puede ser difícil o algebraicamente imposible en forma cerrada.

7.6.2

Procedimiento

- Construcción 7.45.**
1. **Verificar propicidad.** Si $\deg P \geq \deg Q$, realizar división polinómica larga hasta obtener residuo con $\deg(\text{res}) < \deg Q$.
 2. **Factorizar** $Q(x)$ en factores lineales y cuadráticos irreducibles sobre $\mathbb{R}$.
 3. **Escribir la descomposición parcial** según los casos siguientes.
 4. **Determinar las constantes** multiplicando por $Q(x)$ y evaluando en las raíces de Q , o comparando coeficientes.
 5. **Integrar** cada fracción usando las fórmulas básicas.

7.6.3

Casos de descomposición

Definición 7.46. Sea $\frac{P(x)}{Q(x)}$ una fracción propia:

Caso I — Factores lineales distintos. $Q(x) = (x - a_1) \cdots (x - a_n)$, a_i distintos:

$$\frac{P(x)}{Q(x)} = \frac{A_1}{x - a_1} + \cdots + \frac{A_n}{x - a_n}.$$

Caso II — Factor lineal repetido. Por cada $(x - a)^k$:

$$\frac{A_1}{x - a} + \frac{A_2}{(x - a)^2} + \cdots + \frac{A_k}{(x - a)^k}.$$

Caso III — Factor cuadrático irreducible simple. Por cada $x^2 + bx + c$ ($\Delta < 0$):

$$\frac{Ax + B}{x^2 + bx + c}.$$

Caso IV — Factor cuadrático irreducible repetido. Por cada $(x^2 + bx + c)^k$:

$$\frac{A_1x + B_1}{x^2 + bx + c} + \frac{A_2x + B_2}{(x^2 + bx + c)^2} + \cdots + \frac{A_kx + B_k}{(x^2 + bx + c)^k}.$$

7.6.4

Fórmulas de integración para cada fracción

$$\int \frac{A}{x - a} dx = A \ln |x - a| + C, \quad \int \frac{A}{(x - a)^k} dx = \frac{A}{(1 - k)(x - a)^{k-1}} + C \quad (k \neq 1),$$
$$\int \frac{A}{x^2 + a^2} dx = \frac{A}{a} \arctan\left(\frac{x}{a}\right) + C, \quad \int \frac{2x + b}{x^2 + bx + c} dx = \ln |x^2 + bx + c| + C.$$

Para el Caso III general $\frac{Ax + B}{x^2 + bx + c}$, se separa el numerador en un múltiplo de la derivada del denominador más una constante residual, y luego se completa el cuadrado para usar la fórmula de la arcotangente.

7.6.5

Ejemplos

Ejemplo 7.47. Calcular $\int \frac{dx}{x^2 - 5x + 6}$.

Solución: $x^2 - 5x + 6 = (x - 2)(x - 3)$. Caso I:

$$\frac{1}{(x - 2)(x - 3)} = \frac{A}{x - 2} + \frac{B}{x - 3} \implies 1 = A(x - 3) + B(x - 2).$$

Con $x = 3$: $B = 1$; con $x = 2$: $A = -1$. Integrando:

$$\int \frac{dx}{x^2 - 5x + 6} = -\ln|x - 2| + \ln|x - 3| + C = \ln\left|\frac{x - 3}{x - 2}\right| + C. \quad \square$$

Ejemplo 7.48. Calcular $\int \frac{x^2 + 2x - 1}{2x^3 + 3x^2 - 2x} dx$.

Solución: $2x^3 + 3x^2 - 2x = x(2x - 1)(x + 2)$. Caso I:

$$\frac{x^2 + 2x - 1}{x(2x - 1)(x + 2)} = \frac{A}{x} + \frac{B}{2x - 1} + \frac{C}{x + 2}.$$

Multiplicando: $x^2 + 2x - 1 = A(2x - 1)(x + 2) + Bx(x + 2) + Cx(2x - 1)$. Con $x = 0$: $A = \frac{1}{2}$; con $x = \frac{1}{2}$: $B = \frac{1}{5}$; con $x = -2$: $C = -\frac{1}{10}$. Integrando:

$$\int \frac{x^2 + 2x - 1}{2x^3 + 3x^2 - 2x} dx = \frac{1}{2} \ln|x| + \frac{1}{10} \ln|2x - 1| - \frac{1}{10} \ln|x + 2| + C. \quad \square$$

Ejemplo 7.49. Calcular $\int \frac{2x + 2}{x^2 - 4x + 8} dx$.

Solución: $\Delta = 16 - 32 = -16 < 0$: denominador irreducible, Caso III. Separamos:

$$2x + 2 = (2x - 4) + 6.$$

$$\int \frac{2x + 2}{x^2 - 4x + 8} dx = \int \frac{2x - 4}{x^2 - 4x + 8} dx + 6 \int \frac{dx}{x^2 - 4x + 8} = \ln(x^2 - 4x + 8) + 6 \int \frac{dx}{(x - 2)^2 + 4}.$$

Completando el cuadrado y usando la arcotangente:

$$6 \cdot \frac{1}{2} \arctan\left(\frac{x - 2}{2}\right) + C = 3 \arctan\left(\frac{x - 2}{2}\right) + C.$$

Resultado:

$$\int \frac{2x + 2}{x^2 - 4x + 8} dx = \ln(x^2 - 4x + 8) + 3 \arctan\left(\frac{x - 2}{2}\right) + C. \quad \square$$

Ejemplo 7.50. Calcular $\int \frac{x^3 + x}{x^2 - 1} dx$ (fracción impropia).

Solución: $\deg P = 3 > \deg Q = 2$: división larga. $x^3 + x = (x^2 - 1) \cdot x + 2x$, así que $\frac{x^3 + x}{x^2 - 1} = x + \frac{2x}{x^2 - 1}$. Factorizamos $x^2 - 1 = (x - 1)(x + 1)$; Caso I sobre el residuo: $\frac{2x}{(x - 1)(x + 1)} = \frac{A}{x - 1} + \frac{B}{x + 1}$, $A = B = 1$. Integrando:

$$\int \frac{x^3 + x}{x^2 - 1} dx = \frac{x^2}{2} + \ln|x - 1| + \ln|x + 1| + C. \quad \square$$

Ejemplo 7.51. Calcular $\int \frac{dx}{x^2(x-1)}$ (factor lineal repetido).

Solución: Casos I y II combinados:

$$\frac{1}{x^2(x-1)} = \frac{A}{x} + \frac{B}{x^2} + \frac{C}{x-1} \implies 1 = Ax(x-1) + B(x-1) + Cx^2.$$

Con $x = 0$: $B = -1$; con $x = 1$: $C = 1$; con $x = -1$: $A = -1$. Integrando:

$$\int \frac{dx}{x^2(x-1)} = -\ln|x| + \frac{1}{x} + \ln|x-1| + C = \ln\left|\frac{x-1}{x}\right| + \frac{1}{x} + C. \quad \square$$

Observación 7.52. Las cinco técnicas de este capítulo no son independientes: en muchos problemas se aplican de forma combinada. Una integral puede requerir primero completar el cuadrado (reducción algebraica), luego sustitución trigonométrica (que produce una potencia de secante), y finalmente integración por partes (para reducir esa potencia). La integración es esencialmente un arte de reconocimiento de patrones cuya destreza se desarrolla mediante la resolución sistemática de una variedad amplia de ejercicios.

7.7

Ejercicios propuestos

Problema 7.53. Calcule las siguientes integrales usando sustitución simple, integración por partes o fracciones parciales según corresponda:

1. $\int \sqrt{1-4y} \, dy$

2. $\int x^4 \sqrt{3x^5-5} \, dx$

3. $\int y^2 \sec^2(y^3) \, dy$

4. $\int \frac{x^2-4x+6}{x^3-6x^2+18x} \, dx$

5. $\int x^2 e^x \cos x \, dx$

6. $\int \frac{x^2+2x}{\sqrt{x^3+3x^2+1}} \, dx$

7. $\int \sec x \tan x \cos(\sec x) \, dx$

8. $\int x^2 e^x \, dx$

9. $\int \cos^2 x \, dx$

10. $\int \frac{x e^x}{(x+1)^2} \, dx$

11. $\int \sin t \ln(\cos t) \, dt$

12. $\int x \sec^2 x \, dx$

13. $\int x \arctan x \, dx$

14. $\int e^x \cos x \, dx$

15. $\int \sqrt{20-8x-x^2} \, dx$

16. $\int \frac{5x-1}{x^2-1} \, dx$

17. $\int \frac{3x-13}{(x+2)(x-5)} \, dx$

18. $\int \cos x \sqrt{4-\sin^2 x} \, dx$

19. $\int \frac{2x^2+3x+2}{x^3+4x^2+6x+4} \, dx$

20. $\int \frac{1}{9x^4+x^2} \, dx$

21. $\int \frac{e^{5x}}{(e^{2x}+1)^2} \, dx$

22. $\int \frac{\ln x}{x^2} \, dx$
- Andrés Fabián Leal Archila

23. $\int \frac{2x^2 - x - 20}{x^2 + x - 6} dx$

24. $\int \frac{2x^2 - 5x + 1}{x^3 - 2x^2 - x + 2} dx$

25. $\int \frac{x^3 + 2x^2 - 3x + 1}{x^2 - 1} dx$

26. $\int \frac{x^2}{(x - 1)^2(x^2 + 4)} dx$

27. $\int \frac{2x^3 - 5x^2 + 4x - 1}{(x^2 + 1)^2} dx$

28. $\int \frac{x^2 \ln x}{x^2 + 1} dx$

Problema 7.54. Calcule las siguientes integrales de potencias trigonométricas:

1. $\int \sin^2(5x) dx$

2. $\int \cos^3 x dx$

3. $\int \sin^3 x \cos^2 x dx$

4. $\int \sec^4(5x) dx$

5. $\int \tan^2 x dx$

6. $\int \sec(7x) dx$

7. $\int \sin x \cos x dx$

8. $\int \sin^4(6x) dx$

9. $\int \tan^3\left(\frac{x}{2}\right) \sec^2\left(\frac{x}{2}\right) dx$

10. $\int \frac{\tan^3 x}{\sqrt{\sec x}} dx$

11. $\int \tan^3(2x) \sec(2x) dx$

12. $\int \sin^3 x \cos^4 x dx$

13. $\int \sec^5 x dx$

14. $\int \sin^4 x \cos^2 x dx$

15. $\int \tan^2 x \sec^5 x dx$

Problema 7.55. Calcule las siguientes integrales usando sustitución trigonométrica:

1. $\int \frac{dx}{\sqrt{9 - x^2}}$

2. $\int \frac{dx}{x^2 + 4}$

3. $\int \sqrt{1 - 4x^2} dx$

4. $\int \frac{x^2}{\sqrt{16 - x^2}} dx$

5. $\int \frac{dx}{\sqrt{x^2 - 7}}$

6. $\int \frac{dt}{t^2 \sqrt{t^2 - 16}}$

7. $\int \frac{dx}{(x^2 + 4)^{3/2}}$

8. $\int \sqrt{a^2 - x^2} dx$

9. $\int \frac{x^2}{\sqrt{2x - x^2}} dx$

10. $\int \frac{x}{\sqrt{x^2 + 6x + 12}} dx$

11. $\int \frac{dx}{x \sqrt{4x^2 + 9}}$

12. $\int \frac{\cos x}{\sqrt{1 + \sin^2 x}} dx$

13. $\int \sqrt{x^2 + 2x} dx$

14. $\int \frac{dz}{z \sqrt{25 - 4z^2}}$

15. $\int \frac{x^2}{\sqrt{5 - 4x^2}} dx$

Problema 7.56 (Problemas de referencia — *Spivak*, *Cap. 19* ~~*de*~~ *Larson*). 1. $\int \sqrt{\tan x} dx$

3. $\int \frac{dx}{1 + \sin^2 x}$

4. $\int \frac{dx}{x\sqrt{x^n+1}}$

5. $\int \frac{x^2}{(2x-x^2)^{3/2}} dx$

6. $\int \frac{dx}{x^4\sqrt{x^2-9}}$

7. $\int \frac{dx}{2-\sin x}$

8. $\int_0^{\pi/2} \sin^n x \, dx$

Capítulo


8

La Integral Definida

8.1

Antecedentes Históricos: De Arquímedes a Leibniz

El problema de calcular el área de regiones con fronteras curvas es uno de los más antiguos de la matemática. Los geómetras griegos sabían calcular áreas de polígonos —dividiendo la figura en triángulos—, pero la extensión de este procedimiento a curvas arbitrarias representaba un obstáculo conceptual de primer orden. La solución más refinada de la antigüedad fue propuesta por **Arquímedes de Siracusa** (287–212 a.C.) en su tratado *Cuadratura de la parábola* y en *La medida del círculo*: el célebre **método de exhaustión**. La idea consiste en inscribir y circunscribir polígonos regulares de n lados en la región de interés; a medida que n crece, las áreas poligonales acotan al área verdadera por arriba y por abajo con precisión creciente, y el área exacta es el único valor que no puede ser excluido por ninguna aproximación. Arquímedes demostró con este método que el área del círculo de radio r es πr^2 , y que el área bajo la parábola $y = x^2$ entre 0 y 1 es $\frac{1}{3}$.



Azul: $n = 6$; Rojo: $n = 12$; Negro: círculo exacto

Observación 8.1. *El método de exhaustión de Arquímedes anticipa conceptualmente el límite, aunque sin la formulación algebraica que desarrollarían Newton y Leibniz dos mil años después. Lo que separa a Arquímedes del cálculo moderno no es la intuición, sino el lenguaje simbólico. Fue Gottfried Wilhelm Leibniz quien en 1675 introdujo la notación $\int f(x) dx$ —donde el signo $\int$ es una “S” alargada de summa— y estableció las reglas de manipulación de diferenciales que permiten calcular integrales de manera sistemática.*

8.2

Notación Sigma y Fórmulas de Sumatorias

Para formalizar el proceso de aproximación por sumas finitas se utiliza la **notación sigma**, que permite escribir sumas de muchos términos de forma compacta. La suma $f(x_1) + f(x_2) + \cdots + f(x_n)$ se escribe como $\sum_{i=1}^n f(x_i)$.

Teorema 8.2 (Fórmulas de sumatorias fundamentales). *Para todo entero positivo n :*

$$\sum_{i=1}^n 1 = n, \quad \sum_{i=1}^n i = \frac{n(n+1)}{2}, \quad \sum_{i=1}^n i^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}, \quad \sum_{i=1}^n i^3 = \left[\frac{n(n+1)}{2} \right]^2.$$

Observación 8.3. La fórmula $\sum_{i=1}^n i = \frac{n(n+1)}{2}$ se atribuye popularmente a Gauss, quien supuestamente la descubrió de niño al sumar los enteros del 1 al 100. El argumento geométrico es elegante: al escribir la suma en orden creciente y decreciente simultáneamente, cada par suma $n + 1$ y hay n pares, dando $\frac{n(n+1)}{2}$.

8.3

Sumas de Riemann


Definición 8.4. Sea f una función definida en $[a, b]$. Una **partición** de $[a, b]$ es un conjunto de puntos $P = \{x_0, x_1, \dots, x_n\}$ con

$$a = x_0 < x_1 < x_2 < \cdots < x_n = b.$$

La longitud del i -ésimo subintervalo es $\Delta x_i = x_i - x_{i-1}$. La **norma** de la partición es $\|P\| = \max_{1 \leq i \leq n} \Delta x_i$. En cada subintervalo $[x_{i-1}, x_i]$ se elige un **punto muestra** $\bar{x}_i \in [x_{i-1}, x_i]$. La **suma de Riemann** asociada es

$$R_P = \sum_{i=1}^n f(\bar{x}_i) \Delta x_i.$$

Geométricamente, cada término $f(\bar{x}_i) \Delta x_i$ es el área con signo de un rectángulo de base Δx_i y altura $f(\bar{x}_i)$: positiva si $f(\bar{x}_i) > 0$, negativa si $f(\bar{x}_i) < 0$.



Suma de Riemann con $n = 7$ (punto derecho)

Observación 8.5. Según la elección del punto muestra $\bar{x}_i$, la suma de Riemann toma nombres especiales. Si $\bar{x}_i = x_{i-1}$ se llama **suma por la izquierda**; si $\bar{x}_i = x_i$, **suma por la derecha**; si $\bar{x}_i = \frac{x_{i-1} + x_i}{2}$, **suma del punto medio**. Para funciones monótonas, las sumas por la izquierda y por la derecha proporcionan cotas inferior y superior del área exacta, lo que da lugar a las **sumas de Darboux**.

Ejemplo 8.6. Evaluar $\int_{-2}^3 (x + 3) dx$ como límite de sumas de Riemann usando puntos derechos.

Solución: Tomamos una partición regular con n subintervalos: $\Delta x = \frac{3 - (-2)}{n} = \frac{5}{n}$ y puntos derechos $x_i = -2 + i \Delta x = -2 + \frac{5i}{n}$. La suma de Riemann es

$$R_n = \sum_{i=1}^n f(x_i) \Delta x = \sum_{i=1}^n \left[\left(-2 + \frac{5i}{n} \right) + 3 \right] \frac{5}{n} = \frac{5}{n} \sum_{i=1}^n \left(1 + \frac{5i}{n} \right).$$

Separamos la suma usando linealidad:

$$R_n = \frac{5}{n} \left[\sum_{i=1}^n 1 + \frac{5}{n} \sum_{i=1}^n i \right] = \frac{5}{n} \left[n + \frac{5}{n} \cdot \frac{n(n+1)}{2} \right] = 5 + \frac{25(n+1)}{2n} = 5 + \frac{25}{2} \left(1 + \frac{1}{n} \right).$$

Tomando el límite cuando $n \rightarrow \infty$:

$$\int_{-2}^3 (x + 3) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} R_n = 5 + \frac{25}{2} = \frac{35}{2}.$$

Este resultado puede verificarse geométricamente: la región es un trapecio de bases $f(-2) = 1$ y $f(3) = 6$ y altura 5, cuya área es $\frac{(1+6) \cdot 5}{2} = \frac{35}{2}$. $\square$

8.4

La Integral Definida


Definición 8.7. Sea f definida en $[a, b]$. Se dice que f es **integrable en** $[a, b]$ si el límite

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{\|P\| \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\bar{x}_i) \Delta x_i$$

existe y es el mismo para toda elección de particiones con $\|P\| \rightarrow 0$ y para toda elección de puntos muestra $\bar{x}_i$. Este límite se denomina la **integral definida** de f en $[a, b]$.

Teorema 8.8 (Integrabilidad de funciones continuas). *Si f es continua en $[a, b]$, entonces f es integrable en $[a, b]$. Más aún, f es integrable en $[a, b]$ si es acotada y tiene a lo sumo un número finito de discontinuidades.*

Observación 8.9. *La interpretación geométrica de la integral definida depende del signo de f . Si $f(x) \geq 0$ en $[a, b]$, la integral representa el área de la región comprendida entre la gráfica de f y el eje x . Si f toma valores negativos en alguna parte del intervalo, la integral representa el **área neta**: el área de las regiones sobre el eje x menos el área de las regiones bajo el eje x .*



8.5

Propiedades de la Integral Definida

Teorema 8.10 (Propiedades algebraicas). Sean f y g integrables en $[a, b]$ y $k \in \mathbb{R}$. Entonces:

- 1. $\int_a^b k f(x) dx = k \int_a^b f(x) dx$.
- 2. $\int_a^b [f(x) \pm g(x)] dx = \int_a^b f(x) dx \pm \int_a^b g(x) dx$.
- 3. $\int_a^a f(x) dx = 0$.
- 4. $\int_a^b f(x) dx = - \int_b^a f(x) dx$.

Teorema 8.11 (Aditividad en intervalos). Si f es integrable en un intervalo que contiene a a , b y c (en cualquier orden), entonces

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx.$$

Teorema 8.12 (Simetría para funciones pares e impares). Sea f integrable en $[-a, a]$ con $a > 0$.

- 1. Si f es **par** ($f(-x) = f(x)$): $\int_{-a}^a f(x) dx = 2 \int_0^a f(x) dx$.
- 2. Si f es **impar** ($f(-x) = -f(x)$): $\int_{-a}^a f(x) dx = 0$.

Observación 8.13. Las propiedades de simetría reducen significativamente el trabajo algebraico en integrales sobre intervalos simétricos. Por ejemplo, $\int_{-\pi}^{\pi} \sin^3 x dx = 0$ sin necesidad de calcular nada, pues $\sin^3 x$ es función impar.

Teorema 8.14 (Propiedad de acotamiento y comparación). Sea f integrable en $[a, b]$ con $a < b$.

- 1. Si $m \leq f(x) \leq M$ para todo $x \in [a, b]$, entonces

$$m(b - a) \leq \int_a^b f(x) dx \leq M(b - a).$$

2. Si $f(x) \leq g(x)$ para todo $x \in [a, b]$, entonces $\int_a^b f(x) \, dx \leq \int_a^b g(x) \, dx$.
3. $\left| \int_a^b f(x) \, dx \right| \leq \int_a^b |f(x)| \, dx$.

Ejemplo 8.15. Acotar $\int_2^4 x^2 \, dx$ sin calcularla directamente.

Solución: En $[2, 4]$, la función $f(x) = x^2$ es creciente, por lo que $m = f(2) = 4$ y $M = f(4) = 16$. Por la propiedad de acotamiento:

$$4(4 - 2) \leq \int_2^4 x^2 \, dx \leq 16(4 - 2), \quad \text{es decir,} \quad 8 \leq \int_2^4 x^2 \, dx \leq 32.$$

El valor exacto es $\left[\frac{x^3}{3} \right]_2^4 = \frac{64}{3} - \frac{8}{3} = \frac{56}{3} \approx 18,67$, que efectivamente cae en el intervalo $[8, 32]$. $\square$

8.6

Los Teoremas Fundamentales del Cálculo


El resultado más importante del análisis elemental es la conexión entre las dos operaciones que parecían independientes: la diferenciación y la integración. Esta relación, descubierta independientemente por Newton y Leibniz en el siglo XVII, constituye el núcleo de todo el cálculo.

8.6.1

Primer Teorema Fundamental

Definición 8.16. Sea f continua en $[a, b]$. La **función de acumulación** (o función de área) asociada a f es

$$F(x) = \int_a^x f(t) \, dt, \quad x \in [a, b].$$



Teorema 8.17 (Primer Teorema Fundamental del Cálculo — TFC1). Si f es continua en $[a, b]$, entonces la función de acumulación $F(x) = \int_a^x f(t) \, dt$ es diferenciable en (a, b) y

$$F'(x) = \frac{d}{dx} \left[\int_a^x f(t) \, dt \right] = f(x).$$

El TFC1 afirma que la tasa de cambio instantánea del área acumulada bajo f hasta el punto x es exactamente el valor de f en ese punto: si la función es grande en x , el área crece rápidamente; si es pequeña, crece despacio.

Ejemplo 8.18. Si $F(x) = \int_1^x t^3 dt$, calcular $F'(x)$.

Solución: Por el TFC1, simplemente se sustituye $t = x$ en el integrando: $F'(x) = x^3$. $\square$

Ejemplo 8.19. Calcular $\frac{d}{dx} \int_2^{x^2} \frac{t^{3/2}}{\sqrt{t^2 + 17}} dt$.

Solución: El límite superior es $u(x) = x^2$, una función de x . Definimos $G(u) = \int_2^u \frac{t^{3/2}}{\sqrt{t^2 + 17}} dt$, de modo que la expresión pedida es $G(u(x))$. Por regla de la cadena:

$$\frac{d}{dx} G(u(x)) = G'(u) \cdot u'(x) = \frac{(x^2)^{3/2}}{\sqrt{(x^2)^2 + 17}} \cdot 2x = \frac{2x^4}{\sqrt{x^4 + 17}}. \quad \square$$

Observación 8.20. La forma general de aplicación del TFC1 con regla de la cadena es:

$$\frac{d}{dx} \int_{g(x)}^{h(x)} f(t) dt = f(h(x)) \cdot h'(x) - f(g(x)) \cdot g'(x).$$

8.6.2

Segundo Teorema Fundamental

Teorema 8.21 (Segundo Teorema Fundamental del Cálculo — TFC2). Si f es continua en $[a, b]$ y G es **cualquier antiderivada** de f en $[a, b]$ (es decir, $G' = f$), entonces

$$\int_a^b f(x) dx = G(b) - G(a) = \left[G(x) \right]_a^b.$$

Este teorema transforma el cálculo de áreas en un problema algebraico: basta hallar una antiderivada de f y evaluar la diferencia en los extremos. La notación $\left[G(x) \right]_a^b$ es estándar y representa $G(b) - G(a)$.

Ejemplo 8.22. Calcular $\int_0^2 (2x^2 - 3x + 2) dx$.

Solución: Una antiderivada de $2x^2 - 3x + 2$ es $G(x) = \frac{2x^3}{3} - \frac{3x^2}{2} + 2x$. Por el TFC2:

$$\int_0^2 (2x^2 - 3x + 2) dx = \left[\frac{2x^3}{3} - \frac{3x^2}{2} + 2x \right]_0^2 = \left(\frac{16}{3} - 6 + 4 \right) - 0 = \frac{16}{3} - 2 = \frac{10}{3}. \quad \square$$

Ejemplo 8.23. Calcular $\int_0^1 \frac{x + 1}{(x^2 + 2x + 6)^2} dx$ usando sustitución.

Solución: Sea $u = x^2 + 2x + 6$, de modo que $du = (2x + 2) dx = 2(x + 1) dx$, es decir, $(x + 1) dx =$

$\frac{du}{2}$. Cambiamos los límites: para $x = 0$, $u = 6$; para $x = 1$, $u = 1 + 2 + 6 = 9$. Entonces:

$$\int_0^1 \frac{x+1}{(x^2+2x+6)^2} dx = \frac{1}{2} \int_6^9 u^{-2} du = \frac{1}{2} \left[-\frac{1}{u} \right]_6^9 = \frac{1}{2} \left(-\frac{1}{9} + \frac{1}{6} \right) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{18} = \frac{1}{36}. \quad \square$$

8.7


Teorema del Valor Medio para Integrales

Definición 8.24. Si f es integrable en $[a, b]$, el **valor promedio** de f en $[a, b]$ es

$$\bar{f} = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx.$$

Teorema 8.25 (Teorema del Valor Medio para Integrales). Si f es continua en $[a, b]$, entonces existe al menos un número $c \in (a, b)$ tal que

$$f(c) = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx, \quad \text{equivalentemente,} \quad \int_a^b f(x) dx = f(c)(b-a).$$



$$f(c)(b-a) = \int_a^b f(x) dx$$

Observación 8.26. El Teorema del Valor Medio para Integrales es consecuencia directa del TFC2 y del Teorema del Valor Medio para Derivadas aplicado a la función de acumulación $F(x) = \int_a^x f(t) dt$: como F es continua en $[a, b]$ y diferenciable en (a, b) , existe $c \in (a, b)$ con $F'(c) = \frac{F(b) - F(a)}{b-a}$, que es exactamente $f(c) = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx$.

Ejemplo 8.27. Encontrar el valor promedio de $f(x) = x^2$ en $[1, 4]$ y el punto c garantizado por el teorema.

Solución: El valor promedio es

$$\bar{f} = \frac{1}{4-1} \int_1^4 x^2 dx = \frac{1}{3} \left[\frac{x^3}{3} \right]_1^4 = \frac{1}{3} \cdot \frac{64-1}{3} = \frac{63}{9} = 7.$$

El punto c satisface $f(c) = c^2 = 7$, de donde $c = \sqrt{7} \approx 2,646$. Como $\sqrt{7} \in (1, 4)$, el teorema queda verificado. $\square$

Teorema 8.28 (Segundo Teorema del Valor Medio para Integrales). *Si f es integrable en $[a, b]$ y ϕ es monótona en $[a, b]$, entonces existe $\xi \in [a, b]$ tal que*

$$\int_a^b f(x) \phi(x) dx = \phi(a) \int_a^\xi f(x) dx + \phi(b) \int_\xi^b f(x) dx.$$

Observación 8.29. *Este resultado, tratado en la formulación de Spivak, tiene aplicaciones en el análisis de convergencia de integrales impropias y en el análisis de Fourier. A nivel de Cálculo I, basta con conocer su enunciado y entender que generaliza el Teorema del Valor Medio estándar al permitir que el integrando tenga un factor de peso $\phi(x)$ monótono.*

Capítulo

9

Aplicaciones de la integral

La integral definida, más allá de su interpretación como área bajo una curva, es una herramienta fundamental para modelar y resolver problemas geométricos, físicos y de ingeniería. En este capítulo desarrollaremos las aplicaciones clásicas: cálculo de áreas de regiones planas, volúmenes de sólidos de revolución, longitud de arco, áreas de superficies de revolución y aplicaciones físicas como trabajo, centro de masa y momento de inercia. El hilo conductor de todo el capítulo es el método de **rebanar, aproximar e integrar**: identificar la cantidad diferencial dQ apropiada, sumar infinitesimalmente las contribuciones y reconocer la suma límite como una integral definida.

En general, un protocolo práctico puede resumirse así para cada aplicación:

Observación 9.1. *Según cada aplicación, es posible aplicar el siguiente protocolo:*

Áreas. *Grafique primero. Si las curvas se expresan mejor como $x = g(y)$, integre respecto a y . Cuando haya varios cruces, sume integrales en subintervalos.*

Volúmenes.

- Discos/arandelas: *el rectángulo representativo es **perpendicular** al eje de rotación.*
- Cascarones: *el rectángulo representativo es **paralelo** al eje de rotación.*
- Para ejes desplazados, *ajuste el radio sumando o restando el desplazamiento.*

Longitud de arco. *Verifique que f' sea continua; si la integral resultante no es elemental, use integración numérica (Simpson, Trapecios o Riemann).*

Superficies. *Recuerde el factor $2\pi \times \text{radio} \times ds$; el radio es la distancia del punto al eje de rotación.*

Trabajo. *Identifique $F(x)$ e integre. Para bombeo, exprese la distancia de elevación en función de la variable de integración.*

Centro de masa. *Para regiones entre dos curvas: $M_y = \rho \int_a^b x[f(x) - g(x)] dx$ y $M_x = \frac{\rho}{2} \int_a^b ([f(x)]^2 - [g(x)]^2) dx$.*

Fuerza hidrostática. *Use $F = \int \rho g h w(h) dh$; exprese la anchura $w(h)$ en función de la profundidad h .*

Teorema 9.2 (Principio unificador de las aplicaciones de la integral). *Cualquier cantidad acumulativa Q que satisfaga:*

1. *Puede aproximarse en subintervalos: $Q \approx \sum g(x_i^*) \Delta x$.*
2. *La aproximación converge cuando $\Delta x \rightarrow 0$.*

puede calcularse exactamente como $Q = \int_a^b g(x) dx$. Este principio unifica todas las aplicaciones presentadas en el capítulo: el área, el volumen, la longitud de arco, el trabajo, los momentos y la fuerza hidrostática son, en esencia, límites de sumas de Riemann con distintos integrandos $g(x)$.

Observación 9.3. La potencia del cálculo integral radica en transformar problemas geométricos y físicos complejos en operaciones algebraicas sistemáticas. Dominar estas aplicaciones requiere práctica en tres pasos fundamentales:

- 1. Identificar el elemento diferencial dQ adecuado para el problema,
- 2. Expresar dQ en términos de una sola variable de integración, y
- 3. Determinar los límites de integración a partir de la geometría del problema.

9.1

Cálculo de áreas de regiones planas

Definición 9.4 (Área bajo una curva). Sea $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ una función continua y no negativa. El **área** de la región acotada por la gráfica de f , el eje x y las rectas verticales $x = a$, $x = b$ se define como

$$A = \int_a^b f(x) \, dx.$$


Si $f(x) \leq 0$ en $[a, b]$, el área geométrica es $A = - \int_a^b f(x) \, dx = \int_a^b |f(x)| \, dx$.

Observación 9.5. La integral definida calcula el **área algebraica** (con signo), mientras que el área geométrica siempre es no negativa. Para obtener el área real entre una curva y el eje x cuando f cambia de signo, debe dividirse el intervalo en partes donde f no cambie de signo e integrar el valor absoluto en cada parte:

$$A = \int_a^b |f(x)| \, dx = \int_{\{f \geq 0\}} f(x) \, dx - \int_{\{f \leq 0\}} f(x) \, dx.$$

Ejemplo 9.6 (Área entre la curva y el eje x con cambio de signo). Calcule el área de la región acotada por $y = x^3 - x$ y el eje x en $[-1, 1]$.

Solución: Paso 1: Análisis gráfico y región. Las raíces de $x^3 - x = x(x - 1)(x + 1)$ en $[-1, 1]$ son $x = -1, 0, 1$. La función es positiva en $(-1, 0)$ (región azul) y negativa en $(0, 1)$ (región roja). Para obtener el área geométrica debemos integrar el valor absoluto en cada subintervalo.



Paso 2: Elemento diferencial. $dA = |f(x)| \, dx$.
Paso 3: Límites de integración. Dividimos en $[-1, 0]$ y $[0, 1]$.

Paso 4: Evaluación.

$$\begin{aligned} A &= \int_{-1}^0 (x^3 - x) \, dx + \left| \int_0^1 (x^3 - x) \, dx \right| \\ &= \left[\frac{x^4}{4} - \frac{x^2}{2} \right]_{-1}^0 + \left| \left[\frac{x^4}{4} - \frac{x^2}{2} \right]_0^1 \right| \\ &= \left(0 - \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{2} \right) \right) + \left| \frac{1}{4} - \frac{1}{2} \right| \\ &= \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \boxed{\frac{1}{2}}. \end{aligned}$$

Teorema 9.7 (Área entre dos curvas). Sean f y g funciones continuas en $[a, b]$ tales que $f(x) \geq g(x)$ para todo $x \in [a, b]$. El área de la región acotada por ambas gráficas y las rectas $x = a$, $x = b$ es

$$A = \int_a^b [f(x) - g(x)] \, dx.$$

Demostración. Dividimos $[a, b]$ en n subintervalos de ancho $\Delta x = (b - a)/n$. En cada subintervalo $[x_{i-1}, x_i]$ se toma x_i^* y se aproxima la porción de la región por un rectángulo de altura $f(x_i^*) - g(x_i^*)$ y base Δx . La suma de Riemann asociada es

$$S_n = \sum_{i=1}^n [f(x_i^*) - g(x_i^*)] \Delta x.$$


Tomando el límite cuando $n \rightarrow \infty$ y usando la continuidad de $f - g$:

$$A = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \int_a^b [f(x) - g(x)] \, dx.$$

□

Ejemplo 9.8. Calcule el área de la región acotada por $y = x^2$ e $y = x + 2$.

Solución: **Paso 1: Análisis gráfico y región.** Intersecciones: $x^2 = x + 2 \Rightarrow x^2 - x - 2 = 0 \Rightarrow (x - 2)(x + 1) = 0$, luego $x = -1$ y $x = 2$. En $[-1, 2]$ se verifica $x + 2 \geq x^2$.



Paso 2: Elemento diferencial. $dA = [\text{curva superior} - \text{curva inferior}] \, dx = [(x + 2) - x^2] \, dx$.
Paso 3: Límites. $a = -1$, $b = 2$.

Paso 4: Evaluación.


$$\begin{aligned} A &= \int_{-1}^2 [(x+2) - x^2] \, dx = \int_{-1}^2 (-x^2 + x + 2) \, dx \\ &= \left[-\frac{x^3}{3} + \frac{x^2}{2} + 2x \right]_{-1}^2 \\ &= \left(-\frac{8}{3} + 2 + 4 \right) - \left(\frac{1}{3} + \frac{1}{2} - 2 \right) \\ &= \frac{10}{3} + \frac{7}{6} = \frac{27}{6} = \boxed{\frac{9}{2}}. \end{aligned}$$

Observación 9.9. Cuando las curvas se intersectan en más de dos puntos, el área total se obtiene sumando las integrales en cada subintervalo donde una función domina a la otra. Es crucial graficar primero para identificar correctamente los límites y el orden de resta en cada tramo.

Ejemplo 9.10. Halle el área de la región acotada por $f(x) = \sin x$ y $g(x) = \cos x$ en $[0, 2\pi]$.

Solución: **Paso 1: Análisis gráfico y región.** En $[0, 2\pi]$ las curvas se cruzan en $x = \pi/4$ y $x = 5\pi/4$. Analizando signos:

- En $\left[0, \frac{\pi}{4}\right]$: $\cos x \geq \sin x$.
- En $\left[\frac{\pi}{4}, \frac{5\pi}{4}\right]$: $\sin x \geq \cos x$.
- En $\left[\frac{5\pi}{4}, 2\pi\right]$: $\cos x \geq \sin x$.



Paso 2: Elemento diferencial. $dA = |\sin x - \cos x| \, dx$, dividido en tres tramos.

Paso 3: Límites. $\left[0, \frac{\pi}{4}\right]$, $\left[\frac{\pi}{4}, \frac{5\pi}{4}\right]$, $\left[\frac{5\pi}{4}, 2\pi\right]$.

Paso 4: Evaluación.

$$\begin{aligned} A &= \int_0^{\pi/4} (\cos x - \sin x) \, dx + \int_{\pi/4}^{5\pi/4} (\sin x - \cos x) \, dx + \int_{5\pi/4}^{2\pi} (\cos x - \sin x) \, dx \\ &= [\sin x + \cos x]_0^{\pi/4} + [-\cos x - \sin x]_{\pi/4}^{5\pi/4} + [\sin x + \cos x]_{5\pi/4}^{2\pi} \\ &= \left(\frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2} - (0 + 1) \right) + \left(\frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2} - \left(-\frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{\sqrt{2}}{2} \right) \right) + \left((0 + 1) - \left(-\frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{\sqrt{2}}{2} \right) \right) \\ &= (\sqrt{2} - 1) + 2\sqrt{2} + (\sqrt{2} + 1) = \boxed{4\sqrt{2}}. \end{aligned}$$


Definición 9.11. Si la región está acotada por curvas de la forma $x = p(y)$ y $x = q(y)$, con $p(y) \geq q(y)$ para $y \in [c, d]$, entonces el área es

$$A = \int_c^d [p(y) - q(y)] \, dy.$$

Observación 9.12. Se prefiere integrar respecto a y cuando las curvas se expresan naturalmente como $x = h(y)$ (por ejemplo, parábolas horizontales) o cuando la integración respecto a x obligaría a dividir el intervalo en varios tramos con distintas funciones superiores e inferiores.

Ejemplo 9.13 (Área con integración respecto a y). Halle el área acotada por $x = y^2$ y $x = y + 2$.

Solución: **Paso 1: Análisis gráfico y región.** Intersecciones: $y^2 = y + 2 \Rightarrow y = -1, 2$. En $[-1, 2]$ se tiene $y + 2 \geq y^2$ (la recta queda a la derecha).



Paso 2: Elemento diferencial. $dA = [\text{curva derecha} - \text{curva izquierda}] dy = [(y + 2) - y^2] dy$.

Paso 3: Límites. $y \in [-1, 2]$.


Paso 4: Evaluación.

$$A = \int_{-1}^2 [(y + 2) - y^2] dy = \left[\frac{y^2}{2} + 2y - \frac{y^3}{3} \right]_{-1}^2 = \left(2 + 4 - \frac{8}{3} \right) - \left(\frac{1}{2} - 2 + \frac{1}{3} \right) = \boxed{\frac{9}{2}},$$

coincidiendo con el Ejemplo 9.8, como debe ser.

Ejemplo 9.14. Halle el área entre $y = \sqrt{x}$, $y = x - 2$ y el eje y en el primer cuadrante.

Solución: **Paso 1: Análisis gráfico y región.** Las curvas se cortan cuando $\sqrt{x} = x - 2 \Rightarrow x = 4 \Rightarrow y = 2$. Despejando: $x = y^2$ (parábola, izquierda) y $x = y + 2$ (recta, derecha), con $y \in [0, 2]$.



Paso 2: Elemento diferencial. $dA = [(y + 2) - y^2] dy$.

Paso 3: Límites. $y \in [0, 2]$.

Paso 4: Evaluación.

$$A = \int_0^2 [(y + 2) - y^2] dy = \left[\frac{y^2}{2} + 2y - \frac{y^3}{3} \right]_0^2 = 2 + 4 - \frac{8}{3} = \boxed{\frac{10}{3}}.$$

9.2

Volúmenes de sólidos de revolución

Un **sólido de revolución** se genera al rotar una región plana alrededor de una recta llamada *eje de revolución*. Presentamos tres métodos fundamentales, cada uno adecuado para distintas configuraciones.

9.2.1

Método de los discos

Teorema 9.15 (Volumen por discos respecto al eje x). Sea R la región acotada por $y = f(x) \geq 0$, $x = a$, $x = b$ y el eje x . Al rotar R alrededor del eje x , el volumen del sólido generado es


$$V = \pi \int_a^b [f(x)]^2 dx.$$

Demostración. Dividimos $[a, b]$ en n subintervalos de ancho Δx . La porción del sólido sobre $[x_{i-1}, x_i]$ se aproxima por un disco circular de radio $f(x_i^*)$ y grosor Δx , cuyo volumen es $\pi [f(x_i^*)]^2 \Delta x$. Sumando y tomando límite:

$$V = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \pi [f(x_i^*)]^2 \Delta x = \pi \int_a^b [f(x)]^2 dx. \quad \square$$

Ejemplo 9.16. Demuestre que el volumen de un cono de radio R y altura h es $V = \frac{1}{3} \pi R^2 h$.

Solución: **Paso 1: Generatriz y región.** El cono se obtiene al girar alrededor del eje x la recta que pasa por el origen y el punto (h, R) . Su ecuación es $y = \frac{R}{h}x$, con $x \in [0, h]$. Al aplicar el método de discos, cada sección transversal perpendicular al eje de rotación es un círculo de radio $r(x) = \frac{R}{h}x$.



Paso 2: Elemento diferencial. El volumen de un disco infinitesimal de radio $r(x)$ y espesor dx es

$$dV = \pi [r(x)]^2 dx = \pi \left(\frac{R}{h}x\right)^2 dx.$$


Paso 3: Límites. La variable de integración x recorre la altura del cono, desde la cúspide ($x = 0$) hasta la base ($x = h$).

Paso 4: Evaluación.

$$V = \int_0^h \pi \left(\frac{R}{h}x\right)^2 dx = \frac{\pi R^2}{h^2} \int_0^h x^2 dx = \frac{\pi R^2}{h^2} \left[\frac{x^3}{3}\right]_0^h = \frac{\pi R^2}{h^2} \cdot \frac{h^3}{3} = \boxed{\frac{1}{3} \pi R^2 h}.$$

Ejemplo 9.17. Demuestre que el volumen de una esfera de radio R es $V = \frac{4}{3}\pi R^3$.

Solución: **Paso 1: Generatriz y región.** La esfera se genera al rotar la semicircunferencia superior $y = \sqrt{R^2 - x^2}$ alrededor del eje x , con $x \in [-R, R]$. Cada corte perpendicular al eje x produce un disco de radio $r(x) = y = \sqrt{R^2 - x^2}$.



El diagrama muestra un sistema de coordenadas con el eje horizontal etiquetado como x y el eje vertical como y . Una semicircunferencia azul está definida por la ecuación $y = \sqrt{R^2 - x^2}$, extendiéndose desde $x = -R$ hasta $x = R$. El punto $(0, 2)$ está etiquetado en el eje y . Una línea roja punteada vertical representa un elemento diferencial de espesor dx en la posición x , que genera un disco con radio $r(x)$. Las marcas en el eje x son $-R$, -2 , -1 , 1 y $2R$. Las marcas en el eje y son $0,5$, 1 , $1,5$ y 2 .

Paso 2: Elemento diferencial. El volumen diferencial es

$$dV = \pi[r(x)]^2 dx = \pi(\sqrt{R^2 - x^2})^2 dx = \pi(R^2 - x^2) dx.$$

Paso 3: Límites. La integración se realiza en $x \in [-R, R]$. Dado que el integrando $R^2 - x^2$ es una función par, podemos calcular la mitad del volumen y multiplicar por 2:

$$V = 2\pi \int_0^R (R^2 - x^2) dx.$$

Paso 4: Evaluación.

$$V = 2\pi \int_0^R (R^2 - x^2) dx = 2\pi \left[R^2 x - \frac{x^3}{3} \right]_0^R = 2\pi \left(R^3 - \frac{R^3}{3} \right) = 2\pi \cdot \frac{2R^3}{3} = \boxed{\frac{4}{3}\pi R^3}.$$

9.2.2

Método de las arandelas (washers)


Teorema 9.18 (Volumen por arandelas). Sea R la región acotada por $y = f(x)$ (superior) e $y = g(x)$ (inferior), con $f(x) \geq g(x) \geq 0$, $x \in [a, b]$. Al rotar R alrededor del eje x , el volumen es

$$V = \pi \int_a^b \left([f(x)]^2 - [g(x)]^2 \right) dx.$$

Observación 9.19. La arandela en la posición x tiene radio externo $R(x) = f(x)$ y radio interno $r(x) = g(x)$. Su área transversal es $\pi R(x)^2 - \pi r(x)^2$, de donde se obtiene la fórmula integrando sobre $[a, b]$.

Ejemplo 9.20. La región entre $y = \sqrt{x}$ e $y = x^2$ en $[0, 1]$ gira alrededor del eje x . Calcule el volumen.

Solución: **Paso 1: Región y eje.** En $[0, 1]$: $\sqrt{x} \geq x^2$. Radio externo $R(x) = \sqrt{x}$, radio interno $r(x) = x^2$.




Paso 2: Elemento diferencial. Arandela: $dV = \pi [R(x)^2 - r(x)^2] dx = \pi [x - x^4] dx$.
Paso 3: Límites. $x \in [0, 1]$.
Paso 4: Evaluación.

$$V = \pi \int_0^1 (x - x^4) dx = \pi \left[\frac{x^2}{2} - \frac{x^5}{5} \right]_0^1 = \pi \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{5} \right) = \boxed{\frac{3\pi}{10}}.$$

Ejemplo 9.21. La región acotada por $y = x^2$ e $y = 1$ gira alrededor de la recta $y = 2$. Calcule el volumen.

Solución: **Paso 1: Región y eje.** Intersecciones: $x^2 = 1 \Rightarrow x = \pm 1$. El eje de rotación $y = 2$ queda por encima de toda la región.



Paso 2: Radios y elemento diferencial. Radio externo (de $y = 2$ a $y = x^2$): $R(x) = 2 - x^2$.
Radio interno (de $y = 2$ a $y = 1$): $r(x) = 2 - 1 = 1$.

$$dV = \pi [R(x)^2 - r(x)^2] dx = \pi [(2 - x^2)^2 - 1] dx.$$

Paso 3: Límites. $x \in [-1, 1]$. Por simetría, $V = 2\pi \int_0^1 [(2 - x^2)^2 - 1] dx$.
Paso 4: Evaluación.

$$\begin{aligned} V &= \pi \int_{-1}^1 [(2 - x^2)^2 - 1] dx = 2\pi \int_0^1 (3 - 4x^2 + x^4) dx \\ &= 2\pi \left[3x - \frac{4x^3}{3} + \frac{x^5}{5} \right]_0^1 = 2\pi \left(3 - \frac{4}{3} + \frac{1}{5} \right) = \boxed{\frac{56\pi}{15}}. \end{aligned}$$

9.2.3

Método de los cascarones cilíndricos (shells)

Teorema 9.22 (Volumen por cascarones girando respecto al eje y). Sea R la región acotada por $y = f(x) \geq 0$, $x = a$, $x = b$ ($0 \leq a < b$) y el eje x . Al rotar R alrededor del eje y , el volumen es

$$V = 2\pi \int_a^b x f(x) dx,$$

donde x es el radio promedio del cascarón y $f(x)$ su altura.

Demostración. Un rectángulo vertical de ancho Δx , altura $f(x_i^*)$ y distancia x_i^* al eje y genera, al rotar, un cascarón cilíndrico cuyo volumen es aproximadamente

$$2\pi x_i^* \cdot f(x_i^*) \cdot \Delta x \quad (\text{circunferencia} \times \text{altura} \times \text{grosor}).$$

Sumando y tomando límite se obtiene la fórmula. □


Observación 9.23. El método de cascarones es especialmente útil cuando:

- El eje de revolución es paralelo al rectángulo representativo.
- Despejar x en términos de y es algebraicamente complejo.
- El sólido tiene huecos que complican el método de arandelas.

Como regla práctica: si el eje de rotación es el eje y (o una recta vertical), pruebe primero con cascarones integrando respecto a x . Si el eje de rotación es el eje x (o una recta horizontal), pruebe primero con discos/arandelas.

Ejemplo 9.24. Calcule el volumen generado al rotar la región bajo $y = \sqrt{x}$ en $[0, 4]$ alrededor del eje y .

Solución:



Solución por cascarones:

Paso 1: Elemento diferencial. Cascarón vertical: $dV = 2\pi (\text{radio}) (\text{altura}) dx = 2\pi x \sqrt{x} dx = 2\pi x^{3/2} dx$.

Paso 2: Límites. $x \in [0, 4]$.

Paso 3: Evaluación.

$$V = 2\pi \int_0^4 x^{3/2} dx = 2\pi \left[\frac{2}{5} x^{5/2} \right]_0^4 = \frac{4\pi}{5} \cdot 32 = \boxed{\frac{128\pi}{5}}.$$


Verificación por arandelas respecto a y : Despejamos $x = y^2$, con $y \in [0, 2]$. El sólido tiene

radio externo 4 y radio interno y^2 :

$$V = \pi \int_0^2 (4^2 - (y^2)^2) dy = \pi \int_0^2 (16 - y^4) dy = \pi \left[16y - \frac{y^5}{5} \right]_0^2 = \pi \left(32 - \frac{32}{5} \right) = \frac{128\pi}{5}.$$

Ejemplo 9.25. La región acotada por $y = 4x - x^2$ e $y = 0$ gira alrededor de la recta $x = 5$. Calcule el volumen.

Solución: Paso 1: Análisis gráfico y región. La parábola $y = 4x - x^2 = x(4 - x)$ abre hacia abajo, con intersecciones en $x = 0$ y $x = 4$. Su vértice está en $x = 2$, con $y = 4$. La región a rotar es el área encerrada entre la curva y el eje x en $[0, 4]$. El eje de rotación es la recta vertical $x = 5$, ubicada a la derecha de la región. Usaremos el *método de cascarones cilíndricos*: cada franja vertical en x genera un cascarón de radio $r(x) = 5 - x$ y altura $h(x) = 4x - x^2$.



Paso 2: Elemento diferencial. Para el método de cascarones, el volumen diferencial es

$$dV = 2\pi (\text{radio}) (\text{altura}) dx = 2\pi (5 - x) (4x - x^2) dx.$$

Paso 3: Límites. La variable x recorre la base de la región, desde la intersección izquierda ($x = 0$) hasta la derecha ($x = 4$): $x \in [0, 4]$.

Paso 4: Evaluación. Primero expandimos el integrando:

$$(5 - x)(4x - x^2) = 20x - 5x^2 - 4x^2 + x^3 = 20x - 9x^2 + x^3.$$

Luego integramos:

$$\begin{aligned} V &= 2\pi \int_0^4 (20x - 9x^2 + x^3) dx \\ &= 2\pi \left[10x^2 - 3x^3 + \frac{x^4}{4} \right]_0^4 \\ &= 2\pi \left(10 \cdot 16 - 3 \cdot 64 + \frac{256}{4} \right) \\ &= 2\pi (160 - 192 + 64) \\ &= 2\pi \cdot 32 = \boxed{64\pi}. \end{aligned}$$

9.3

Longitud de arco

Definición 9.26 (Longitud de una curva suave). Sea f una función con derivada continua en $[a, b]$. La **longitud de arco** de la gráfica de f desde $x = a$ hasta $x = b$ es

$$s = \int_a^b \sqrt{1 + [f'(x)]^2} \, dx.$$

Esquema de demostración. Dividimos $[a, b]$ en n subintervalos. La longitud del segmento que une $(x_{i-1}, f(x_{i-1}))$ con $(x_i, f(x_i))$ es, por el teorema de Pitágoras,

$$\Delta s_i = \sqrt{(\Delta x_i)^2 + (\Delta y_i)^2} = \sqrt{1 + \left(\frac{\Delta y_i}{\Delta x_i}\right)^2} \Delta x_i.$$


Por el Teorema del Valor Medio, $\frac{\Delta y_i}{\Delta x_i} = f'(c_i)$ para algún $c_i \in (x_{i-1}, x_i)$. Sumando y tomando límite:

$$s = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \sqrt{1 + [f'(c_i)]^2} \Delta x_i = \int_a^b \sqrt{1 + [f'(x)]^2} \, dx. \quad \square$$

Observación 9.27. El elemento diferencial de longitud de arco es $ds = \sqrt{1 + [f'(x)]^2} \, dx = \sqrt{dx^2 + dy^2}$, que corresponde geoméricamente a la hipotenusa del triángulo diferencial de catetos dx y $dy = f'(x) \, dx$. Esta interpretación facilita recordar y derivar la fórmula en distintos contextos (paramétrico, polar, etc.).

Ejemplo 9.28 (Longitud de una parábola). Calcule la longitud de arco de $y = x^2$ en $[0, 1]$.

Solución: **Paso 1: Análisis gráfico y fórmula.** La curva es una parábola que abre hacia arriba. Para calcular la longitud del arco utilizamos la fórmula diferencial $ds = \sqrt{1 + [f'(x)]^2} \, dx$.



Paso 2: Elemento diferencial. Derivamos $f(x) = x^2$ para obtener $f'(x) = 2x$. Sustituyendo en la fórmula:

$$ds = \sqrt{1 + (2x)^2} \, dx = \sqrt{1 + 4x^2} \, dx.$$

Paso 3: Límites. La variable x recorre el intervalo dado: $x \in [0, 1]$.

Paso 4: Evaluación.

$$s = \int_0^1 \sqrt{1 + 4x^2} \, dx.$$


Aplicamos la sustitución trigonométrica $2x = \tan \theta$, de modo que $dx = \frac{1}{2} \sec^2 \theta \, d\theta$. Los límites

cambian a $x = 0 \Rightarrow \theta = 0$ y $x = 1 \Rightarrow \theta = \arctan 2$:

$$\begin{aligned} s &= \frac{1}{2} \int_0^{\arctan 2} \sqrt{1 + \tan^2 \theta} \sec^2 \theta \, d\theta = \frac{1}{2} \int_0^{\arctan 2} \sec^3 \theta \, d\theta \\ &= \frac{1}{4} \left[\sec \theta \tan \theta + \ln |\sec \theta + \tan \theta| \right]_0^{\arctan 2} \\ &= \frac{1}{4} (\sqrt{5} \cdot 2 + \ln(2 + \sqrt{5})) = \boxed{\frac{\sqrt{5}}{2} + \frac{1}{4} \ln(2 + \sqrt{5}) \approx 1,479}. \end{aligned}$$

Ejemplo 9.29 (Longitud del arco de la catenaria). Calcule la longitud de arco de $y = \cosh x = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$ en $[0, \ln 2]$.

Solución: **Paso 1: Análisis gráfico y fórmula.** La catenaria es una curva suave y simétrica respecto al eje y . Su derivada es inmediata gracias a las propiedades de las funciones hiperbólicas.



Paso 2: Elemento diferencial. Dado que $f'(x) = \sinh x$, la identidad fundamental $\cosh^2 x - \sinh^2 x = 1$ simplifica drásticamente el integrando:

$$ds = \sqrt{1 + [f'(x)]^2} \, dx = \sqrt{1 + \sinh^2 x} \, dx = \cosh x \, dx.$$

Paso 3: Límites. La variable x recorre el intervalo especificado: $x \in [0, \ln 2]$.

Paso 4: Evaluación.

$$s = \int_0^{\ln 2} \cosh x \, dx.$$

La integral de la coseno hiperbólica es la seno hiperbólica:

$$s = [\sinh x]_0^{\ln 2} = \sinh(\ln 2) - \sinh(0).$$

Usando la definición exponencial $\sinh t = \frac{e^t - e^{-t}}{2}$ y sabiendo que $\sinh(0) = 0$:

$$s = \frac{e^{\ln 2} - e^{-\ln 2}}{2} = \frac{2 - \frac{1}{2}}{2} = \frac{\frac{3}{2}}{2} = \boxed{\frac{3}{4}}.$$

9.4

Áreas de superficies de revolución

Definición 9.30 (Área superficial de revolución respecto al eje x). Sea f una función no negativa con derivada continua en $[a, b]$. El área de la superficie generada al rotar la gráfica de f alrededor del eje x es

$$S = 2\pi \int_a^b f(x) \sqrt{1 + [f'(x)]^2} \, dx.$$

Idea de demostración. Un pequeño arco de longitud $ds = \sqrt{1 + [f'(x)]^2} \, dx$, al rotar alrededor del eje x , genera una banda (frustum de cono) cuya área aproximada es


$$dS = 2\pi f(x) \, ds = 2\pi f(x) \sqrt{1 + [f'(x)]^2} \, dx.$$

Integrando: $S = 2\pi \int_a^b f(x) \sqrt{1 + [f'(x)]^2} \, dx.$ □

Observación 9.31. El factor $2\pi f(x)$ es la circunferencia del círculo descrito por el punto $(x, f(x))$ al rotar. El factor ds es el elemento de longitud de arco, que “estira” la banda según la inclinación de la curva. Si se tomara $ds = dx$ en lugar de $ds = \sqrt{1 + [f'(x)]^2} \, dx$ se obtendría la fórmula incorrecta para un cilindro, no para la superficie real.

Ejemplo 9.32 (Superficie de una esfera). Demuestre que el área de una esfera de radio R es $S = 4\pi R^2$.

Solución: **Paso 1: Análisis gráfico y fórmula.** La esfera se genera al rotar la semicircunferencia superior $y = \sqrt{R^2 - x^2}$, con $x \in [-R, R]$, alrededor del eje x . Para el área de superficie de revolución usamos $dS = 2\pi y \, ds$, donde $ds = \sqrt{1 + (y')^2} \, dx$ es el elemento de arco.



Paso 2: Elemento diferencial. Derivamos $y = \sqrt{R^2 - x^2}$:

$$y' = \frac{-x}{\sqrt{R^2 - x^2}}.$$

Sustituimos en la raíz del elemento de arco:

$$1 + (y')^2 = 1 + \frac{x^2}{R^2 - x^2} = \frac{R^2 - x^2 + x^2}{R^2 - x^2} = \frac{R^2}{R^2 - x^2}.$$

Por tanto,

$$ds = \sqrt{1 + (y')^2} \, dx = \frac{R}{\sqrt{R^2 - x^2}} \, dx.$$

El área diferencial es:

$$dS = 2\pi y \, ds = 2\pi \sqrt{R^2 - x^2} \cdot \frac{R}{\sqrt{R^2 - x^2}} \, dx = 2\pi R \, dx.$$

(Nota cómo los radicales se cancelan elegantemente).

Paso 3: Límites. La variable x recorre todo el diámetro de la semicircunferencia: $x \in [-R, R]$.

Paso 4: Evaluación.


$$S = \int_{-R}^R 2\pi R \, dx = 2\pi R \int_{-R}^R dx = 2\pi R [x]_{-R}^R = 2\pi R(R - (-R)) = 2\pi R(2R) = \boxed{4\pi R^2}.$$

Teorema 9.33 (Superficie alrededor del eje y). Si la gráfica de $y = f(x)$, $x \in [a, b]$, con $f \geq 0$ y f' continua, gira alrededor del eje y , el área superficial es

$$S = 2\pi \int_a^b x \sqrt{1 + [f'(x)]^2} \, dx.$$

Ejemplo 9.34 (Superficie de un paraboloide). Halle el área de la superficie generada al rotar $y = x^2$ en $[0, 1]$ alrededor del eje y .

Solución: **Paso 1: Análisis gráfico y fórmula.** Al girar la parábola $y = x^2$ alrededor del eje y , cada franja vertical genera una banda cilíndrica. El *radio* de giro es la distancia horizontal al eje y , es decir, $r(x) = x$. La longitud de arco sigue siendo $ds = \sqrt{1 + (y')^2} \, dx$.



Paso 2: Elemento diferencial. Con $y' = 2x$, el elemento de superficie es:

$$dS = 2\pi(\text{radio}) \, ds = 2\pi x \sqrt{1 + (2x)^2} \, dx = 2\pi x \sqrt{1 + 4x^2} \, dx.$$

Paso 3: Límites. La variable x recorre el intervalo dado: $x \in [0, 1]$.

Paso 4: Evaluación.

$$S = 2\pi \int_0^1 x \sqrt{1 + 4x^2} \, dx.$$

Aplicamos la sustitución $u = 1 + 4x^2 \Rightarrow du = 8x \, dx \Rightarrow x \, dx = \frac{du}{8}$. Los límites cambian: $x = 0 \rightarrow u = 1$ y $x = 1 \rightarrow u = 5$:

$$\begin{aligned} S &= 2\pi \int_1^5 \sqrt{u} \frac{du}{8} = \frac{\pi}{4} \int_1^5 u^{1/2} \, du \\ &= \frac{\pi}{4} \left[\frac{2}{3} u^{3/2} \right]_1^5 = \frac{\pi}{6} (5^{3/2} - 1^{3/2}) \\ &= \frac{\pi}{6} (5\sqrt{5} - 1) = \boxed{\frac{\pi(5\sqrt{5} - 1)}{6}}. \end{aligned}$$

9.5

Aplicaciones físicas

9.5.1

Trabajo mecánico


Definición 9.35 (Trabajo de una fuerza variable). Si una fuerza $F(x)$ actúa en la dirección del movimiento a lo largo del eje x , el trabajo realizado al mover un objeto desde $x = a$ hasta $x = b$ es

$$W = \int_a^b F(x) \, dx.$$

Observación 9.36. Cuando la fuerza es constante, $W = F \cdot (b - a)$, que recupera la fórmula elemental $W = Fd$. La integral generaliza este concepto a fuerzas variables. Las unidades del trabajo son joules ($N \cdot m$) en el Sistema Internacional.

Ejemplo 9.37 (Ley de Hooke para la longitud de un resorte). Un resorte requiere 10 N para estirarse 0,1 m desde su longitud natural. Calcule el trabajo para estirarlo 0,3 m.

Solución: **Paso 1: Modelo de fuerza y diagrama.** La Ley de Hooke establece $F(x) = kx$, donde x es la deformación respecto a la longitud natural. De la condición $10 = k(0,1)$ se obtiene $k = 100 \text{ N/m}$, de modo que $F(x) = 100x$. Geométricamente, el trabajo buscado es el *área bajo la recta* $F(x) = 100x$ sobre el intervalo $[0, 0,3]$.



Paso 2: Elemento diferencial. Al desplazar el extremo libre del resorte un tramo infinitesimal dx en la posición x , el trabajo elemental es:

$$dW = F(x) \, dx = 100x \, dx.$$

Paso 3: Límites. El desplazamiento parte de la longitud natural $x = 0$ y llega hasta $x = 0,3 \text{ m}$.


Paso 4: Evaluación.

$$W = \int_0^{0,3} 100x \, dx = 100 \left[\frac{x^2}{2} \right]_0^{0,3} = 50 \cdot (0,3)^2 = \boxed{4,5 \text{ J}}.$$

Ejemplo 9.38. El mismo resorte del ejemplo anterior está comprimido 0,05 m. ¿Cuánto trabajo adicional se requiere para comprimirlo 0,15 m más?

Solución: **Paso 1: Modelo y convenio de signos.** La fuerza sigue siendo $F(x) = 100x$, donde x mide la deformación en magnitud. Como la compresión es simétricamente equivalente a la extensión, usamos coordenadas positivas para la compresión: el resorte ya se encuentra en $x = 0,05 \text{ m}$ y debe llevarse hasta $x = 0,05 + 0,15 = 0,20 \text{ m}$. El trabajo adicional es el área sombreada

(azul) bajo $F(x) = 100x$ entre esos dos límites; el trabajo previo (gris) ya fue realizado.



Paso 2: Elemento diferencial.

$$dW = F(x) \, dx = 100x \, dx.$$


Paso 3: Límites. La deformación varía de $x = 0,05 \text{ m}$ a $x = 0,05 + 0,15 = 0,20 \text{ m}$.

Paso 4: Evaluación.

$$W = \int_{0,05}^{0,20} 100x \, dx = 50 \left[x^2 \right]_{0,05}^{0,20} = 50(0,04 - 0,0025) = \boxed{1,875 \text{ J}}.$$

Ejemplo 9.39. Un tanque en forma de cono invertido tiene radio superior 3 m y altura 6 m, y está lleno de agua ($\rho = 1000 \text{ kg/m}^3$, $g = 9,8 \text{ m/s}^2$). Calcule el trabajo para bombear toda el agua hasta el borde.

Solución: **Paso 1: Geometría y rebanada diferencial.** Situamos el vértice del cono en el origen y el eje de simetría sobre el eje y , de modo que el borde queda en $y = 6$. Por semejanza de triángulos, la sección circular a altura y tiene radio $r(y) = \frac{3}{6}y = \frac{y}{2}$. Para bombear el agua de una rebanada ubicada en y hasta el borde, ésta debe elevarse la distancia $6 - y$.



Paso 2: Elemento diferencial. El volumen, peso y trabajo de la rebanada de grosor dy son:

$$\begin{aligned} dV &= \pi r(y)^2 \, dy = \frac{\pi y^2}{4} \, dy, \\ dF &= \rho g \, dV = \frac{9800\pi y^2}{4} \, dy, \\ dW &= dF \cdot (6 - y) = \frac{9800\pi}{4} y^2(6 - y) \, dy. \end{aligned}$$


Paso 3: Límites. La variable y recorre desde el vértice hasta el borde: $y \in [0, 6]$.

Paso 4: Evaluación.

$$\begin{aligned} W &= \frac{9800\pi}{4} \int_0^6 (6y^2 - y^3) dy = 2450\pi \left[2y^3 - \frac{y^4}{4} \right]_0^6 \\ &= 2450\pi(2 \cdot 216 - 324) = 2450\pi(108) = \boxed{264600\pi \approx 8,31 \times 10^5 \text{ J}}. \end{aligned}$$

Ejemplo 9.40. Un tanque cilíndrico de radio 2 m y altura 5 m está lleno de agua. Calcule el trabajo para bombear toda el agua hasta el borde.

Solución: **Paso 1: Geometría y rebanada diferencial.** Situamos la base del cilindro en $y = 0$ y el borde en $y = 5$. A diferencia del caso cónico, la sección transversal es *constante*: un disco de radio 2 m con área $A = \pi(2)^2 = 4\pi \text{ m}^2$. La rebanada en la posición y debe elevarse la distancia $5 - y$ hasta el borde.



Paso 2: Elemento diferencial. El peso de la rebanada de grosor dy en la posición y es constante en radio, y el trabajo que requiere es:

$$dF = \rho g A dy = 1000 \cdot 9,8 \cdot 4\pi dy = 39200\pi dy, \quad dW = dF \cdot (5 - y) = 39200\pi(5 - y) dy.$$

Paso 3: Límites. La variable y recorre desde la base hasta el borde: $y \in [0, 5]$.

Paso 4: Evaluación.

$$W = \int_0^5 39200\pi(5 - y) dy = 39200\pi \left[5y - \frac{y^2}{2} \right]_0^5 = 39200\pi \cdot \frac{25}{2} = \boxed{490000\pi \approx 1,54 \times 10^6 \text{ J}}.$$

9.5.2

Centro de masa y centroide

Definición 9.41 (Momentos y centro de masa de una lámina plana). Sea R una región plana de densidad constante ρ , acotada por $y = f(x) \geq 0$, $x = a$ y $x = b$. Sus **momentos** respecto a los ejes son

$$M_y = \rho \int_a^b x f(x) dx, \quad M_x = \frac{\rho}{2} \int_a^b [f(x)]^2 dx.$$

La **masa** es $m = \rho \int_a^b f(x) dx$ y el **centro de masa** $(\bar{x}, \bar{y})$ satisface

$$\bar{x} = \frac{M_y}{m}, \quad \bar{y} = \frac{M_x}{m}.$$

Cuando $\rho = 1$ (o se cancela), $(\bar{x}, \bar{y})$ se llama **centroide** de la región.

Observación 9.42. El centro de masa es el punto donde se equilibraría perfectamente la lámina si se apoyara en él. Para regiones con densidad variable $\rho = \rho(x,y)$, los momentos se calculan mediante integrales dobles, que se estudiarán en Cálculo Multivariable.

Teorema 9.43 (Teorema de Pappus para el volumen). Si una región plana R de área A se hace girar alrededor de un eje exterior (que no la cruza), el volumen del sólido de revolución generado es


$$V = 2\pi \bar{d} \cdot A,$$

donde $\bar{d}$ es la distancia del centroide de R al eje de rotación.

Observación 9.44. El Teorema de Pappus permite calcular volúmenes de revolución a partir del centroide (a veces más sencillo), o bien determinar el centroide de una región a partir de un volumen conocido.

Ejemplo 9.45 (Centroide de un triángulo rectángulo). Halle el centroide de la región acotada por $y = 1 - x$, $x = 0$ e $y = 0$.

Solución: **Paso 1: Geometría y masa.** Tomamos $\rho = 1$. La región es un triángulo rectángulo con vértices en $(0,0)$, $(1,0)$ y $(0,1)$.



Paso 2: Masa.

$$m = \int_0^1 (1 - x) \, dx = \left[x - \frac{x^2}{2} \right]_0^1 = \frac{1}{2}.$$

Paso 3: Momentos.

$$M_y = \int_0^1 x(1 - x) \, dx = \left[\frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3} \right]_0^1 = \frac{1}{6}, \quad M_x = \frac{1}{2} \int_0^1 (1 - x)^2 \, dx = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3} = \frac{1}{6}.$$

Paso 4: Coordenadas del centroide.


$$\bar{x} = \frac{M_y}{m} = \frac{1/6}{1/2} = \frac{1}{3}, \quad \bar{y} = \frac{M_x}{m} = \frac{1/6}{1/2} = \frac{1}{3}.$$

$\left(\frac{1}{3}, \frac{1}{3} \right)$

Resultado consistente con la propiedad geométrica de que el centroide de un triángulo se ubica en el tercio de la altura desde cada base.

Ejemplo 9.46 (Centroide de un semicírculo). Halle el centroide de la región semicircular $x^2 + y^2 \leq R^2$, $y \geq 0$.

Solución: **Paso 1: Simetría y área.** Por simetría respecto al eje y , $\bar{x} = 0$. El área es $A = \frac{\pi R^2}{2}$.



Paso 2: Momento M_x . Cada franja horizontal de anchura $2\sqrt{R^2 - x^2}$ contribuye; integrando con franjas verticales y usando $\frac{1}{2}[f(x)]^2$:

$$M_x = \frac{1}{2} \int_{-R}^R (R^2 - x^2) dx = \frac{1}{2} \left[R^2 x - \frac{x^3}{3} \right]_{-R}^R = \frac{1}{2} \cdot \frac{4R^3}{3} = \frac{2R^3}{3}.$$

Paso 3: Coordenada $\bar{y}$.

$$\bar{y} = \frac{M_x}{A} = \frac{2R^3/3}{\pi R^2/2} = \frac{2R^3}{3} \cdot \frac{2}{\pi R^2} = \boxed{\frac{4R}{3\pi}}.$$

9.5.3

Momento de inercia

Definición 9.47 (Momento de inercia de una lámina). El **momento de inercia** de una lámina de densidad ρ respecto a un eje mide su resistencia a la rotación. Para los ejes coordenados:

$$I_x = \rho \int_a^b \frac{[f(x)]^3}{3} dx, \quad I_y = \rho \int_a^b x^2 f(x) dx.$$

El **momento polar** respecto al origen es $I_0 = I_x + I_y$.


Observación 9.48. El momento de inercia aparece en:

- *Energía cinética rotacional:* $K = \frac{1}{2} I \omega^2$.
- *Segunda ley de Newton para rotación:* $\tau = I \alpha$.

A diferencia de la masa, el momento de inercia depende de cómo está distribuida la masa: puntos más lejanos al eje contribuyen más (factor r^2). Por ello, reducir I sin cambiar la masa (distribuyendo la masa más cerca del eje) mejora la eficiencia en sistemas rotativos.

Ejemplo 9.49 (Momento de inercia de una varilla (extremo)). Una varilla delgada de longitud L y masa M gira alrededor de uno de sus extremos. Calcule el momento de inercia I .

Solución: **Paso 1: Geometría y densidad lineal.** Situamos el eje de rotación en $x = 0$ y la varilla a lo largo de $x \in [0, L]$. La densidad lineal uniforme es $\lambda = M/L$.



Paso 2: Elemento diferencial. Un segmento de longitud dx a distancia x del eje tiene masa $dm = \lambda dx$, por lo que su contribución al momento de inercia es:

$$dI = x^2 dm = \frac{M}{L} x^2 dx.$$


Paso 3: Límites. $x \in [0, L]$.

Paso 4: Evaluación.

$$I = \int_0^L \frac{M}{L} x^2 dx = \frac{M}{L} \left[\frac{x^3}{3} \right]_0^L = \frac{M}{L} \cdot \frac{L^3}{3} = \boxed{\frac{1}{3}ML^2}.$$

Ejemplo 9.50 (Momento de inercia de una varilla (centro)). Calcule el momento de inercia de la misma varilla respecto a su centro.

Solución: **Paso 1: Sistema de coordenadas.** Situamos el origen en el centro de la varilla: $x \in [-L/2, L/2]$.



Paso 2: Evaluación.

$$I_{\text{centro}} = \int_{-L/2}^{L/2} \frac{M}{L} x^2 dx = \frac{M}{L} \left[\frac{x^3}{3} \right]_{-L/2}^{L/2} = \frac{M}{L} \cdot \frac{2}{3} \left(\frac{L}{2} \right)^3 = \frac{M}{L} \cdot \frac{L^3}{12} = \boxed{\frac{1}{12}ML^2}.$$

Verificación con el Teorema de Steiner. La distancia entre el eje del extremo y el eje del centro es $d = L/2$:

$$I_{\text{extremo}} = I_{\text{centro}} + Md^2 = \frac{1}{12}ML^2 + M\left(\frac{L}{2}\right)^2 = \frac{1}{12}ML^2 + \frac{1}{4}ML^2 = \frac{1}{3}ML^2,$$

lo que coincide con el resultado anterior e ilustra el **Teorema de Steiner** (ejes paralelos): $I = I_{\text{cm}} + Md^2$, donde d es la distancia entre los ejes.

9.6


Presión y fuerza hidrostática

Definición 9.51 (Fuerza hidrostática sobre una placa plana). La presión hidrostática a profundidad h en un fluido de densidad ρ es $P = \rho gh$. La fuerza total sobre una placa plana sumergida verticalmente, con anchura $w(h)$ a profundidad h , entre profundidades $h = a$ y $h = b$, es

$$F = \int_a^b \rho gh w(h) dh.$$

Ejemplo 9.52 (Fuerza hidrostática sobre una compuerta rectangular). Una compuerta rectangular de 4 m de ancho y 3 m de alto está sumergida verticalmente, con su borde superior a 2 m de la superficie del agua ($\rho = 1000 \text{ kg/m}^3$, $g = 9,8 \text{ m/s}^2$). Halle la fuerza hidrostática total sobre la compuerta.

Solución: **Paso 1: Geometría.** La compuerta ocupa profundidades $h \in [2, 5]$ m con anchura constante $w = 4$ m.



Paso 2: Elemento diferencial. La presión a profundidad h es $P(h) = \rho gh$. La fuerza sobre una franja horizontal de altura dh es:

$$dF = P(h) \cdot w \, dh = (1000)(9,8)(h)(4) \, dh = 39200 \, h \, dh \text{ (N)}.$$

Paso 3: Límites. $h \in [2, 5]$ m.

Paso 4: Evaluación.

$$\begin{aligned} F &= \int_2^5 39200 \, h \, dh = 39200 \left[\frac{h^2}{2} \right]_2^5 = 39200 \cdot \frac{5^2 - 2^2}{2} \\ &= 39200 \cdot \frac{25 - 4}{2} = 39200 \times 10,5 = \boxed{411600 \text{ N} \approx 411,6 \text{ kN}}. \end{aligned}$$

9.7

Problemas propuestos

Resuelva los siguientes problemas aplicando los protocolos establecidos en este capítulo. Revise cuidadosamente los ejemplos resueltos de cada tema antes de comenzar.

Problema 9.53. Calcule el área de la región delimitada por la gráfica de $f(x) = x^2$, el eje x y la recta vertical $x = 2$.

Problema 9.54. Determine el área bajo la curva $y = \sqrt{x}$ en el intervalo $[0, 4]$.

Problema 9.55. Encuentre el área de la región delimitada por $y = x^3 - x^2 - 6x$ y el eje x .

Problema 9.56. Encuentre el área de la región delimitada por las parábolas $y = x^2$ y $y = \sqrt{8x}$.

Problema 9.57. Determine el área de la región acotada por las gráficas de $f(x) = x^2 + 2x - 3$ y $g(x) = -x + 1$.

Problema 9.58. Calcule el área de la región encerrada entre $y = \sin x$ y $y = \frac{1}{2}$ para $0 \leq x \leq \frac{17\pi}{6}$.


Problema 9.59. Calcule el área de la región entre la parábola $y^2 = 4x$ y la recta $4x - 3y = 4$.

Problema 9.60. Encuentre el área de la región acotada por $x = 3 - y^2$ y $y = x - 1$.

Problema 9.61. Determine el área de la región acotada por $x = y^2$ y $x = y + 2$.

Problema 9.62. Considere la región R limitada por las curvas $y = x + 6$, $y = -x^2 - 6x - 6$ y $x = 0$. Plantee y evalúe la integral que permite calcular el área encerrada. Determine explícitamente los límites

de integración y el diferencial correspondiente.




Problema 9.63. Calcule el volumen del sólido generado al girar la región bajo $y = \sqrt{x}$ desde $x = 0$ hasta $x = 4$ alrededor del eje x (método de discos).

Problema 9.64. Determine el volumen del sólido de revolución obtenido al girar la región acotada por $y = \cos x$ y el eje x en $[0, \pi/2]$ alrededor del eje x .

Problema 9.65. Calcule el volumen del sólido generado al girar la región acotada por $y = x^2$ y $y^2 = 8x$ en torno al eje x (método de arandelas).

Problema 9.66. Use el método de los discos (o arandelas) para calcular el volumen del sólido de revolución generado al girar el área encerrada por $y = 2x + 4$, $y = -2x^2 - 4x$ y $x = 0$ respecto al eje x . Determine explícitamente los límites y el diferencial.



Problema 9.67. La región acotada por $y = x^2$ y $y = 4x$ se gira alrededor del eje x . Use el método de las arandelas para calcular su volumen.

Problema 9.68. Encuentre el volumen del sólido generado al girar la región semicircular $x = \sqrt{4 - y^2}$ alrededor de la recta $x = -1$.

Problema 9.69. Use el método de los cascarones cilíndricos para calcular el volumen del sólido generado al girar la región acotada por $y = 3 + 2x - x^2$ y $y = 0$ alrededor del eje y .

Problema 9.70. Determine el volumen del sólido obtenido al girar la región acotada por $y = x$, $y = 0$ y $x = 2$ alrededor del eje y .

Problema 9.71. Considere las funciones $f(x) = -x^2 + 4x - 3$ y $g(x) = x^2 - 6x + 9$.

1. Calcule el área entre las dos curvas.
2. Calcule el volumen del sólido de revolución al girar la región respecto al eje $y = 2$.
3. Calcule el volumen del sólido de revolución al girar la región respecto al eje $x = 3$.

Problema 9.72. Calcule el volumen del sólido generado al girar la región acotada por $y = e^{-x^2}$, $y = 0$, $x = 0$ y $x = 1$ alrededor del eje y .

Problema 9.73. Calcule la longitud de la curva $y = x^{3/2}$ desde el punto $(1, 1)$ hasta el punto $(4, 8)$.

Problema 9.74. Determine la longitud de arco de la curva $y = \ln(\cos x)$ desde $x = 0$ hasta $x = \pi/4$.

Problema 9.75. Encuentre el área de la superficie generada al girar la curva $y = \sqrt{x}$ para $0 \leq x \leq 4$ alrededor del eje x .

Problema 9.76. Demuestre que el área de la superficie de una esfera de radio r es $4\pi r^2$ mediante el giro de una semicircunferencia.

Problema 9.77. Un módulo espacial pesa 15 toneladas en la superficie terrestre. ¿Cuánto trabajo se requiere para propulsarlo a una altura de 800 millas? (Radio de la Tierra ≈ 4000 millas).

Problema 9.78. Un cable que pesa 2 libras por pie se usa para levantar una carga de 200 libras hasta la parte superior de un pozo que tiene 500 pies de profundidad. ¿Cuánto trabajo se realiza?

Problema 9.79. Un tanque tiene forma de cono circular recto invertido (altura 10 pies, radio de la base 4 pies). Si el tanque está lleno de agua, calcule el trabajo necesario para bombearla hasta el borde superior.

Problema 9.80. Se requieren 0,09 joules de trabajo para estirar un resorte desde 15 a 17 cm, y otros 0,10 joules para estirarlo de 17 a 20 cm. Determine la constante del resorte y encuentre su longitud natural.

Problema 9.81. Un tanque con forma de cono circular recto se usa para almacenar agua ($\rho = 997 \text{ kg/m}^3$). El tanque tiene altura 10 m y diámetro 16 m. Calcule el trabajo necesario para bombear el agua hasta una altura de 15 m por encima del borde.

Problema 9.82. Encuentre el centroide de la región acotada por las curvas $y = x^3$ y $y = \sqrt{x}$.

Problema 9.83. Determine el centro de masa de una lámina con densidad $\rho(x, y) = xy$ acotada por $y = x^{2/3}$, $x = 8$ y el eje x .

Problema 9.84. Encuentre el centroide del triángulo con vértices $(-a, 0)$, $(a, 0)$ y (b, c) .

Problema 9.85. Calcule el momento de inercia I_x de una lámina homogénea de densidad constante k acotada por $y = x^2$ y $y = 4$.

Problema 9.86. Determine el momento de inercia respecto al eje y de un alambre delgado con forma de semicircunferencia de radio a .

Problema 9.87. Una lámina de metal rectangular de 3×4 pies se sumerge verticalmente en agua a una profundidad de 6 pies (borde superior). Calcule la fuerza total ejercida por el fluido.

Problema 9.88. Una compuerta en un canal tiene forma de trapezoide (3 pies de ancho abajo, 5 pies arriba, 2 pies de alto). Calcule la fuerza hidrostática si el nivel del agua coincide con la parte superior.

Problema 9.89. Encuentre la fuerza de un fluido contra el extremo vertical de un depósito que tiene forma de región parabólica de 8 pies de ancho y 4 pies de profundidad.

Problema 9.90 (Desafío Putnam). Sea $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ una función continua. Se definen las siguientes integrales:

$$I(f) = \int_0^1 x^2 f(x) dx, \quad J(f) = \int_0^1 x [f(x)]^2 dx$$

Encuentre el valor máximo posible de la diferencia $I(f) - J(f)$ sobre todas las funciones f posibles.

Problema 9.91 (Geometría de Curvas). Considere la hipocicloide de cuatro cúspides definida por la ecuación: $x^{2/3} + y^{2/3} = 1$.

1. Use la derivación implícita para encontrar dy/dx .
2. Formule la integral de longitud de arco para el primer cuadrante. Observe que el integrando tiende a infinito cuando $x \rightarrow 0$.
3. Demuestre que el perímetro total de la figura es exactamente 6.

Problema 9.92 (Integrabilidad y Composición). Encuentre dos funciones f y g , ambas integrables en el intervalo $[0, 1]$, tales que su composición $g \circ f$ **no** sea integrable en dicho intervalo. *Sugerencia: Considere la función de Dirichlet y una modificación de la función de Thomae.*

Problema 9.93 (Aplicaciones de Densidad Variable). Una varilla tiene una densidad dada por $\delta(x) = e^{-x^2}$ para $x > 0$.

1. Formule la integral que representa la masa total desde $x = 0$ hasta un punto $x = a$.
2. Dado que la antiderivada de e^{-x^2} no es elemental, use el **método de bisección** o la **regla de Simpson** para determinar el punto de corte a tal que la masa sea exactamente igual a 1.

Capítulo

10

Integrales Impropias

En el marco del cálculo de Riemann, la integral definida $\int_a^b f(x) dx$ se construye sobre intervalos cerrados y acotados $[a, b]$. Sin embargo, el hilo conductor que conecta la geometría con el análisis nos invita a extender esta noción: si el área bajo una curva es la suma de infinitos rectángulos infinitesimales, ¿qué ocurre cuando la región de integración se prolonga indefinidamente hacia la derecha o hacia la izquierda? Para dar sentido matemático a fenómenos físicos, modelos probabilísticos y problemas de ingeniería donde el dominio no está acotado, introducimos el concepto de **integral impropia de primer tipo**.

Definición 10.1 (Integral impropia con límite infinito). Sea $f(x)$ una función continua en $[a, \infty)$. Definimos la integral impropia con límite superior infinito como el límite de integrales propias:

$$\int_a^\infty f(x) dx = \lim_{b \rightarrow \infty} \int_a^b f(x) dx.$$

De manera análoga, si el límite inferior es infinito:

$$\int_{-\infty}^b f(x) dx = \lim_{a \rightarrow -\infty} \int_a^b f(x) dx.$$

Si el intervalo es $(-\infty, \infty)$, la integral se define separando en un punto arbitrario c (frecuentemente $c = 0$):

$$\int_{-\infty}^\infty f(x) dx = \int_{-\infty}^c f(x) dx + \int_c^\infty f(x) dx.$$

Teorema 10.2 (Criterio de convergencia). Las integrales impropias de límite infinito **convergen** si y solo si los límites involucrados en su definición existen y son números reales finitos. Si el límite es $\pm\infty$ o no existe, se dice que la integral **diverge**.

Demostración. La integral propia $\int_a^b f(x) dx$ define una función continua de b . El límite $\lim_{b \rightarrow \infty}$ existe si y solo si la sucesión de sumas de Riemann parciales está acotada y tiende a un valor finito. La divergencia ocurre cuando el crecimiento acumulado del área supera cualquier cota finita, o cuando hay oscilaciones no amortiguadas que impiden la existencia del límite. $\square$

Observación 10.3. Es importante tener en cuenta algunas observaciones básicas:

- **Jerarquía de crecimiento:** Las funciones exponenciales con exponente negativo (e^{-kx} , $k > 0$) decaen mucho más rápido que cualquier función racional $1/x^p$. Esto garantiza la convergencia de integrales como $\int_0^\infty x^n e^{-x} dx$.
- **Criterio p para límites infinitos:** $\int_1^\infty \frac{dx}{x^p}$ converge $\iff p > 1$.


- **Error frecuente:** No evalúe directamente $F(\infty) - F(a)$. Siempre plantee el límite formal. La expresión $\infty - \infty$ es una forma indeterminada que requiere tratamiento analítico riguroso; en particular, aplique la regla de L'Hôpital o la jerarquía de crecimiento antes de concluir.

A continuación ilustramos el procedimiento paso a paso, desde el caso más sencillo hasta el que involucra límites en ambos extremos.

Ejemplo 10.4 (Área bajo una campana exponencial decreciente). Calcule el valor de la integral impropia $\int_0^\infty x e^{-x} dx$.

Solución: Paso 1: Análisis gráfico y región.

La función $f(x) = x e^{-x}$ es positiva para $x > 0$, parte del origen, alcanza su máximo en $x = 1$ (pues $f'(x) = e^{-x}(1 - x) = 0 \Rightarrow x = 1$, con $f(1) = e^{-1}$) y decae asintóticamente a 0 cuando $x \rightarrow \infty$. La región de integración es el área infinita bajo la curva desde $x = 0$ hacia la derecha; visualizamos el límite superior b como una **frontera móvil** que avanza indefinidamente.



Paso 2: Elemento diferencial. Considerando franjas verticales de altura $f(x)$ y base dx :

$$dA = x e^{-x} dx.$$

Paso 3: Límites de integración. El intervalo de integración es $[0, b]$; se toma el límite $b \rightarrow \infty$ para barrer toda la región.

Paso 4: Evaluación. Aplicamos integración por partes con $u = x$ y $dv = e^{-x} dx$, lo que da $du = dx$ y $v = -e^{-x}$:

$$\begin{aligned} \int_0^b x e^{-x} dx &= \left[-x e^{-x} \right]_0^b + \int_0^b e^{-x} dx \\ &= (-b e^{-b} + 0) + \left[-e^{-x} \right]_0^b \\ &= -b e^{-b} - e^{-b} + 1 = 1 - e^{-b}(b + 1). \end{aligned}$$

Tomando el límite (la forma ∞/∞ se resuelve con L'Hôpital):


$$\lim_{b \rightarrow \infty} [1 - e^{-b}(b + 1)] = 1 - \lim_{b \rightarrow \infty} \frac{b + 1}{e^b} \stackrel{\text{L'H}}{=} 1 - \lim_{b \rightarrow \infty} \frac{1}{e^b} = 1 - 0 = 1.$$

$$\int_0^\infty x e^{-x} dx = 1.$$

Ejemplo 10.5 (Integral con límites infinitos en ambos extremos). Determine si $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx}{1+x^2}$ converge y, en caso afirmativo, calcule su valor.

Solución: **Paso 1: Análisis gráfico y región.**

La función $f(x) = \frac{1}{1+x^2}$ es **par**, positiva en todo $\mathbb{R}$, alcanza su máximo $f(0) = 1$ y posee asíntota horizontal $y = 0$. La región bajo la curva se extiende infinitamente a ambos lados del eje y .



Paso 2: Elemento diferencial.

$$dA = \frac{dx}{1+x^2}.$$

Paso 3: Límites de integración. Separamos en $c = 0$ para manejar los dos infinitos de forma independiente:

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx}{1+x^2} = \int_{-\infty}^0 \frac{dx}{1+x^2} + \int_0^{\infty} \frac{dx}{1+x^2}.$$

Paso 4: Evaluación. Usando $\int \frac{dx}{1+x^2} = \arctan(x) + C$:

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx}{1+x^2} &= \lim_{a \rightarrow -\infty} \left[\arctan x \right]_a^0 + \lim_{b \rightarrow \infty} \left[\arctan x \right]_0^b \\ &= \left(0 - \left(-\frac{\pi}{2} \right) \right) + \left(\frac{\pi}{2} - 0 \right) = \frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{2}. \end{aligned}$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx}{1+x^2} = \pi.$$

10.1

Funciones de densidad de probabilidad

El hilo conductor entre el cálculo integral y la estadística reside en la interpretación geométrica del área: mientras que en geometría el área representa una magnitud espacial, en probabilidad representa

la **certeza total**. Las variables aleatorias continuas, como la vida útil de un componente electrónico o la resistencia de un material, modelan sus distribuciones mediante funciones no negativas cuya área total bajo la curva debe ser exactamente 1. Toda integral que aparezca en este marco es, en esencia, una integral impropia de primer tipo.

Definición 10.6 (Función de densidad de probabilidad). Una función $f(x)$ es una **función de densidad de probabilidad** (FDP) para una variable aleatoria continua X si satisface:

- 1. $f(x) \geq 0$ para todo $x \in \mathbb{R}$.
- 2. $\int_{-\infty}^{\infty} f(x) \, dx = 1$.

La probabilidad de que X tome valores en el intervalo $[a, b]$ es:

$$P(a \leq X \leq b) = \int_a^b f(x) \, dx.$$

Observación 10.7. Antes de utilizar una función como FDP, realice siempre las siguientes comprobaciones:

- 1. **no negatividad:** Compruebe analíticamente que $f(x) \geq 0$ en todo su dominio. Basta con inspeccionar el signo del numerador y del denominador.
- 2. **normalización:** Calcule $\int_{-\infty}^{\infty} f(x) \, dx$. Si el resultado es 1, la función es válida. Si es una constante $C \neq 1$, multiplique por $1/C$ para obtener la FDP normalizada.
- 3. **Advertencia fundamental:** $f(x)$ **no** es una probabilidad puntual; puede tomar valores mayores que 1. Solo la integral $\int_a^b f(x) \, dx$ tiene significado probabilístico. En particular, $P(X = c) = 0$ para todo valor fijo c , pues la integral sobre un conjunto de medida cero es cero.


Ejemplo 10.8 (Determinación de la constante de normalización). Encuentre el valor de la constante $k > 0$ para que la función

$$f(x) = \begin{cases} ke^{-3x} & x \geq 0 \\ 0 & x < 0 \end{cases}$$

sea una función de densidad de probabilidad. Luego, dibuje la función resultante.

Solución: Paso 1: Análisis gráfico y región.

Para cualquier $k > 0$, la función ke^{-3x} es positiva y estrictamente decreciente sobre $[0, \infty)$, por lo que la Verificación 1 se cumple automáticamente. La condición de normalización (Verificación 2) es la ecuación que determina k : exigimos que el área total bajo la curva sea exactamente 1.



Teorema 10.9 (Media y varianza de una variable aleatoria continua). La **media** μ (valor esperado) y la **varianza** σ^2 de una variable aleatoria continua con FDP $f(x)$ se definen como:

$$\mu = E(X) = \int_{-\infty}^\infty x f(x) dx, \quad \sigma^2 = V(X) = \int_{-\infty}^\infty (x - \mu)^2 f(x) dx.$$

Existe además la **fórmula computacional**: $\sigma^2 = E(X^2) - [E(X)]^2$.

Demostración. Aplicando la linealidad de la esperanza a $g(X) = (X - \mu)^2$ y expandiendo el cuadrado:

$$\begin{aligned} \sigma^2 &= E[(X - \mu)^2] = E[X^2 - 2\mu X + \mu^2] \\ &= E(X^2) - 2\mu E(X) + \mu^2 = E(X^2) - 2\mu^2 + \mu^2 = E(X^2) - \mu^2. \end{aligned}$$

La convergencia de estas integrales está garantizada si los momentos de orden 1 y 2 son finitos. □

Observación 10.10. La Interpretación geométrica y estadística de estas integrales son:

- **Centro de masa:** μ actúa como el punto de equilibrio (centro de gravedad) de la distribución. Si la FDP es simétrica respecto a $x = \mu$, la media coincide con el eje de simetría.
- **Dispersión:** σ^2 cuantifica la «anchura» de la distribución. Una σ^2 pequeña indica alta concentración alrededor de μ ; una grande indica alta dispersión.

- **Preferencia computacional:** Use siempre $\sigma^2 = E(X^2) - \mu^2$ para cálculos algebraicos; evita desarrollar el cuadrado $(x - \mu)^2$ bajo el signo integral, lo que simplifica notablemente la integración por partes.


Ejemplo 10.11 (Distribución exponencial: vida útil de un sensor). La vida útil X (en miles de horas) de un sensor de presión sigue la FDP

$$f(x) = \begin{cases} 2e^{-2x} & x \geq 0 \\ 0 & x < 0. \end{cases}$$

- (a) Calcule la probabilidad de que el sensor falle antes de las 500 horas ($X < 0,5$).
- (b) Determine la vida útil media μ y la varianza σ^2 .

Solución: Paso 1: Análisis gráfico y región.

La función parte de $f(0) = 2$, decrece exponencialmente y tiende a 0. La región azul representa $P(X < 0,5)$; la totalidad del área bajo la curva es 1.



Paso 2: Elemento diferencial.

$$dP = f(x) \, dx = 2e^{-2x} \, dx.$$

Paso 3: Límites de integración.

- (a) Probabilidad: intervalo $[0, 0,5]$.
- (b) Media: $\int_0^\infty x \cdot 2e^{-2x} \, dx$. Segundo momento: $\int_0^\infty x^2 \cdot 2e^{-2x} \, dx$.

Paso 4: Evaluación.

(a) Probabilidad de falla temprana:

$$P(X < 0,5) = \int_0^{0,5} 2e^{-2x} \, dx = \left[-e^{-2x}\right]_0^{0,5} = -e^{-1} + e^0 = 1 - e^{-1}.$$

(b) Media (por partes: $u = x$, $dv = 2e^{-2x} \, dx \Rightarrow v = -e^{-2x}$):

$$\mu = \int_0^\infty x \cdot 2e^{-2x} \, dx = \left[-xe^{-2x}\right]_0^\infty + \int_0^\infty e^{-2x} \, dx = 0 + \left[-\frac{1}{2}e^{-2x}\right]_0^\infty = \frac{1}{2}.$$

Segundo momento (por partes dos veces, con $u = x^2$, $dv = 2e^{-2x} \, dx$):

$$E(X^2) = \int_0^\infty x^2 \cdot 2e^{-2x} \, dx = \left[-x^2e^{-2x}\right]_0^\infty + \int_0^\infty 2xe^{-2x} \, dx = 0 + \frac{1}{2} = \frac{1}{2}.$$

Varianza (fórmula computacional):

$$\sigma^2 = E(X^2) - \mu^2 = \frac{1}{2} - \frac{1}{4} = \frac{1}{4}.$$

$$P(X < 0,5) = 1 - e^{-1} \approx 0,6321, \quad \mu = \frac{1}{2} \text{ (mil horas)}, \quad \sigma^2 = \frac{1}{4}.$$

10.2

Integrandos no acotados y discontinuidades

Hasta ahora hemos extendido los *límites* de integración hacia el infinito. Ahora abordaremos la segunda clase de integrales impropias: aquellas donde la función $f(x)$ **no está acotada** dentro del intervalo de integración. **El hilo conductor** aquí es la ruptura del Teorema Fundamental del Cálculo (TFC): el TFC requiere continuidad de f en $[a, b]$. Si f tiende a infinito en un extremo o en un punto interior, las sumas de Riemann pueden diverger o requerir un tratamiento por límites laterales.

Definición 10.12 (Integral impropia de tipo II). Sea f continua en $[a, b)$ con $\lim_{x \rightarrow b^-} |f(x)| = \infty$. Definimos:

$$\int_a^b f(x) \, dx = \lim_{t \rightarrow b^-} \int_a^t f(x) \, dx.$$

Si la discontinuidad está en el extremo izquierdo $x = a$:

$$\int_a^b f(x) \, dx = \lim_{t \rightarrow a^+} \int_t^b f(x) \, dx.$$

Teorema 10.13 (Convergencia con discontinuidad interior). Si f tiene una discontinuidad infinita en $c \in (a, b)$, entonces:

$$\int_a^b f(x) \, dx = \int_a^c f(x) \, dx + \int_c^b f(x) \, dx,$$

y la integral total converge si y solo si **ambas** integrales del lado derecho convergen.

Demostración. Por la aditividad del intervalo de integración y la independencia de los límites laterales $t \rightarrow c^-$ y $s \rightarrow c^+$. Si uno de ellos diverge, la suma no puede asignarse un valor finito, destruyendo la definición de convergencia. □


Observación 10.14. Al intentar resolver cualquier tipo de integral, debe seguirse el siguiente protocolo de verificación antes de aplicar el TFC

1. Antes de escribir $F(b) - F(a)$, verifique si $f(x)$ tiene **asíntotas verticales** en $[a, b]$. Busque los ceros del denominador y los puntos donde el exponente es negativo.
2. **Criterio p para integrandos infinitos:** $\int_0^1 \frac{dx}{x^p}$ converge $\iff p < 1$. **Note la inversión** respecto al criterio de límites infinitos.
3. **Trampa clásica:** $\int_{-1}^1 \frac{dx}{x^2} \neq -2$. La función es positiva; obtener un resultado negativo o finito sin plantear el límite en $x = 0$ indica aplicación incorrecta del TFC.

Ejemplo 10.15 (Discontinuidad en el extremo inferior). Analice la convergencia de $\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{x}}$.

Solución: Paso 1: Análisis gráfico y región.

La función $f(x) = x^{-1/2}$ crece sin cota cuando $x \rightarrow 0^+$, pero decrece rápidamente. La región es infinita en *altura* pero confinada horizontalmente al intervalo $(0, 1]$; la intuición visual sugiere que el área podría ser finita porque la función cae muy rápido.



Paso 2: Elemento diferencial.

$$dA = x^{-1/2} dx.$$

Paso 3: Límites de integración. El punto problemático es $x = 0$. Introducimos $t \rightarrow 0^+$ e integramos sobre $[t, 1]$.

Paso 4: Evaluación.


$$\int_0^1 x^{-1/2} dx = \lim_{t \rightarrow 0^+} \int_t^1 x^{-1/2} dx = \lim_{t \rightarrow 0^+} \left[2\sqrt{x} \right]_t^1 = \lim_{t \rightarrow 0^+} (2 - 2\sqrt{t}) = 2.$$

$$\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{x}} = 2 \quad (\text{converge}).$$

Ejemplo 10.16 (Discontinuidad en un punto interior). Evalúe, si converge, $\int_0^3 \frac{dx}{(x-1)^{2/3}}$.

Solución: Paso 1: Análisis gráfico y región.

El denominador se anula en $x = 1 \in (0, 3)$; allí $f(x) \rightarrow +\infty$. La función es positiva a ambos lados de $x = 1$ y exhibe una **cúspide vertical asintótica**. Es *obligatorio* separar la integral en $[0, 1)$ y $(1, 3]$; de lo contrario se aplica el TFC a una función discontinua y se obtiene un valor erróneo.



Paso 2: Elemento diferencial.

$$dA = (x - 1)^{-2/3} dx.$$

Paso 3: Límites de integración. Usando $t \rightarrow 1^-$ y $s \rightarrow 1^+$:

$$\int_0^3 (x - 1)^{-2/3} dx = \lim_{t \rightarrow 1^-} \int_0^t (x - 1)^{-2/3} dx + \lim_{s \rightarrow 1^+} \int_s^3 (x - 1)^{-2/3} dx.$$

Paso 4: Evaluación. Recordando $\int (x - 1)^{-2/3} dx = 3(x - 1)^{1/3} + C$ (con $(x - 1)^{1/3}$ para $x < 1$ interpretado como $-|x - 1|^{1/3}$):

$$\lim_{t \rightarrow 1^-} \left[3(x - 1)^{1/3} \right]_0^t = \lim_{t \rightarrow 1^-} (3(t - 1)^{1/3} - 3(-1)^{1/3}) = 0 - (-3) = 3.$$
$$\lim_{s \rightarrow 1^+} \left[3(x - 1)^{1/3} \right]_s^3 = \lim_{s \rightarrow 1^+} (3 \cdot 2^{1/3} - 3(s - 1)^{1/3}) = 3\sqrt[3]{2} - 0 = 3\sqrt[3]{2}.$$

Ambos límites son finitos, por lo tanto la integral **converge** y:

$$\int_0^3 \frac{dx}{(x - 1)^{2/3}} = 3 + 3\sqrt[3]{2} \approx 6,78.$$

10.3

La paradoja de la trompeta de Gabriel

Una de las aplicaciones más fascinantes del cálculo integral surge al combinar sólidos de revolución con integrales impropias. La **trompeta de Gabriel** se genera al rotar la curva $y = 1/x$ para $x \geq 1$ alrededor del eje x . Esta figura desafía la intuición geométrica clásica: su volumen es **finito**, pero su área superficial es **infinita**.

Observación 10.17 (Resolución de la paradoja). *La aparente contradicción se resuelve analizando la velocidad de decaimiento de cada integrando:*


- **Volumen:** el integrando es π/x^2 , con $p = 2 > 1$, por lo que $\int_1^\infty x^{-2} dx$ converge.
- **Superficie:** el integrando es esencialmente $2\pi/x$, con $p = 1$, por lo que $\int_1^\infty x^{-1} dx$ diverge.

La paradoja surge de intentar aplicar intuición física de «grosor uniforme» a un objeto matemático abstracto. En el modelo teórico, «llenar» la trompeta equivale a adelgazar la pintura exactamente como $1/x^2$ a medida que $x \rightarrow \infty$, lo cual es perfectamente consistente.

Ejemplo 10.18 (Volumen finito y área superficial infinita de la trompeta). Demuestre que el volumen de la trompeta de Gabriel es $V = \pi$ (finito), pero que su área superficial es infinita.

Solución: Paso 1: Análisis gráfico y región.

La curva $y = 1/x$ rota alrededor del eje x para $x \geq 1$. Los discos perpendiculares al eje tienen radio $R(x) = 1/x$. La región generatriz es el área entre la curva, el eje x y la recta $x = 1$.



Paso 2: Elemento diferencial.

- **Volumen** (método del disco): $dV = \pi[R(x)]^2 dx = \pi x^{-2} dx$.
- **Superficie** (fórmula de área de superficie de revolución, con $f'(x) = -x^{-2}$): $dS = 2\pi f(x)\sqrt{1 + [f'(x)]^2} dx = \frac{2\pi}{x}\sqrt{1 + \frac{1}{x^4}} dx$.

Paso 3: Límites de integración. Ambas integrales se evalúan sobre $[1, \infty)$.

Paso 4: Evaluación.

Volumen:

$$V = \pi \int_1^\infty x^{-2} dx = \pi \lim_{b \rightarrow \infty} \left[-x^{-1}\right]_1^b = \pi \lim_{b \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{b}\right) = \pi.$$

Superficie (criterio de comparación directa, usando que $\sqrt{1 + x^{-4}} > 1$ para todo $x \geq 1$):

$$A = 2\pi \int_1^\infty \frac{\sqrt{1 + x^{-4}}}{x} dx > 2\pi \int_1^\infty \frac{dx}{x} = 2\pi \lim_{b \rightarrow \infty} [\ln x]_1^b = +\infty.$$

Por el criterio de comparación directa, la integral del área **diverge**. Concluimos:

$V = \pi$ (finito)

y

$A = +\infty$ (diverge).

10.4

Problemas Propuestos

Recuerde aplicar los criterios de convergencia y las definiciones de límite estudiadas en clase para justificar la existencia de cada valor en las integrales impropias. En todos los casos, el desarrollo analítico completo constituye parte esencial de la solución.

Problema 10.19. Determine si las siguientes integrales impropias de Tipo I (con al menos un límite de integración infinito) convergen o divergen. En caso de convergencia, calcule su valor exacto.

1.
$$\int_0^{\infty} \frac{dx}{1+x^2}$$

2.
$$\int_{-\infty}^0 e^{3x} dx$$

3.
$$\int_0^{\infty} xe^{-x} dx$$

4.
$$\int_1^{\infty} \frac{\ln x}{x} dx$$

5.
$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{x}{x^2+1} dx$$

6.
$$\int_0^{\infty} \frac{e^x}{e^{2x}+1} dx$$

Problema 10.20. Evalúe cada una de las siguientes integrales impropias, o demuestre que divergen.

1.
$$\int_1^{\infty} \frac{1}{x^3} dx$$

2.
$$\int_0^{\infty} e^{-2x} dx$$

3.
$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{x^2+4} dx$$

4.
$$\int_0^{\infty} x^2 e^{-x} dx$$

5.
$$\int_2^{\infty} \frac{1}{x \ln x} dx$$

6.
$$\int_0^{\infty} \cos x dx$$

Problema 10.21. Determine si la siguiente integral converge y, de ser así, encuentre su valor exacto:

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^x}{1+e^{2x}} dx.$$

Sugerencia: divida la integral en los intervalos $(-\infty, 0]$ y $[0, +\infty)$, y utilice la sustitución $u = e^x$ en cada parte.

Problema 10.22. Analice la convergencia de las siguientes integrales impropias de Tipo II, cuyo integrando presenta una discontinuidad infinita en uno o ambos extremos del intervalo de integración. Si la integral converge, determine su valor exacto.

1.
$$\int_0^{16} \frac{1}{\sqrt{x}} dx$$

- 2. $\int_0^1 \ln x \, dx$
- 3. $\int_0^2 \frac{dx}{\sqrt{4-x^2}}$
- 4. $\int_0^{\pi/2} \tan x \, dx$
- 5. $\int_1^e \frac{dx}{x\sqrt{\ln x}}$
- 6. $\int_0^1 \frac{x}{\sqrt{1-x^2}} \, dx$

Problema 10.23. Evalúe las siguientes integrales impropias, en las cuales el integrando presenta una discontinuidad infinita en un punto interior c del intervalo $[a, b]$ (con $a < c < b$), o demuestre que divergen.

- 1. $\int_0^3 \frac{dx}{(x-1)^{2/3}}$
- 2. $\int_0^2 \frac{dx}{x-1}$
- 3. $\int_{-3}^3 \frac{x}{\sqrt{9-x^2}} \, dx$
- 4. $\int_{-1}^2 \frac{1}{x^3} \, dx$
- 5. $\int_{-1}^1 \frac{1}{\sqrt{|x|}} \, dx$

Problema 10.24. La siguiente integral es impropia por dos razones simultáneas: el integrando presenta una singularidad en $x = 0$ y el intervalo de integración no está acotado. Descomponga el intervalo en $x = 1$, justifique la convergencia de cada parte por separado mediante la evaluación del límite correspondiente y, si ambas subintegrales convergen, determine el valor exacto de la integral completa:

$$\int_0^\infty \frac{dx}{\sqrt{x}(1+x)}.$$

Problema 10.25. Analice la convergencia de la siguiente integral, que es impropia tanto por la singularidad del integrando en $x = 0$ como por el límite superior de integración infinito. Descomponga el intervalo en $x = 1$, estudie cada parte por separado y, si ambas convergen, calcule el valor exacto:

$$\int_0^\infty x^{-1/3} e^{-x} \, dx.$$

Problema 10.26. Considere la integral

$$\int_0^\infty \frac{\ln x}{1+x^2} \, dx.$$

- 1. Identifique con precisión las dos fuentes de impropiedad de esta integral.
- 2. Descomponga el dominio en $x = 1$ y estudie la convergencia de cada parte por separado.
- 3. Utilice la sustitución $x = 1/t$ en la integral sobre $(0, 1]$ para demostrar que esa parte es el negativo de la integral sobre $[1, \infty)$ y concluya el valor de la integral completa.

Problema 10.27. Considere la integral de tipo p definida sobre un intervalo no acotado. Demuestre formalmente, mediante la evaluación explícita del límite correspondiente, que la integral

$$\int_1^\infty \frac{1}{x^p} \, dx$$

1. diverge si $p \leq 1$, y
2. converge si $p > 1$; en este caso, determine su valor exacto en función del parámetro p .

Problema 10.28. De manera análoga al problema anterior, demuestre formalmente que la integral

$$\int_0^1 \frac{1}{x^p} dx$$

1. converge si $p < 1$; en este caso, calcule su valor exacto en función de p , y
2. diverge si $p \geq 1$.

Problema 10.29. Utilice el Teorema de Comparación Directa o el Teorema de Comparación en el Límite para determinar la convergencia o divergencia de cada integral. No es necesario calcular el valor exacto; es suficiente identificar con precisión la función de comparación y justificar rigurosamente la conclusión.

1. $\int_1^\infty e^{-x^2} dx$
2. $\int_1^\infty \frac{\sin^2 x}{x^2} dx$
3. $\int_2^\infty \frac{dx}{\sqrt{x^4 - 1}}$
4. $\int_1^\infty \frac{x + 1}{\sqrt{x^4 + x}} dx$
5. $\int_1^\infty \frac{\arctan x}{1 + x^2} dx$

Problema 10.30. Para cada una de las siguientes integrales, determine si converge o diverge. Justifique su respuesta mediante un criterio de comparación apropiado, identificando explícitamente la función auxiliar utilizada y verificando las hipótesis del criterio elegido.

1. $\int_0^1 \frac{\sin x}{x^{3/2}} dx$
2. $\int_1^\infty \frac{x^2 + 1}{x^4 + x^2 + 1} dx$
3. $\int_1^\infty \frac{\ln x}{x^{3/2}} dx$
4. $\int_0^1 \frac{e^x - 1}{x^{1/2}} dx$
5. $\int_2^\infty \frac{1}{\ln x} dx$

Problema 10.31 (Función Gamma). La función Gamma se define para $n > 0$ como:

$$\Gamma(n) = \int_0^\infty x^{n-1} e^{-x} dx.$$

1. Use integración por partes para demostrar la relación de recurrencia $\Gamma(n + 1) = n \Gamma(n)$.
2. Deduzca que si n es un entero positivo, entonces $\Gamma(n) = (n - 1)!$
3. Calcule explícitamente $\Gamma(1)$, $\Gamma(2)$ y $\Gamma(3)$.

Problema 10.32 (Probabilidad). Sea X una variable aleatoria continua con función de densidad de probabilidad

$$f(x) = \begin{cases} 0,01 e^{-0,01x} & \text{si } x \geq 0, \\ 0 & \text{si } x < 0. \end{cases}$$

1. Verifique que f es efectivamente una función de densidad de probabilidad, es decir, que $\int_{-\infty}^{\infty} f(x) \, dx = 1$.
2. Calcule $P(X > 20)$ mediante la evaluación de la integral impropia pertinente.
3. Determine el valor esperado $E[X] = \int_0^{\infty} x f(x) \, dx$.

Problema 10.33 (Geometría Analítica). El piloto de un automóvil de carreras recorre una pista elíptica modelada por la ecuación

$$\frac{x^2}{400} + \frac{y^2}{100} = 1.$$

Al perder el control en el punto $(16, 6)$, el vehículo continúa en línea recta sobre la recta tangente a la elipse en ese punto.

1. Verifique que el punto $(16, 6)$ pertenece a la elipse.
2. Determine la ecuación de la recta tangente a la elipse en dicho punto.
3. Si el automóvil impacta contra un árbol ubicado en la coordenada $(14, k)$, determine el valor exacto de la constante k .

Problema 10.34 (Longitud de arco). La longitud de arco de una curva $y = f(x)$ sobre el intervalo $[a, b]$ está dada por la integral

$$L = \int_a^b \sqrt{1 + [f'(x)]^2} \, dx.$$

1. Muestre que la longitud de la curva $y = \sqrt{1 - x^2}$ sobre $[0, 1)$ está dada por una integral impropia de Tipo II y evalúe dicha integral.
2. Interprete geoméricamente el resultado obtenido.

Problema 10.35 (Física — Trabajo gravitacional). La fuerza de atracción gravitacional entre la Tierra (masa M) y un objeto de masa m situado a una distancia r de su centro es

$$F(r) = \frac{GMm}{r^2},$$

donde G es la constante de gravitación universal y R denota el radio de la Tierra.

1. Plantee la integral impropia que representa el trabajo necesario para trasladar el objeto desde la superficie terrestre ($r = R$) hasta el infinito.
2. Evalúe dicha integral y exprese el resultado en términos de G , M , m y R .
3. Explique por qué la convergencia de esta integral implica que existe una velocidad de escape finita.

Capítulo

11

Curvas Paramétricas y Coordenadas Polares

En el estudio clásico del cálculo, solemos representar funciones mediante ecuaciones explícitas $y = f(x)$ o implícitas $F(x, y) = 0$. Sin embargo, muchas trayectorias físicas y curvas geométricas se describen de manera más natural mediante un **parámetro** independiente, frecuentemente el tiempo t . El hilo conductor que une la geometría con el análisis nos dice que, al variar un parámetro continuo, las sumas de Riemann sobre la trayectoria permiten cuantificar longitudes y áreas sin depender de una proyección vertical u horizontal única.

11.1

Representación Paramétrica de Curvas

Definición 11.1 (Curva plana paramétrica). Una **curva plana** queda determinada por un par de funciones continuas $x = f(t)$ e $y = g(t)$ definidas en un intervalo I , generalmente cerrado $[a, b]$. El conjunto de puntos $P(t) = (f(t), g(t))$ traza la trayectoria conforme t avanza. Las siguientes son sus propiedades fundamentales:

1. **Puntos extremos:** $P(a)$ es el punto inicial y $P(b)$ el punto final.
2. **Curva cerrada:** si $P(a) = P(b)$.
3. **Curva simple:** si $P(t_1) \neq P(t_2)$ para todo $t_1 \neq t_2$ en (a, b) (sin autointersecciones).
4. **Orientación:** indica el sentido de recorrido al aumentar t , usualmente marcada con flechas.

Observación 11.2. Una forma de identificar cómo es la curva determinada de manera paramétrica es

1. **Eliminación del parámetro:** Para identificar la naturaleza geométrica, despeje t de una ecuación y sustitúyalo en la otra. Esto transforma la descripción paramétrica en una ecuación cartesiana $y = h(x)$ o $G(x, y) = 0$.
2. **Dominio implícito:** Al eliminar t , recuerde restringir el dominio cartesiano a los valores reales que $x(t)$ e $y(t)$ realmente toman en I . Una parábola completa en el plano cartesiano podría corresponder solo a un arco en la representación paramétrica.
3. **Error frecuente:** No confunda la curva (conjunto geométrico de puntos) con la parametrización (función que recorre dicha curva). Un mismo conjunto puede admitir infinitas parametrizaciones con distintas velocidades y orientaciones.

11.2

Cálculo para Curvas Definidas Paramétricamente

Si f y g son diferenciables y $dx/dt \neq 0$, la regla de la cadena permite calcular la pendiente de la curva sin eliminar el parámetro.

Teorema 11.3 (Derivada paramétrica). *La pendiente de la recta tangente a una curva paramétrica suave en un punto dado es:*

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy/dt}{dx/dt} = \frac{g'(t)}{f'(t)}, \quad \text{siempre que } f'(t) \neq 0.$$


Demostración. Por la regla de la cadena, $dy = (dy/dt) dt$ y $dx = (dx/dt) dt$. Dividiendo ambos diferenciales se obtiene $dy/dx = (dy/dt)/(dx/dt)$, lo que representa el límite del cociente incremental de las coordenadas cuando $\Delta t \rightarrow 0$. La condición $f'(t) \neq 0$ garantiza que no haya tangentes verticales en el punto evaluado. □

Observación 11.4. *Para estudiar las características de la función observe que:*

- 1. **Tangente horizontal:** ocurre cuando $g'(t) = 0$ y $f'(t) \neq 0$.
- 2. **Tangente vertical:** ocurre cuando $f'(t) = 0$ y $g'(t) \neq 0$.
- 3. **Segunda derivada paramétrica:** $\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{d}{dt}\left(\frac{dy}{dx}\right) / f'(t)$. Permite estudiar la concavidad sin abandonar el parámetro.

Ejemplo 11.5 (Tangente a una curva paramétrica). Halle la ecuación de la recta tangente a la curva $x = t^2$, $y = t^3 - 3t$ en el punto correspondiente a $t = 2$.

Solución:
Paso 1: Análisis gráfico y región. La curva es una cúbica que se autointersecta (en cartesianas, $y^2 = x(x - 3)^2$ admite dos ramas). Para $t = 2$ se obtiene el punto de tangencia $(4, 2)$. La recta tangente tiene pendiente $m = 9/4$ y pasa por dicho punto, con ecuación $y = \frac{9}{4}x - 7$.



Paso 2: Derivadas paramétricas. Derivando respecto a t :

$$\frac{dx}{dt} = 2t, \quad \frac{dy}{dt} = 3t^2 - 3.$$

Por el teorema de la derivada paramétrica:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{3t^2 - 3}{2t}.$$

Paso 3: Pendiente en $t = 2$.

$$\left.\frac{dy}{dx}\right|_{t=2} = \frac{3(2)^2 - 3}{2(2)} = \frac{12 - 3}{4} = \frac{9}{4}.$$

Paso 4: Evaluación. Con punto $(4, 2)$ y pendiente $m = 9/4$, la ecuación punto-pendiente da:

$$\begin{aligned} y - 2 &= \frac{9}{4}(x - 4) \\ y &= \frac{9}{4}x - 9 + 2 = \frac{9}{4}x - 7. \end{aligned}$$

$$y = \frac{9}{4}x - 7$$

Ejemplo 11.6 (Eliminación del parámetro y área bajo el arco). Considere las ecuaciones paramétricas $x = t^2 + 2t$, $y = t - 3$ para $-2 \leq t \leq 2$. Elimine el parámetro y calcule el área bajo el arco trazado respecto al eje x .

Solución:


Paso 1: Análisis gráfico y región. Despejando $t = y + 3$ y sustituyendo en x :

$$x = (y + 3)^2 + 2(y + 3) = y^2 + 8y + 15.$$

Completando el cuadrado: $x + 1 = (y + 4)^2$. Es una **parábola horizontal** con vértice en $(-1, -4)$ que abre hacia la derecha. Evaluamos los extremos del arco:

$$t = -2 : x = 0, y = -5 \Rightarrow P_0 = (0, -5); \quad t = 2 : x = 8, y = -1 \Rightarrow P_1 = (8, -1).$$

Toda la curva queda *por debajo* del eje x , por lo que el área calculada tendrá signo negativo y tomaremos su valor absoluto al final.



Paso 2: Elemento diferencial. El área (con signo) bajo la curva paramétrica es $dA = y \, dx$. Sustituyendo $y(t) = t - 3$ y $dx = x'(t) \, dt = (2t + 2) \, dt$:

$$dA = (t - 3)(2t + 2) \, dt = (2t^2 - 4t - 6) \, dt.$$

Paso 3: Límites de integración. Los extremos del arco corresponden a $t = -2$ (P_0) y $t = 2$ (P_1). Como $x'(t) = 2t + 2 > 0$ para $t > -1$, la curva se recorre de izquierda a derecha al aumentar t , por lo que los límites son directamente -2 y 2 .

Paso 4: Evaluación.

$$\begin{aligned} A &= \int_{-2}^2 (t - 3)(2t + 2) \, dt = \int_{-2}^2 (2t^2 - 4t - 6) \, dt \\ &= \left[\frac{2}{3}t^3 - 2t^2 - 6t \right]_{-2}^2 \\ &= \underbrace{\left(\frac{16}{3} - 8 - 12 \right)}_{t=2} - \underbrace{\left(-\frac{16}{3} - 8 + 12 \right)}_{t=-2} \\ &= \left(\frac{16}{3} - 20 \right) - \left(-\frac{16}{3} + 4 \right) = \frac{32}{3} - 24 = -\frac{16}{3}. \end{aligned}$$

Dado que la curva queda íntegramente bajo el eje x , el área geométrica es el valor absoluto del resultado:

$A = \frac{16}{3} \text{ u}^2$

11.2.1

Longitud de arco paramétrica

El hilo conductor entre la geometría diferencial y las sumas de Riemann es la siguiente idea: aproximamos la curva con pequeños segmentos rectilíneos cuya longitud es $\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}$; tomando el límite de dichas sumas obtenemos una integral.

Teorema 11.7 (Longitud de arco paramétrica). *Si una curva C dada por $x = x(t)$, $y = y(t)$ es suave en $[\alpha, \beta]$ (es decir, x' e y' son continuas y no se anulan simultáneamente), entonces su longitud es:*


$$L = \int_{\alpha}^{\beta} \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2} \, dt.$$

Demostración. Se parte de la métrica euclidiana infinitesimal $ds = \sqrt{dx^2 + dy^2}$. Factorizando dt^2 dentro de la raíz: $ds = \sqrt{(dx/dt)^2 + (dy/dt)^2} \, dt$. Integrando de α a β y reconociendo el límite de sumas de Riemann de segmentos rectilíneos, se obtiene la fórmula. □

Ejemplo 11.8 (Circunferencia vía parámetros). Para $x = R \cos t$, $y = R \sin t$, $t \in [0, 2\pi]$, calcule la longitud de la circunferencia.

Solución:

Paso 1: Análisis gráfico y región. La parametrización describe una circunferencia de radio R centrada en el origen, recorrida en sentido antihorario al aumentar t . Para visualizar con escala concreta usamos $R = 1$.



Paso 2: Elemento diferencial de arco. Derivamos las funciones componentes respecto a t :

$$\frac{dx}{dt} = -R \sin t, \quad \frac{dy}{dt} = R \cos t.$$

El elemento de longitud de arco $ds = \sqrt{(dx/dt)^2 + (dy/dt)^2} dt$ se simplifica mediante la identidad pitagórica:

$$ds = \sqrt{R^2 \sin^2 t + R^2 \cos^2 t} dt = \sqrt{R^2 \underbrace{(\sin^2 t + \cos^2 t)}_{=1}} dt = R dt.$$

La velocidad de recorrido es constante e igual a R , independientemente del ángulo t .

Paso 3: Límites de integración. Un giro completo se produce al variar t desde 0 hasta 2π , instante en que el punto regresa a su posición inicial $(R, 0)$.

Paso 4: Evaluación.

$$L = \int_0^{2\pi} ds = \int_0^{2\pi} R dt = R \left[t \right]_0^{2\pi} = R(2\pi - 0).$$


$L = 2\pi R$

Este resultado coincide con la fórmula elemental de la longitud de una circunferencia, lo que valida la fórmula de longitud de arco paramétrica.

Ejemplo 11.9 (Longitud de la cicloide). Una **cicloide** es la trayectoria de un punto en el borde de una rueda de radio a que rueda sin deslizar. Sus ecuaciones son $x = a(t - \sin t)$, $y = a(1 - \cos t)$, $t \in [0, 2\pi]$. Demuestre que la longitud de un arco completo es $8a$.

Solución:

Paso 1: Análisis gráfico y región. La cicloide parte del origen en $t = 0$, alcanza su cúspide superior en $t = \pi$ con coordenadas $(\pi a, 2a)$, y regresa al eje x en $t = 2\pi$ con coordenadas $(2\pi a, 0)$.



Paso 2: Elemento diferencial.

$$\frac{dx}{dt} = a(1 - \cos t), \quad \frac{dy}{dt} = a \sin t.$$

$$\begin{aligned} \left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2 &= a^2(1 - \cos t)^2 + a^2 \sin^2 t \\ &= a^2(1 - 2 \cos t + \cos^2 t + \sin^2 t) = a^2(2 - 2 \cos t) \\ &= 2a^2(1 - \cos t). \end{aligned}$$

Paso 3: Identidad trigonométrica clave. Usamos la identidad de ángulo mitad: $1 - \cos t = 2 \sin^2 \frac{t}{2}$. Por tanto:

$$ds = \sqrt{2a^2 \cdot 2 \sin^2 \frac{t}{2}} dt = 2a \left| \sin \frac{t}{2} \right| dt.$$

En $[0, 2\pi]$ se tiene $\sin(t/2) \geq 0$, con lo que el valor absoluto desaparece.

Paso 4: Evaluación.

$$\begin{aligned} L &= \int_0^{2\pi} 2a \sin \frac{t}{2} dt = 2a \left[-2 \cos \frac{t}{2} \right]_0^{2\pi} \\ &= 2a(-2 \cos \pi + 2 \cos 0) = 2a(2 + 2) = 8a. \end{aligned}$$

$L = 8a$

Observación 11.10. El procedimiento para calcular la longitud de arco dada de forma paramétrica se puede resumir como:

1. Calcule $x'(t)$ e $y'(t)$.
2. Forme el integrando $\sqrt{[x'(t)]^2 + [y'(t)]^2}$ y simplifíquelo mediante identidades (muy frecuentemente la de ángulo mitad).
3. Integre en $[a, b]$ con atención a posibles valores absolutos.

11.3

Sistema de Coordenadas Polares


Aunque el sistema cartesiano es intuitivo para mallas rectangulares, problemas con simetría rotacional o central requieren un cambio de paradigma. El hilo conductor geométrico aquí es reemplazar las sumas de rectángulos $dx\,dy$ por sumas de *sectores circulares*, lo que transforma el elemento de área en $r\,dr\,d\theta$.

Definición 11.11 (Coordenadas polares). Un punto P en el plano se especifica por (r, θ) , donde:

- 1. $r \in \mathbb{R}$ es la **distancia dirigida** desde el polo O .
- 2. $\theta \in \mathbb{R}$ es el ángulo (en radianes) desde el eje polar (eje x positivo) hasta el rayo OP .

La conversión cartesiana es:

$$x = r \cos \theta, \quad y = r \sin \theta, \quad r^2 = x^2 + y^2, \quad \tan \theta = \frac{y}{x}.$$



Observación 11.12. Es importante tener en cuenta las siguientes observaciones:

- 1. No existe unicidad en los puntos de la curva, pues (r, θ) , $(r, \theta + 2k\pi)$ y $(-r, \theta + (2k+1)\pi)$ representan el mismo punto físico. Esto es crucial al hallar intersecciones de curvas polares.
- 2. El polo de la curva $(0, \theta)$ para cualquier θ . Suele ser una intersección “oculta” que el álgebra directa no revela; verifíquelo siempre de forma separada.
- 3. Para realizar una conversión rápida de una curva $r = f(\theta)$ a cartesiano, multiplique por r : por ejemplo, $r = 2 \cos \theta \Rightarrow r^2 = 2r \cos \theta \Rightarrow x^2 + y^2 = 2x$.

Las curvas polares tienen las siguientes propiedades:

Observación 11.13. Los criterios de simetría se pueden resumir como:

- 1. Las curvas son simétricas respecto al **Eje polar** ($\theta = 0$): reemplazar θ por $-\theta$ mantiene la ecuación.
- 2. Las curvas son simétricas respecto al **Eje** $\theta = \pi/2$: reemplazar θ por $\pi - \theta$ mantiene la ecuación.
- 3. La curva son simétrica respecto al **polo**: reemplazar r por $-r$ (o θ por $\pi + \theta$) mantiene la ecuación.

Observación 11.14. Algunas familias notables de curvas polares se resumen como:


- 1. Las **Cardioides**: $r = a \pm b \cos \theta$ con $a = b$ (forma de corazón).
- 2. La **Rosa de n pétalos**: $r = a \cos n\theta$; n impar $\Rightarrow n$ pétalos, n par $\Rightarrow 2n$ pétalos.
- 3. La **Lemniscatas**: $r^2 = a^2 \cos 2\theta$ (figura ∞).
- 4. La **Espiral de Arquímedes**: $r = a\theta$ ($a > 0$).

Ejemplo 11.15 (Galería de curvas polares notables). Trace e identifique las características principales de las siguientes familias de curvas en coordenadas polares: cardioides, rosas de n pétalos, lemniscatas y la espiral de Arquímedes.

Solución:

Paso 1: Análisis gráfico y región — Cardioide $r = a(1 + \cos \theta)$.

Una **cardioide** ($a = b$ en $r = a + b \cos \theta$) es una curva cerrada con un punto cúspide en el polo. Para $a = 1$: el radio máximo $r = 2$ se alcanza en $\theta = 0$, el mínimo $r = 0$ (cúspide) en $\theta = \pi$. Es simétrica respecto al eje polar.



Paso 2: Elemento diferencial. El área encerrada usa $dA = \frac{1}{2}r^2 d\theta = \frac{1}{2}(1 + \cos \theta)^2 d\theta$.
Paso 3: Límites de integración. Un recorrido completo: $\theta \in [0, 2\pi]$.
Paso 4: Área total de la cardioide (con $a = 1$).


$$\begin{aligned} A &= \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} (1 + \cos \theta)^2 d\theta = \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} (1 + 2 \cos \theta + \cos^2 \theta) d\theta \\ &= \frac{1}{2} [2\pi + 0 + \pi] = \frac{3\pi}{2}. \end{aligned}$$

Para radio genérico a :


$A_{\text{cardioide}} = \frac{3\pi a^2}{2}$

Paso 1: Análisis gráfico y región — Rosa de n pétalos $r = a \cos(n\theta)$.
Cada pétalo corresponde a un intervalo donde $r \geq 0$; su longitud máxima es $|a|$. La regla de paridad determina el número de pétalos. Ilustramos $r = \cos(3\theta)$ (3 pétalos, n impar) y $r = \cos(2\theta)$ (4 pétalos, n par).

Rosa $r = \cos(3\theta)$, 3 pétalos



Rosa $r = \cos(2\theta)$, 4 pétalos




Paso 2: Elemento diferencial. $dA = \frac{1}{2}a^2 \cos^2(n\theta) d\theta$.
Paso 3 y 4: Área de un pétalo de $r = a \cos(n\theta)$. El pétalo principal existe para $\theta \in [-\pi/(2n), \pi/(2n)]$:

$$A_{\text{pétalo}} = \frac{a^2}{2} \int_{-\pi/(2n)}^{\pi/(2n)} \cos^2(n\theta) d\theta = \frac{a^2}{4} \int_{-\pi/(2n)}^{\pi/(2n)} (1 + \cos 2n\theta) d\theta = \frac{\pi a^2}{4n}.$$

$$A_{\text{pétalo}} = \frac{\pi a^2}{4n}$$

$$A_{\text{total}} = \begin{cases} n \cdot \frac{\pi a^2}{4n} = \frac{\pi a^2}{4} & n \text{ impar} \\ 2n \cdot \frac{\pi a^2}{4n} = \frac{\pi a^2}{2} & n \text{ par} \end{cases}$$

Paso 1: Análisis gráfico y región — Lemniscata $r^2 = a^2 \cos(2\theta)$.
La **lemniscata** tiene la forma del símbolo ∞ . Existe solo donde $\cos(2\theta) \geq 0$, es decir, $\theta \in [-\pi/4, \pi/4]$ (bucle derecho) y $\theta \in [3\pi/4, 5\pi/4]$ (bucle izquierdo). Su ancho máximo es $r = a$ en $\theta = 0$.




Paso 2: Elemento diferencial. $dA = \frac{1}{2}r^2 d\theta = \frac{a^2}{2} \cos(2\theta) d\theta$.
Paso 3: Límites de integración. Bucle derecho: $\theta \in [-\pi/4, \pi/4]$.
Paso 4: Área de un bucle.

$$A_{\text{bucle}} = \frac{a^2}{2} \int_{-\pi/4}^{\pi/4} \cos(2\theta) d\theta = \frac{a^2}{2} \left[\frac{\sin 2\theta}{2} \right]_{-\pi/4}^{\pi/4} = \frac{a^2}{2} \cdot 1.$$

$$A_{\text{bucle}} = \frac{a^2}{2}, \quad A_{\text{total}} = a^2$$

Paso 1: Análisis gráfico y región — Espiral de Arquímedes $r = a\theta$ ($a > 0$).
A diferencia de las curvas cerradas anteriores, la espiral se aleja indefinidamente del polo al crecer θ . Para $a = 1/(2\pi)$, cada vuelta completa aumenta r en exactamente 1 unidad.



Paso 2: Elemento diferencial. $dA = \frac{1}{2}r^2 d\theta = \frac{1}{2}a^2\theta^2 d\theta$.
Paso 3: Límites de integración. El área barrida en la primera vuelta completa: $\theta \in [0, 2\pi]$.
Paso 4: Área barrida en la primera vuelta.

$$A = \frac{a^2}{2} \int_0^{2\pi} \theta^2 d\theta = \frac{a^2}{2} \left[\frac{\theta^3}{3} \right]_0^{2\pi} = \frac{a^2}{2} \cdot \frac{8\pi^3}{3}.$$

$$A_{\text{primera vuelta}} = \frac{4\pi^3 a^2}{3}$$

11.3.1

Área en coordenadas polares

Según lo que hemos estudiado, en cartesianas, $dA = y \, dx$ es el área de un rectángulo infinitesimal. En polares, el elemento de área es un *sector circular* de ángulo $d\theta$ y radio r : $dA = \frac{1}{2}r^2 \, d\theta$.

Teorema 11.16 (Área de una región polar). *El área de la región delimitada por la curva $r = r(\theta)$ y los rayos $\theta = \alpha$, $\theta = \beta$ es:*


$$A = \int_{\alpha}^{\beta} \frac{1}{2} [r(\theta)]^2 \, d\theta.$$

Ejemplo 11.17 (Área de un pétalo de la rosa $r = 3 \sin(3\theta)$). Analice la curva polar $r = 3 \sin(3\theta)$ y calcule el área de un solo pétalo.

Solución:

Paso 1: Análisis gráfico, simetría y región.

Número de pétalos: $n = 3$ (impar) $\Rightarrow$ **3 pétalos** de longitud $|r|_{\text{máx}} = 3$.
Simetría: reemplazando θ por $\pi - \theta$: $\sin(3(\pi - \theta)) = \sin(3\pi - 3\theta) = -\sin(3\theta - 3\pi) = \sin(3\theta)$ (usando periodicidad). La curva es simétrica respecto al eje $\theta = \pi/2$.
Un pétalo se genera al variar θ en un intervalo donde $r \geq 0$. El pétalo principal: $r = 0$ cuando $\sin(3\theta) = 0$, es decir, $3\theta = 0$ y $3\theta = \pi$, luego $\theta \in [0, \pi/3]$.



Paso 2: Elemento diferencial.

$$dA = \frac{1}{2}r^2 \, d\theta = \frac{1}{2}[3 \sin(3\theta)]^2 \, d\theta = \frac{9}{2} \sin^2(3\theta) \, d\theta.$$

Paso 3: Límites de integración. El pétalo principal corresponde a $\theta \in [0, \pi/3]$, intervalo donde $r = 3 \sin(3\theta) \geq 0$.

Paso 4: Evaluación. Utilizamos la identidad $\sin^2 u = \frac{1 - \cos 2u}{2}$ con $u = 3\theta$:


$$\begin{aligned} A &= \int_0^{\pi/3} \frac{9}{2} \sin^2(3\theta) d\theta = \frac{9}{2} \int_0^{\pi/3} \frac{1 - \cos 6\theta}{2} d\theta \\ &= \frac{9}{4} \left[\theta - \frac{\sin 6\theta}{6} \right]_0^{\pi/3} \\ &= \frac{9}{4} \left[\left(\frac{\pi}{3} - \frac{\sin 2\pi}{6} \right) - (0 - 0) \right] = \frac{9}{4} \cdot \frac{\pi}{3}. \end{aligned}$$

$A_{\text{pétalo}} = \frac{3\pi}{4} u^2$

Ejemplo 11.18 (Intersección de dos cardioides y área de la región común). Encuentre los puntos de intersección entre las cardioides $r = 1 + \cos \theta$ y $r = 1 - \sin \theta$, y plantee la integral para el área de la región delimitada por $r = 1 + \cos \theta$ entre los ángulos de cruce.

Solución:

Paso 1: Análisis gráfico y región. La cardioide $r = 1 + \cos \theta$ apunta hacia la derecha; la cardioide $r = 1 - \sin \theta$ apunta hacia abajo. Se cruzan en dos puntos visibles y comparten el polo.



Paso 2: Elemento diferencial. El diferencial de área en polares es un sector circular: $dA = \frac{1}{2}r^2(\theta) d\theta$.

Paso 3: Límites de integración. Igualamos:

$$1 + \cos \theta = 1 - \sin \theta \implies \cos \theta + \sin \theta = 0 \implies \tan \theta = -1.$$

En $[0, 2\pi)$: $\theta = \frac{3\pi}{4}$ y $\theta = \frac{7\pi}{4}$.

Además, el **polo** es intersección adicional: $r = 0$ en $\theta = \pi$ para la primera cardioide y en $\theta = \pi/2$ para la segunda.

Paso 4: Evaluación del área parcial.

Para el área barrida por la cardioide $r = 1 + \cos \theta$ entre los ángulos de cruce:

$$\begin{aligned} A_{\text{parcial}} &= \int_{3\pi/4}^{7\pi/4} \frac{1}{2} (1 + \cos \theta)^2 d\theta \\ &= \frac{1}{2} \int_{3\pi/4}^{7\pi/4} (1 + 2 \cos \theta + \cos^2 \theta) d\theta \\ &= \frac{1}{2} \left[\theta + 2 \sin \theta + \frac{\theta}{2} + \frac{\sin 2\theta}{4} \right]_{3\pi/4}^{7\pi/4} \\ &= \frac{9\pi}{8} - \sqrt{2}. \end{aligned}$$

Los puntos de intersección y el área parcial quedan determinados:

$P_1 = \left(1 - \frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{3\pi}{4}\right), \quad P_2 = \left(1 + \frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{7\pi}{4}\right), \quad \text{Polo } (0, \theta), \quad A_{\text{parcial}} = \frac{9\pi}{8} - \sqrt{2}$

11.3.2

Longitud de arco en coordenadas polares

Teorema 11.19 (Longitud de arco en coordenadas polares). Si la curva está dada por $r = r(\theta)$ con r' continua en $[\alpha, \beta]$, entonces su longitud es:

$$s = \int_{\alpha}^{\beta} \sqrt{r(\theta)^2 + [r'(\theta)]^2} d\theta.$$


Demostración. Usando las relaciones $x = r \cos \theta$, $y = r \sin \theta$ y diferenciando: $x' = r' \cos \theta - r \sin \theta$, $y' = r' \sin \theta + r \cos \theta$. Entonces $(x')^2 + (y')^2 = (r')^2(\cos^2 \theta + \sin^2 \theta) + r^2(\sin^2 \theta + \cos^2 \theta) = (r')^2 + r^2$. Sustituyendo en la fórmula paramétrica se obtiene el resultado. □

Ejemplo 11.20 (Longitud de la espiral de Arquímedes). Calcule la longitud de la espiral de Arquímedes $r = \theta$ para $\theta \in [0, 2\pi]$.

Solución:

Paso 1: Análisis gráfico y región. La espiral parte del polo ($r = 0$ cuando $\theta = 0$) y se aleja de forma lineal: a mayor ángulo, mayor radio. El arco cuya longitud calcularemos va desde el polo hasta el punto $(2\pi, 0)$ en cartesianas, después de una vuelta completa.

Espiral de Arquímedes $r = \theta$ (θ en rad)



Paso 2: Elemento diferencial de arco. Para $r(\theta) = \theta$ se tiene $r'(\theta) = 1$, luego:

$$ds = \sqrt{r^2 + (r')^2} d\theta = \sqrt{\theta^2 + 1} d\theta.$$

Paso 3: Límites de integración. Una vuelta completa corresponde a $\theta \in [0, 2\pi]$, por lo que:

$$s = \int_0^{2\pi} \sqrt{\theta^2 + 1} d\theta.$$

Paso 4: Antiderivada mediante sustitución trigonométrica.

Calculamos primero la antiderivada indefinida. Sea $\theta = \tan u$, de modo que $d\theta = \sec^2 u du$ y $\sqrt{\theta^2 + 1} = \sqrt{\tan^2 u + 1} = \sec u$ (con $\sec u > 0$):

$$\int \sqrt{\theta^2 + 1} d\theta = \int \sec u \cdot \sec^2 u du = \int \sec^3 u du.$$

Paso 4a: Integral de $\sec^3 u$ por partes. Tomamos $p = \sec u$ y $dq = \sec^2 u du$, de donde $dp = \sec u \tan u du$ y $q = \tan u$:

$$\begin{aligned} \int \sec^3 u du &= \sec u \tan u - \int \sec u \tan^2 u du \\ &= \sec u \tan u - \int \sec u (\sec^2 u - 1) du \\ &= \sec u \tan u - \int \sec^3 u du + \int \sec u du. \end{aligned}$$

Despejando $\int \sec^3 u du$:

$$\begin{aligned} 2 \int \sec^3 u du &= \sec u \tan u + \int \sec u du = \sec u \tan u + \ln |\sec u + \tan u| + C, \\ \int \sec^3 u du &= \frac{\sec u \tan u + \ln |\sec u + \tan u|}{2} + C. \end{aligned}$$

Paso 4b: Regreso a la variable θ . De la sustitución $\theta = \tan u$ se tiene $\sec u = \sqrt{\theta^2 + 1}$ y $\tan u = \theta$, luego:

$$\int \sqrt{\theta^2 + 1} d\theta = \frac{\theta \sqrt{\theta^2 + 1} + \ln(\theta + \sqrt{\theta^2 + 1})}{2} + C.$$

(Nótese que $\theta + \sqrt{\theta^2 + 1} > 0$ para todo θ , por lo que se suprime el valor absoluto.)

Paso 5: Evaluación en $[0, 2\pi]$.

$$\begin{aligned} s &= \left[\frac{\theta\sqrt{\theta^2 + 1} + \ln(\theta + \sqrt{\theta^2 + 1})}{2} \right]_0^{2\pi} \\ &= \frac{2\pi\sqrt{4\pi^2 + 1} + \ln(2\pi + \sqrt{4\pi^2 + 1})}{2} - \frac{0 \cdot 1 + \ln(0 + 1)}{2} \\ &= \pi\sqrt{4\pi^2 + 1} + \frac{\ln(2\pi + \sqrt{4\pi^2 + 1})}{2} - 0. \end{aligned}$$

Numéricamente: $\sqrt{4\pi^2 + 1} \approx 6,361$, $2\pi + 6,361 \approx 12,645$, luego $s \approx \pi \cdot 6,361 + \frac{1}{2} \ln(12,645) \approx 19,98 + 1,27 \approx 21,26$ u.

$$s = \pi\sqrt{4\pi^2 + 1} + \frac{1}{2} \ln(2\pi + \sqrt{4\pi^2 + 1}) \approx 21,26 \text{ u}$$

11.4

Problemas propuestos

Problema 11.21. Para cada curva dada en forma paramétrica, elimine el parámetro para obtener la ecuación cartesiana equivalente e identifique la curva resultante. Trace un bosquejo de la gráfica indicando con flechas la dirección de recorrido a medida que el parámetro t crece.

- 1. $x = 6t + 2, \quad y = 2t; \quad -\infty < t < \infty$
- 2. $x = 4t^2, \quad y = 4t; \quad -1 \leq t \leq 2$
- 3. $x = 2 \sec t, \quad y = \tan t; \quad -\frac{\pi}{2} < t < \frac{\pi}{2}$
- 4. $x = 4 \sin t - 2, \quad y = 3 \cos t + 1; \quad 0 \leq t \leq 2\pi$

Problema 11.22. Para cada curva paramétrica, calcule la derivada $\frac{dy}{dx}$ y determine la ecuación de la recta tangente en el punto correspondiente al valor $t = 0$ del parámetro.

- 1. $x = 3e^{-t}, \quad y = \frac{1}{2}e^t$
- 2. $x = 2t^3 - 4t + 7, \quad y = t + \ln(t + 1)$

Problema 11.23. Considere la curva paramétrica definida por $x = t^2 - 4$ e $y = t^3 - 3t$.

- 1. Determine las coordenadas cartesianas (x, y) de todos los puntos de la curva en los que la recta tangente es horizontal.
- 2. Calcule la segunda derivada $\frac{d^2y}{dx^2}$ y evalúela en $t = 2$ para determinar la concavidad de la curva en ese punto.

Problema 11.24. La cicloide está definida paramétricamente por $x = t - \sin t$ e $y = 1 - \cos t$, para $0 \leq t \leq 2\pi$. Plantee y evalúe la integral definida que representa el área de la región plana acotada superiormente por un arco completo de la cicloide e inferiormente por el eje x .

Problema 11.25. Plantee y evalúe la integral definida que representa la longitud de arco de cada curva paramétrica en el intervalo indicado.

- 1. $x = 1 + t^{3/2}, \quad y = 2 + t^{3/2}, \quad 0 \leq t \leq 9$

2. $x = \cos t + t \sin t, \quad y = \sin t - t \cos t, \quad 0 \leq t \leq 2\pi$

Problema 11.26. Halle el área de la superficie de revolución generada al hacer girar el arco de la curva paramétrica $x = \cos^3 t, y = \sin^3 t$, con $0 \leq t \leq \pi/2$, alrededor del eje x . Incluya el planteamiento completo de la integral antes de proceder con su evaluación.

Problema 11.27. Para cada ecuación polar, obtenga una ecuación cartesiana equivalente e identifique la curva resultante (recta, circunferencia, cónica, etc.). Incluya un bosquejo de la curva en el plano.

- 1. $r = 6 \cos \theta$
- 2. $r = \frac{3}{\cos \theta}$
- 3. $r^2 \cos 2\theta = 9$
- 4. $r^2 - 6r(\cos \theta + \sin \theta) + 9 = 0$

Problema 11.28. Calcule la pendiente de la recta tangente a la curva polar $r = 3 + 3 \cos \theta$ en el punto donde $\theta = \frac{\pi}{6}$.

Problema 11.29. Dada la curva polar $r = 1 - \sin \theta$, determine las coordenadas polares (r, θ) de todos los puntos de la curva en los que la recta tangente es horizontal. Considere $0 \leq \theta < 2\pi$ y justifique el tratamiento analítico de los posibles puntos en que $dy/d\theta$ y $dx/d\theta$ se anulan simultáneamente.

Problema 11.30. Determine los límites de integración adecuados y calcule el área de la región indicada en cada caso.

- 1. El área de uno de los bucles de la lemniscata $r^2 = 4 \cos(2\theta)$. Establezca los ángulos exactos en los que $r = 0$ para fijar los límites de integración.
- 2. El área encerrada por un solo pétalo de la rosa polar $r = 3 \sin(3\theta)$. Indique el número total de pétalos y justifique la elección del intervalo de integración.

Problema 11.31. Utilice la integración en coordenadas polares para resolver los siguientes problemas de áreas.

- 1. Determine el área total de la región acotada por el cardioide $r = 5 - 5 \cos \theta$.
- 2. Encuentre los puntos de intersección de $r = 5 \sin \theta$ y $r = 2 + \sin \theta$. Calcule el área de la región que se encuentra dentro del círculo $r = 5 \sin \theta$ y fuera del caracol $r = 2 + \sin \theta$.

Problema 11.32. Plantee y evalúe la integral que representa la longitud de arco exacta de cada curva polar en el intervalo indicado.

- 1. La espiral logarítmica $r = e^{2\theta}$, desde $\theta = 0$ hasta $\theta = 2\pi$.
- 2. El cardioide $r = a(1 - \cos \theta)$, para $0 \leq \theta \leq 2\pi$. *Sugerencia:* aplique la identidad de ángulo mitad $1 - \cos \theta = 2 \sin^2(\theta/2)$ para resolver la raíz cuadrada del integrando.

Capítulo

12

Sucesiones y series de números

Una parte fundamental del análisis real es el estudio de las sucesiones y series. Este tema abarca desde series numéricas hasta series de funciones, permitiendo expresar funciones complejas de manera más manejable y transformar cálculos analíticos en procesos más sistemáticos. Por ejemplo, una calculadora no almacena en memoria el valor de $\sin(1)$; lo aproxima numéricamente evaluando los primeros términos de la serie de Taylor de la función seno en $x = 1$. Para comprender este tipo de herramientas, es necesario establecer definiciones precisas y resultados básicos. En este capítulo se presentarán los aspectos esenciales, priorizando la claridad conceptual y la aplicación práctica sin perder rigor matemático.

12.1

Sucesiones de números reales

El estudio de las series comienza con el concepto de sucesión.

Definición 12.1 (Sucesión de números reales). Una **sucesión infinita** de números reales es una función $a : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$, donde $\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots\}$ (o un subconjunto de la forma $\{n \in \mathbb{Z} : n \geq n_0\}$). Se denota como $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$, o simplemente $\{a_n\}$, donde $a_n = a(n)$ recibe el nombre de **término general**.

Ejemplo 12.2 (Formas de definir una sucesión). Las sucesiones pueden especificarse de distintas maneras:

- **Fórmula explícita:** $a_n = 1 - \frac{1}{n}$ genera $0, \frac{1}{2}, \frac{2}{3}, \frac{3}{4}, \dots$, que se aproxima progresivamente a 1.
- **Fórmula recursiva:** $a_1 = 1, a_{n+1} = a_n + 3$ genera $1, 4, 7, 10, \dots$ (sucesión aritmética de razón 3).
- **Recurrencia de segundo orden:** $f_1 = 1, f_2 = 1, f_{n+2} = f_n + f_{n+1}$ define la sucesión de Fibonacci: $1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, \dots$
- **Definición implícita:** $a_n = \lfloor \sqrt{n} \rfloor$ da $1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3, \dots$, donde $\lfloor \cdot \rfloor$ denota la función piso.

El comportamiento asintótico de una sucesión se formaliza mediante el concepto de límite.

Definición 12.3 (Límite de una sucesión). Se dice que la sucesión $\{a_n\}$ **converge** al número real L , y se escribe $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L$, si para cada $\varepsilon > 0$ existe $N = N(\varepsilon) \in \mathbb{N}$ tal que

$$n > N \implies |a_n - L| < \varepsilon.$$

Si no existe tal L , la sucesión **diverge**.

Observación 12.4. Geométricamente, $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L$ significa que, a partir de algún índice N , todos los términos de la sucesión quedan dentro de la banda $(L - \varepsilon, L + \varepsilon)$, sin importar cuán pequeña sea $\varepsilon > 0$.

Teorema 12.5 (Unicidad del límite). Si una sucesión converge, su límite es único.

Solución: Suponga que $a_n \rightarrow L$ y $a_n \rightarrow M$ con $L \neq M$. Sea $\varepsilon = |L - M|/2 > 0$. Existen N_1, N_2 tales que $|a_n - L| < \varepsilon$ para $n > N_1$ y $|a_n - M| < \varepsilon$ para $n > N_2$. Para $n > \max(N_1, N_2)$:

$$|L - M| \leq |a_n - L| + |a_n - M| < 2\varepsilon = |L - M|,$$

una contradicción. Luego $L = M$.

Las propiedades algebraicas de los límites de funciones se trasladan directamente a sucesiones.

Teorema 12.6 (Propiedades aritméticas de los límites). Si $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = A$ y $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = B$, entonces:

- 1. $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n \pm b_n) = A \pm B$.
- 2. $\lim_{n \rightarrow \infty} (k a_n) = kA$ para todo $k \in \mathbb{R}$.
- 3. $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n b_n) = AB$.
- 4. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = \frac{A}{B}$, siempre que $B \neq 0$ y $b_n \neq 0$ para n suficientemente grande.
- 5. Si f es continua en A , entonces $\lim_{n \rightarrow \infty} f(a_n) = f(A)$.

Teorema 12.7 (Teorema del emparedado). Si existen $N_0 \in \mathbb{N}$ y sucesiones $\{a_n\}, \{b_n\}$ tales que $a_n \leq c_n \leq b_n$ para todo $n > N_0$, y $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = L$, entonces $\lim_{n \rightarrow \infty} c_n = L$.

Ejemplo 12.8. Calcule $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sin n}{n}$. Como $-1 \leq \sin n \leq 1$, se tiene $-\frac{1}{n} \leq \frac{\sin n}{n} \leq \frac{1}{n}$ para todo $n \geq 1$. Puesto que ambas cotas tienden a 0, por el emparedado $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sin n}{n} = 0$.

12.1.1

Monotonía, acotación y convergencia

Definición 12.9 (Sucesión monótona). Una sucesión $\{a_n\}$ es **no decreciente** si $a_n \leq a_{n+1}$ para todo n , y **no creciente** si $a_n \geq a_{n+1}$ para todo n . Se dice **monótona** si satisface alguna de las dos condiciones.

Definición 12.10 (Sucesión acotada). Una sucesión $\{a_n\}$ está **acotada superiormente** si existe M tal que $a_n \leq M$ para todo n ; está **acotada inferiormente** si existe m con $a_n \geq m$ para todo n ; y está **acotada** si existe $M > 0$ con $|a_n| \leq M$ para todo n .

Observación 12.11. Toda sucesión convergente es acotada. El recíproco es falso: $a_n = (-1)^n$ es acotada pero diverge.

Teorema 12.12 (Teorema de convergencia monótona). Toda sucesión monótona y acotada converge. Más precisamente:

- Si $\{a_n\}$ es no decreciente y acotada superiormente, converge a $\sup_n a_n$.
- Si $\{a_n\}$ es no creciente y acotada inferiormente, converge a $\inf_n a_n$.

Observación 12.13. Este teorema es consecuencia directa de la completitud de $\mathbb{R}$ (propiedad del supremo). Es uno de los resultados más usados para demostrar convergencia sin calcular el límite explícitamente.

Ejemplo 12.14. Sea $a_1 = 1$ y $a_{n+1} = \sqrt{2 + a_n}$. Verifiquemos que converge.

Acotación. Por inducción: si $a_n \leq 2$, entonces $a_{n+1} = \sqrt{2 + a_n} \leq \sqrt{4} = 2$. Como $a_1 = 1 \leq 2$, la sucesión está acotada superiormente por 2.

Monotonía. Para $0 \leq a_n \leq 2$, la desigualdad $a_{n+1} \geq a_n$ equivale a $\sqrt{2+a_n} \geq a_n$, es decir $2+a_n \geq a_n^2$, o sea $(a_n-2)(a_n+1) \leq 0$, que se cumple en $[0, 2]$. Luego $\{a_n\}$ es no decreciente.

Por el teorema, existe $L = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n$. Tomando límite en la recurrencia: $L = \sqrt{2+L}$, de donde $L^2-L-2 = 0$, con raíces $L = 2$ y $L = -1$. Como $a_n > 0$, concluimos $L = 2$.

Ejemplo 12.15. Considere $a_n = \frac{n^2}{2^n}$. El cociente $\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{(n+1)^2}{2n^2}$ es menor que 1 para $n \geq 3$, luego $\{a_n\}$ es decreciente a partir de $n = 3$. Como $a_n > 0$, está acotada inferiormente. Por el teorema de convergencia monótona, $\{a_n\}$ converge. (Su límite es 0, verificable con el criterio del cociente.)

12.1.2

Completitud y compacidad

Teorema 12.16 (Teorema de Bolzano-Weierstrass). *Toda sucesión acotada en $\mathbb{R}$ posee al menos una subsucesión convergente.*

Observación 12.17. *Este resultado tiene profundas implicaciones: garantiza que los subconjuntos cerrados y acotados de $\mathbb{R}$ son compactos, y es la base de numerosas demostraciones de existencia en análisis y optimización.*

Definición 12.18 (Sucesión de Cauchy). La sucesión $\{a_n\}$ es de **Cauchy** si para todo $\varepsilon > 0$ existe $N \in \mathbb{N}$ tal que $|a_n - a_m| < \varepsilon$ para todo $n, m > N$.

Teorema 12.19 (Criterio de Cauchy). *En $\mathbb{R}$, una sucesión converge si y solo si es de Cauchy.*

Observación 12.20. *El criterio de Cauchy es poderoso porque permite demostrar convergencia sin conocer el valor del límite. Su validez en $\mathbb{R}$ es equivalente a la **completitud** de los números reales; en $\mathbb{Q}$, en cambio, existen sucesiones de Cauchy que no convergen (por ejemplo, las aproximaciones decimales de $\sqrt{2}$).*

12.1.3

Límites fundamentales y herramientas de cálculo

Ejemplo 12.21 (Límites fundamentales). Los siguientes límites son herramientas estándar:

- $\lim_{n \rightarrow \infty} r^n = 0$ si $|r| < 1$; diverge si $|r| > 1$.
- $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n} = 1$.
- $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{c} = 1$ para todo $c > 0$.
- $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^k}{a^n} = 0$ para $a > 1$ y $k \in \mathbb{R}$ (la exponencial domina al polinomio).
- $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a^n}{n!} = 0$ para todo $a \in \mathbb{R}$ (el factorial domina a cualquier exponencial).
- $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{x}{n}\right)^n = e^x$ para todo $x \in \mathbb{R}$.
- $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln n}{n} = 0$.

Observación 12.22. *La jerarquía de crecimiento de sucesiones habituales es:*

$\ln n \ll n^\alpha \ll a^n \ll n! \ll n^n \quad (n \rightarrow \infty),$

para $\alpha > 0$ y $a > 1$. Esta jerarquía es inmediatamente útil para evaluar límites de cocientes sin necesidad de cálculos adicionales.

Teorema 12.23 (Teorema de Stolz-Cesàro). Sea $\{a_n\}$ una sucesión cualquiera y $\{b_n\}$ estrictamente creciente con $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = +\infty$. Si existe

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1} - a_n}{b_{n+1} - b_n} = L \in \mathbb{R} \cup \{\pm\infty\},$$

entonces $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = L$.

Observación 12.24. El teorema de Stolz-Cesàro es el análogo discreto de la regla de L'Hôpital para indeterminaciones del tipo ∞/∞ . Es especialmente útil para límites de promedios y sumas de potencias.

Ejemplo 12.25 (Potencias y Stolz-Cesàro). Calculemos $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1^k + 2^k + \dots + n^k}{n^{k+1}}$, $k \in \mathbb{N}$. Tomamos $a_n = \sum_{i=1}^n i^k$ y $b_n = n^{k+1}$. Aplicando el teorema:

$$\frac{a_{n+1} - a_n}{b_{n+1} - b_n} = \frac{(n+1)^k}{(n+1)^{k+1} - n^{k+1}} = \frac{\left(1 + \frac{1}{n}\right)^k}{n\left[\left(1 + \frac{1}{n}\right)^{k+1} - 1\right]} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \frac{1}{k+1},$$

donde se usó que $(1+t)^{k+1} - 1 \sim (k+1)t$ cuando $t \rightarrow 0$.

Ejemplo 12.26 (Logaritmo del factorial). Calcule $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln(n!)}{n \ln n}$. Con $a_n = \ln(n!) = \sum_{k=1}^n \ln k$ y $b_n = n \ln n$,

el teorema de Stolz-Cesàro da:

$$\frac{a_{n+1} - a_n}{b_{n+1} - b_n} = \frac{\ln(n+1)}{(n+1) \ln(n+1) - n \ln n}.$$

El denominador es $\ln(n+1) + n \ln\left(\frac{n+1}{n}\right) \sim \ln n + 1$, así que el cociente $\rightarrow 1$. El límite buscado es **1**, resultado consistente con la aproximación de Stirling $\ln(n!) \approx n \ln n - n$.

12.1.4

Infinitesimales equivalentes

Definición 12.27 (Infinitesimales equivalentes). Dos sucesiones infinitesimales $\alpha_n \rightarrow 0$ y $\beta_n \rightarrow 0$ son **equivalentes**, escrito $\alpha_n \sim \beta_n$, si $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\alpha_n}{\beta_n} = 1$.

Ejemplo 12.28. Para $n \rightarrow \infty$ (con $\frac{1}{n} \rightarrow 0$):

$$\sin \frac{1}{n} \sim \frac{1}{n}, \quad \tan \frac{1}{n} \sim \frac{1}{n}, \quad \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) \sim \frac{1}{n}, \quad e^{1/n} - 1 \sim \frac{1}{n}, \quad 1 - \cos \frac{1}{n} \sim \frac{1}{2n^2}.$$

Por ejemplo: $\lim_{n \rightarrow \infty} n \sin \frac{1}{n} = \lim_{n \rightarrow \infty} n \cdot \frac{1}{n} = 1$.

Observación 12.29. Los infinitesimales equivalentes solo pueden sustituirse directamente en factores de un producto o cociente; en una suma la sustitución puede ser inválida. Si $\alpha_n \sim \beta_n$ y $\gamma_n \sim \delta_n$, entonces $\alpha_n \gamma_n \sim \beta_n \delta_n$, pero no necesariamente $\alpha_n + \gamma_n \sim \beta_n + \delta_n$.

12.2

Series de números reales

Definición 12.30 (Serie numérica). Dada una sucesión $\{a_n\}_{n=1}^\infty$, la **serie** asociada es la expresión formal:

$$\sum_{n=1}^\infty a_n = a_1 + a_2 + a_3 + \cdots$$

Definición 12.31 (Sumas parciales y convergencia). La n -ésima **suma parcial** es $S_n = \sum_{k=1}^n a_k$.

- Si $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = S \in \mathbb{R}$, la serie **converge** con suma S .
- Si el límite no existe o es $\pm\infty$, la serie **diverge**.

Observación 12.32. Una serie no es una suma aritmética usual, sino el límite de una sucesión de sumas parciales. Esta distinción es crucial para evitar manipulaciones algebraicas inválidas con cantidades infinitas.

Teorema 12.33 (Criterio del término n -ésimo). Si $\sum a_n$ converge, entonces $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$. Por contrarrecíproco: si $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n \neq 0$ (o el límite no existe), la serie diverge.

Observación 12.34. La condición $a_n \rightarrow 0$ es **necesaria pero no suficiente** para la convergencia. El ejemplo más célebre que ilustra esta sutileza es la serie armónica.

Ejemplo 12.35 (Serie armónica). La serie $\sum_{n=1}^\infty \frac{1}{n}$ diverge aunque $1/n \rightarrow 0$. Una demostración elemental agrupa los términos en bloques de potencias de 2:

$$1 + \frac{1}{2} + \underbrace{\frac{1}{3} + \frac{1}{4}}_{> 1/2} + \underbrace{\frac{1}{5} + \cdots + \frac{1}{8}}_{> 1/2} + \cdots$$

Cada bloque de 2^k términos suma más de $\frac{1}{2}$, y como hay infinitos bloques, $S_n \rightarrow +\infty$.

12.2.1

Series clásicas

Teorema 12.36 (Serie geométrica). Para $a \neq 0$ y $r \in \mathbb{R}$, la serie $\sum_{n=0}^\infty ar^n$ diverge si $|r| \geq 1$, y converge a $\frac{a}{1-r}$ si $|r| < 1$.

Solución: La suma parcial es $S_n = a \frac{1-r^{n+1}}{1-r}$ para $r \neq 1$. Si $|r| < 1$, entonces $r^{n+1} \rightarrow 0$, luego $S_n \rightarrow \frac{a}{1-r}$. Si $|r| \geq 1$, los términos ar^n no tienden a 0, así que la serie diverge.

Ejemplo 12.37. 1. $\sum_{n=0}^\infty \frac{1}{2^n} = \frac{1}{1-1/2} = 2$.

2. $\sum_{n=1}^\infty \left(-\frac{1}{3}\right)^n = \frac{-1/3}{1-(-1/3)} = -\frac{1}{4}$.

3. El decimal periódico $0.\bar{3} = \sum_{n=1}^\infty \frac{3}{10^n} = \frac{3/10}{1-1/10} = \frac{1}{3}$.

Teorema 12.38 (Series p). La serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$ converge si y solo si $p > 1$.

Observación 12.39. Para $p = 2$, Euler demostró que $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$ (problema de Basilea, 1734), estableciendo una conexión sorprendente entre los enteros positivos y el número π . Para $p = 4$ se obtiene $\sum \frac{1}{n^4} = \frac{\pi^4}{90}$, y así sucesivamente para potencias pares.

Ejemplo 12.40 (Serie telescópica). La serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)}$. Con fracciones parciales, $\frac{1}{n(n+1)} = \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}$, de modo que:

$$S_N = \sum_{n=1}^N \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} \right) = 1 - \frac{1}{N+1} \xrightarrow{N \rightarrow \infty} 1.$$

El nombre “telescópica” alude a que los términos intermedios se cancelan al expandir la suma.

Ejemplo 12.41. Calcule $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+2)}$. Fracciones parciales: $\frac{1}{n(n+2)} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+2} \right)$. Entonces

$$S_N = \frac{1}{2} \left(1 + \frac{1}{2} - \frac{1}{N+1} - \frac{1}{N+2} \right) \xrightarrow{N \rightarrow \infty} \frac{3}{4}.$$

Observación 12.42. Una serie telescópica no siempre converge; depende de si el término diferenciado tiende a una constante finita. Por ejemplo, $\sum_{n=1}^{\infty} \ln\left(\frac{n+1}{n}\right) = \ln(N+1) \rightarrow +\infty$, así que la serie diverge.

12.3

Criterios de convergencia para series de términos positivos

Cuando $a_n \geq 0$ para todo n , la sucesión de sumas parciales es monótona no decreciente. Por el teorema de convergencia monótona, la serie converge si y solo si $\{S_n\}$ está acotada superiormente.

Teorema 12.43 (Criterio de la integral). Sea $f : [1, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ continua, positiva y decreciente con $f(n) = a_n$. Entonces $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ converge si y solo si $\int_1^{\infty} f(x) dx$ converge.

Observación 12.44. El criterio de la integral proporciona también cotas para el error al aproximar la serie por su N -ésima suma parcial:

$$\int_{N+1}^{\infty} f(x) dx \leq \sum_{n=N+1}^{\infty} a_n \leq \int_N^{\infty} f(x) dx.$$

Estas cotas permiten determinar cuántos términos se necesitan para una aproximación con precisión prefijada.

Ejemplo 12.45. Para la serie $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n(\ln n)^p}$ con $p > 0$, la integral correspondiente es $\int_2^{\infty} \frac{dx}{x(\ln x)^p}$. La sustitución $u = \ln x$ conduce a $\int_{\ln 2}^{\infty} u^{-p} du$, que converge si y solo si $p > 1$. Luego la serie converge $\iff p > 1$. En particular, $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n \ln n}$ diverge.

Teorema 12.46 (Criterios de comparación). Sean $\sum a_n$ y $\sum b_n$ con $a_n, b_n \geq 0$.

- **Comparación directa:** Si $a_n \leq b_n$ para $n \geq N$ y $\sum b_n$ converge, entonces $\sum a_n$ converge. Si $\sum a_n$ diverge, entonces $\sum b_n$ diverge.
- **Comparación en el límite:** Si $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = L \in (0, +\infty)$, ambas series convergen o divergen simultáneamente.

Ejemplo 12.47. Determine la convergencia de $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n^3+1}}$. Comparando con $b_n = n^{-3/2}$:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^{3/2}}{\sqrt{n^3+1}} = 1 \in (0, \infty).$$

Como $\sum n^{-3/2}$ converge ($p = 3/2 > 1$), la serie original también converge.

Ejemplo 12.48. Determine la convergencia de $\sum_{n=1}^{\infty} \sin\left(\frac{1}{n}\right)$. Como $\sin(1/n) \sim 1/n$ cuando $n \rightarrow \infty$:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sin(1/n)}{1/n} = 1.$$

Como $\sum 1/n$ diverge, por comparación en el límite $\sum \sin(1/n)$ también diverge.

Teorema 12.49 (Criterio del cociente — D'Alembert). Sea $a_n > 0$ y $L = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n}$. Entonces:

1. $L < 1 \implies$ la serie converge absolutamente.
2. $L > 1 \implies$ la serie diverge.
3. $L = 1 \implies$ criterio **inconcluso**.

Ejemplo 12.50. Determine la convergencia de $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^3}{3^n}$:

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{(n+1)^3}{3^{n+1}} \cdot \frac{3^n}{n^3} = \frac{1}{3} \left(\frac{n+1}{n} \right)^3 \rightarrow \frac{1}{3} < 1.$$

La serie converge.

Ejemplo 12.51. Para la serie de e^x : $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$ con x fijo.

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{|x|^{n+1}}{(n+1)!} \cdot \frac{n!}{|x|^n} = \frac{|x|}{n+1} \rightarrow 0 < 1.$$

La serie converge absolutamente para todo $x \in \mathbb{R}$.

Teorema 12.52 (Criterio de la raíz — Cauchy). Sea $R = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|}$. Entonces:

1. $R < 1 \implies$ la serie converge absolutamente.
2. $R > 1 \implies$ la serie diverge.
3. $R = 1 \implies$ criterio **inconcluso**.

Ejemplo 12.53. Determine la convergencia de $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{2n+1}{3n+2} \right)^n$:

$$\sqrt[n]{a_n} = \frac{2n+1}{3n+2} \rightarrow \frac{2}{3} < 1.$$

La serie converge.

Observación 12.54. El criterio de la raíz es en general **más fino** que el del cociente: siempre que el cociente dé límite L , la raíz dará el mismo L ; pero existen series para las que el cociente falla ($L = 1$) y la raíz decide. Sin embargo, el cociente suele ser más sencillo de calcular cuando los términos involucran factoriales o productos.

Teorema 12.55 (Criterio de condensación de Cauchy). Si $\{a_n\}$ es no negativa y no creciente, entonces $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ converge si y solo si $\sum_{k=0}^{\infty} 2^k a_{2^k}$ converge.

Ejemplo 12.56. Con $a_n = n^{-p}$, el criterio de condensación da $\sum 2^k \cdot 2^{-kp} = \sum 2^{k(1-p)}$, serie geométrica de razón 2^{1-p} , que converge iff $p > 1$. Esto recupera el resultado de las series- p .

12.4

Convergencia absoluta y series de signo variable

Definición 12.57 (Convergencia absoluta y condicional). $\sum a_n$ converge **absolutamente** si $\sum |a_n|$ converge.

- $\sum a_n$ converge **condicionalmente** si $\sum a_n$ converge pero $\sum |a_n|$ diverge.

Toda serie absolutamente convergente es convergente, pero no al revés.

Teorema 12.58 (Criterio de Leibniz para series alternadas). Sea $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} a_n$ con $a_n > 0$. Si $\{a_n\}$ es decreciente y $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$, entonces la serie converge. Además, el error al truncar en N satisface $|S - S_N| \leq a_{N+1}$.

Ejemplo 12.59. La serie alternada armónica $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n}$ converge por Leibniz, pero $\sum 1/n$ diverge: la convergencia es **condicional**. Su suma es $\ln 2$, verificable con la serie de Taylor de $\ln(1+x)$ en $x = 1$.

Ejemplo 12.60. La serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n^2}$ converge **absolutamente** (pues $\sum 1/n^2$ converge). Su suma es $\pi^2/12$.

Teorema 12.61 (Criterios de Dirichlet y Abel). Para series de la forma $\sum a_n b_n$:

- Dirichlet:** Si las sumas parciales de $\sum b_n$ están acotadas y $\{a_n\}$ tiende monótonamente a 0, la serie converge.
- Abel:** Si $\sum b_n$ converge y $\{a_n\}$ es monótona y acotada, la serie converge.

Ejemplo 12.62. Para $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos(n\theta)}{n}$ con $\theta \neq 2k\pi$: las sumas parciales de $\sum \cos(n\theta)$ están acotadas (suma de progresión geométrica compleja) y $1/n \searrow 0$. Por Dirichlet, la serie converge.

12.5

Propiedades estructurales y operaciones con series

Teorema 12.63 (Propiedad asociativa). *En una serie convergente, se pueden agrupar términos consecutivos sin alterar la suma. En series divergentes, el agrupamiento puede crear falsas convergencias.*

Por ejemplo, la serie de Grandi $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n$ diverge, pero con agrupaciones distintas produce 0 o 1.

Teorema 12.64 (Teorema de reordenamiento de Riemann). 1. Si $\sum a_n$ converge **absolutamente**, cualquier reordenamiento converge a la misma suma.

2. Si $\sum a_n$ converge **condicionalmente**, para cualquier $r \in \mathbb{R} \cup \{\pm\infty\}$ existe un reordenamiento de la serie que converge a r .

Observación 12.65. *Este resultado es profundamente contraintuitivo: reordenar los términos de una serie condicionalmente convergente puede cambiar su suma a cualquier valor real. Solo las series absolutamente convergentes se comportan como sumas finitas bajo permutaciones de sus términos.*

Definición 12.66 (Producto de Cauchy). Dadas $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ y $\sum_{n=0}^{\infty} b_n$, su **producto de Cauchy** es $\sum_{n=0}^{\infty} c_n$

donde $c_n = \sum_{k=0}^n a_k b_{n-k}$. Si ambas series convergen absolutamente, o si una converge absolutamente y la otra converge, entonces $\sum c_n$ converge a $(\sum a_n)(\sum b_n)$.

12.6

Criterios de refinamiento

Cuando los criterios básicos son inconcluso ($L = 1$ o $R = 1$), se recurre a pruebas más sensibles.

Teorema 12.67 (Criterio de Raabe). Si $\lim_{n \rightarrow \infty} n \left(\frac{a_n}{a_{n+1}} - 1 \right) = \rho$, entonces:

- $\rho > 1 \implies$ converge.
- $\rho < 1 \implies$ diverge.
- $\rho = 1 \implies$ inconcluso.

Teorema 12.68 (Criterio de Bertrand). Si $\lim_{n \rightarrow \infty} \ln n \left[n \left(\frac{a_n}{a_{n+1}} - 1 \right) - 1 \right] = B$, entonces:

- $B > 1 \implies$ converge.
- $B < 1 \implies$ diverge.

Teorema 12.69 (Criterio de Kummer). Sea $\{d_n\}$ con $d_n > 0$ y $\sum 1/d_n$ divergente. Si $K_n = d_n \frac{a_n}{a_{n+1}} - d_{n+1}$ satisface $\lim K_n = K$, entonces:

- $K > 0 \implies$ converge.
- $K < 0 \implies$ diverge.

Los criterios de D'Alembert ($d_n = 1$) y Raabe ($d_n = n$) son casos particulares.

Observación 12.70. *Estos criterios son de interés principalmente teórico o para series frontera patológicas. En la práctica universitaria, los criterios de comparación, integral, cociente y raíz cubren la gran mayoría de los casos.*

Capítulo

13

Sucesiones y series de funciones

El estudio de sucesiones y series de funciones extiende el análisis numérico al espacio funcional. A diferencia de las series numéricas, aquí la convergencia depende del punto x en el dominio, lo que introduce dos nociones fundamentalmente distintas: convergencia *puntual* y convergencia *uniforme*. Esta distinción es crucial, pues solo la convergencia uniforme garantiza que propiedades analíticas esenciales —continuidad, integrabilidad, derivabilidad— se preserven al pasar al límite.

13.1

Sucesiones de funciones

Definición 13.1 (Sucesión de funciones). Sea $X \subset \mathbb{R}$. Una **sucesión de funciones** $\{f_n\}_{n=1}^\infty$ en X es una familia de funciones $f_n : X \rightarrow \mathbb{R}$ indexada por $n \in \mathbb{N}$.

Definición 13.2 (Convergencia puntual y uniforme). Sea $\{f_n\}$ una sucesión de funciones en X y $f : X \rightarrow \mathbb{R}$.

1. $\{f_n\}$ **converge puntualmente** a f en X si para cada $x_0 \in X$ fijo se tiene $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x_0) = f(x_0)$, es decir:

$$\forall x \in X, \forall \varepsilon > 0, \exists N(\varepsilon, x) \in \mathbb{N} : n > N \implies |f_n(x) - f(x)| < \varepsilon.$$

2. $\{f_n\}$ **converge uniformemente** a f en X si la convergencia es simultánea en todo X :

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N(\varepsilon) \in \mathbb{N} : n > N \implies \sup_{x \in X} |f_n(x) - f(x)| < \varepsilon.$$

Observación 13.3. La diferencia técnica clave reside en el orden de los cuantificadores:

Puntual: $\forall x \forall \varepsilon \exists N(x, \varepsilon) : \dots$

Uniforme: $\forall \varepsilon \exists N(\varepsilon) \forall x : \dots$

En la convergencia uniforme, **un solo** N **sirve para todos los** $x \in X$ **simultáneamente**, lo que tiene consecuencias analíticas profundas.

Ejemplo 13.4 (Convergencia puntual sin uniforme: $f_n(x) = x^n$). En $X = [0, 1]$, la función límite de $f_n(x) = x^n$ es

$$f(x) = \begin{cases} 0 & 0 \leq x < 1, \\ 1 & x = 1. \end{cases}$$

Cada f_n es continua, pero f es discontinua en $x = 1$. Por el Teorema 13.8, la convergencia no puede ser uniforme. Directamente:

$$\sup_{x \in [0,1]} |x^n - f(x)| = \sup_{x \in [0,1)} x^n = 1 \not\rightarrow 0.$$

Sin embargo, para $0 < r < 1$ fijo, $\sup_{x \in [0,r]} x^n = r^n \rightarrow 0$, de modo que la convergencia **sí** es uniforme en $[0, r]$.

Ejemplo 13.5 (Convergencia uniforme). Sea $f_n(x) = x/n$ en $[0, 1]$. Entonces $f(x) = 0$ y $\sup_{x \in [0,1]} |x/n| = 1/n \rightarrow 0$. La convergencia es uniforme en $[0, 1]$.

Ejemplo 13.6 (Desplazamiento del máximo). Sea $f_n(x) = nxe^{-nx}$ en $[0, +\infty)$. Para cada $x > 0$ fijo, $f_n(x) \rightarrow 0$; y $f_n(0) = 0$, luego la convergencia es puntual a 0. Sin embargo, el máximo se alcanza en $x = 1/n$ con $f_n(1/n) = e^{-1}$, de modo que $\sup_{x \geq 0} |f_n(x)| = e^{-1} \not\rightarrow 0$: la convergencia **no** es uniforme en $[0, +\infty)$.

Teorema 13.7 (Criterio de Cauchy para convergencia uniforme). $\{f_n\}$ converge uniformemente en X si y solo si para todo $\varepsilon > 0$ existe $N \in \mathbb{N}$ tal que $|f_n(x) - f_m(x)| < \varepsilon$ para todo $n, m > N$ y todo $x \in X$.

Teorema 13.8 (Propiedades de la convergencia uniforme). Sea $\{f_n\}$ una sucesión que converge uniformemente a f en $[a, b]$.

- 1. **Continuidad.** Si cada f_n es continua en $[a, b]$, entonces f es continua en $[a, b]$. En particular, $\lim_{n \rightarrow \infty} \lim_{x \rightarrow x_0} f_n(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x)$.
- 2. **Integrabilidad.** Si cada f_n es Riemann-integrable en $[a, b]$, entonces f es integrable y

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b f_n(x) \, dx = \int_a^b \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) \, dx = \int_a^b f(x) \, dx.$$

- 3. **Derivabilidad.** Si cada $f_n \in C^1[a, b]$, $\{f_n(x_0)\}$ converge para algún $x_0 \in [a, b]$ y $\{f'_n\}$ converge uniformemente en $[a, b]$, entonces f es derivable y $f'(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f'_n(x)$ para todo $x \in [a, b]$.

Observación 13.9. Estos resultados pueden resumirse así: la convergencia uniforme conmuta con los límites, integrales y derivadas. La mera convergencia puntual no garantiza ninguna de estas propiedades. El ejemplo $f_n(x) = x^n$ en $[0, 1]$ ilustra la pérdida de continuidad; $g_n(x) = \sin(nx)/\sqrt{n}$ ilustra la pérdida de derivabilidad en el límite.

Ejemplo 13.10 (Intercambio inválido de derivada y límite). Sea $f_n(x) = \frac{\sin(nx)}{n}$ en $\mathbb{R}$. Entonces $f_n \rightarrow 0$ uniformemente (pues $|f_n(x)| \leq 1/n$), con $f \equiv 0$. Sin embargo, $f'_n(x) = \cos(nx)$, que no converge en ningún x genérico. El Teorema 13.8.3 no se aplica porque $\{f'_n\}$ no converge uniformemente.

Teorema 13.11 (Teorema de Dini). Sea $K \subset \mathbb{R}$ compacto y $\{f_n\}$ una sucesión de funciones continuas en K que converge puntualmente a una función continua f . Si la sucesión es monótona (es decir, $f_n \leq f_{n+1}$ en K para todo n , o al revés), entonces la convergencia es uniforme en K .

Observación 13.12. Las hipótesis del teorema de Dini son todas necesarias: existen contraejemplos si se omite la compacidad, la monotonía o la continuidad del límite.

Teorema 13.13 (Teorema de aproximación de Weierstrass). Sea $f \in C[a, b]$. Para todo $\varepsilon > 0$ existe un polinomio $P(x)$ tal que $\sup_{x \in [a,b]} |f(x) - P(x)| < \varepsilon$.

Observación 13.14. El teorema garantiza que los polinomios son densos en $C[a, b]$ con la norma del supremo, lo que fundamenta métodos de aproximación como la interpolación de Lagrange, los polinomios de Bernstein y los splines.

13.2

Series de funciones

Definición 13.15 (Serie de funciones). Dada $\{u_n(x)\}$ en X , la **serie de funciones** $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ se define por sus sumas parciales $S_N(x) = \sum_{n=1}^N u_n(x)$. La serie converge puntual (resp. uniformemente) a $S(x)$ si $\{S_N(x)\}$ converge puntual (resp. uniformemente) a $S(x)$.

Teorema 13.16 (Prueba M de Weierstrass). Si existe una sucesión numérica $\{M_n\}$ tal que $|u_n(x)| \leq M_n$ para todo $x \in X$ y $\sum_{n=1}^{\infty} M_n < \infty$, entonces $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ converge **absoluta y uniformemente** en X .

Ejemplo 13.17. La serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos(nx)}{n^2}$ en $\mathbb{R}$: $\left| \frac{\cos(nx)}{n^2} \right| \leq \frac{1}{n^2}$ y $\sum 1/n^2$ converge. Por la prueba M, la serie converge absoluta y uniformemente en $\mathbb{R}$. En particular, su suma es una función continua.

Ejemplo 13.18. La serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n^2}$ en $[-1, 1]$: $\left| \frac{x^n}{n^2} \right| \leq \frac{1}{n^2}$ para $|x| \leq 1$. La prueba M da convergencia uniforme en $[-1, 1]$ y permite derivar e integrar término a término en $(-1, 1)$.

Observación 13.19. La prueba M es suficiente pero no necesaria para convergencia uniforme. Una serie puede converger uniformemente sin admitir una mayorante $\sum M_n$ convergente.

Teorema 13.20 (Criterios de Dirichlet y Abel para convergencia uniforme). Sean $\{a_n(x)\}$ y $\{b_n(x)\}$ funciones en X .

- **Dirichlet:** Si las sumas parciales de $\sum b_n(x)$ están uniformemente acotadas en X y $\{a_n(x)\}$ tiende a 0 uniformemente y es monótona en n para cada x , entonces $\sum a_n(x)b_n(x)$ converge uniformemente en X .
- **Abel:** Si $\sum b_n(x)$ converge uniformemente y $\{a_n(x)\}$ es uniformemente acotada y monótona en n para cada x , entonces $\sum a_n(x)b_n(x)$ converge uniformemente.

Teorema 13.21 (Integración y derivación término a término). Si $\sum u_n(x)$ converge uniformemente en $[a, b]$ y cada u_n es continua:

$$\int_a^b \sum_{n=1}^{\infty} u_n(x) \, dx = \sum_{n=1}^{\infty} \int_a^b u_n(x) \, dx.$$

Si además $\sum u'_n(x)$ converge uniformemente en $[a, b]$ y $\sum u_n(x_0)$ converge para algún x_0 :

$$\frac{d}{dx} \sum_{n=1}^{\infty} u_n(x) = \sum_{n=1}^{\infty} u'_n(x).$$

Ejemplo 13.22 (La función de Weierstrass). La función $W(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a^n \cos(b^n \pi x)$, con $0 < a < 1$, b entero impar y $ab > 1 + \frac{3\pi}{2}$, es continua en $\mathbb{R}$ (prueba M: $|a^n \cos(\cdot)| \leq a^n$ y $\sum a^n < \infty$) pero **no es derivable en ningún punto**. Publicada por Weierstrass en 1872, demolió la creencia de que toda función continua es derivable salvo en un conjunto excepcional.

13.3

Series de potencias

Definición 13.23 (Serie de potencias). Una **serie de potencias** centrada en $a \in \mathbb{R}$ tiene la forma:

$$\sum_{n=0}^{\infty} c_n(x-a)^n = c_0 + c_1(x-a) + c_2(x-a)^2 + \cdots$$

donde $\{c_n\}$ son constantes reales.

Teorema 13.24 (Radio e intervalo de convergencia). *Para toda serie de potencias existe un único $R \in [0, +\infty]$ (el **radio de convergencia**) tal que:*

- *La serie converge absolutamente si $|x-a| < R$.*
- *La serie diverge si $|x-a| > R$.*
- *En $|x-a| = R$ el comportamiento debe analizarse por separado.*

El radio se obtiene mediante la **fórmula de Cauchy-Hadamard**:

$$R = \frac{1}{\limsup_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|c_n|}},$$

o bien, si el límite existe, $R = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{c_n}{c_{n+1}} \right|$.

Ejemplo 13.25 (Cálculo del radio de convergencia). 1. $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$: $R = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1/n!}{1/(n+1)!} = \lim_{n \rightarrow \infty} (n+1) = +\infty$. Converge para todo $x \in \mathbb{R}$.

2. $\sum_{n=0}^{\infty} n! x^n$: $R = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n!}{(n+1)!} = 0$. Converge solo en $x = 0$.

3. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n}$: $R = 1$. En $x = 1$: serie armónica (diverge). En $x = -1$: serie alternada armónica (converge). Intervalo: $[-1, 1)$.

4. $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!}$: $R = +\infty$ (serie del coseno).

Teorema 13.26 (Convergencia uniforme en compactos). Si $\sum c_n(x-a)^n$ tiene radio $R > 0$, entonces converge **absoluta y uniformemente** en todo intervalo cerrado $[a-r, a+r]$ con $0 < r < R$.

Observación 13.27. La convergencia uniforme no está garantizada en el intervalo abierto completo $(-R+a, R+a)$. Por ejemplo, $\sum x^n/n$ tiene $R = 1$ y converge uniformemente en $[-r, r]$ para cada $r < 1$, pero no uniformemente en $(-1, 1)$. En los extremos $x = a \pm R$ la convergencia debe verificarse por separado.

Teorema 13.28 (Analiticidad: derivación e integración término a término). Dentro del intervalo $|x-a| < R$, la suma $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n(x-a)^n$ es infinitamente diferenciable y:

$$f'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} n c_n(x-a)^{n-1}, \quad \int_a^x f(t) dt = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{c_n}{n+1} (x-a)^{n+1}.$$

Ambas series tienen el mismo radio de convergencia R .

Teorema 13.29 (Serie de Taylor). Si f tiene representación en serie de potencias en un entorno de a , dicha representación es única y sus coeficientes son $c_n = \frac{f^{(n)}(a)}{n!}$. La **serie de Taylor** de f en a es:

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(a)}{n!} (x-a)^n.$$

La serie converge a $f(x)$ si y solo si el resto de Lagrange $R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x-a)^{n+1}$ satisface $R_n(x) \rightarrow 0$ cuando $n \rightarrow \infty$ (para algún ξ entre a y x).

Ejemplo 13.30 (Expansiones estándar). ■ $e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}, \quad x \in \mathbb{R}.$

- $\sin x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)!}, \quad \cos x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!}, \quad x \in \mathbb{R}.$
- $\ln(1+x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1} x^n}{n}, \quad x \in (-1, 1].$
- $\frac{1}{1-x} = \sum_{n=0}^{\infty} x^n, \quad |x| < 1.$
- $\arctan x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{2n+1}, \quad |x| \leq 1.$
- $(1+x)^\alpha = \sum_{n=0}^{\infty} \binom{\alpha}{n} x^n, \quad |x| < 1, \quad \text{donde } \binom{\alpha}{n} = \frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)}{n!}.$

Ejemplo 13.31 (Aplicaciones de las series de Taylor). 1. **Límites indeterminados:**

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - x}{x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\left(x - \frac{x^3}{6} + O(x^5)\right) - x}{x^3} = -\frac{1}{6}.$$

2. **Indeterminación 1^∞ :**

$$\lim_{x \rightarrow 0} (\cos x)^{1/x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} e^{\ln(\cos x)/x^2}.$$

Como $\ln(\cos x) = \ln\left(1 - \frac{x^2}{2} + O(x^4)\right) \sim -\frac{x^2}{2}$, el exponente tiende a $-1/2$ y el límite es $e^{-1/2}$.

3. **Integral sin primitiva elemental:**

$$\int_0^1 e^{-x^2} dx = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n! (2n+1)} \approx 0,7468 \dots$$

4. **Estimación del error:** Aproximar e con error $< 10^{-4}$. El resto de la serie de e^1 satisface $R_N < \frac{3}{(N+1)!}$. Para $N = 8$: $3/9! \approx 8 \times 10^{-6} < 10^{-5}$.

5. **Ecuaciones diferenciales:** La ecuación de Airy $y'' = xy$ se resuelve sustituyendo $y = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ y determinando los coeficientes por recurrencia: $a_{n+3} = \frac{a_n}{(n+2)(n+3)}$, con condiciones iniciales $a_0 = y(0)$ y $a_1 = y'(0)$.

13.4

Complementos avanzados

Teorema 13.32 (Irracionalidad de e). El número $e = \sum_{n=0}^{\infty} 1/n!$ es irracional. Si $e = p/q$, entonces

$$0 < q! \left(e - \sum_{n=0}^q \frac{1}{n!} \right) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{(q+1)(q+2)\cdots(q+k)} < \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{(q+1)^k} = \frac{1}{q} \leq 1,$$

contradiciendo que la expresión de la izquierda sería un entero positivo.

Teorema 13.33 (Teorema de Borel). *Dada cualquier sucesión $\{a_n\}_{n=0}^\infty$ de números reales, existe una función $f \in C^\infty(\mathbb{R})$ tal que $f^{(n)}(0) = a_n$ para todo n . Es decir, cualquier sucesión puede ser la sucesión de coeficientes de Taylor de alguna función infinitamente diferenciable.*

Observación 13.34. *El teorema de Borel muestra que la clase C^∞ es mucho más amplia que la de las funciones analíticas. Tener derivadas de todos los órdenes **no** implica que la serie de Taylor converja a la función.*

Ejemplo 13.35 (Función C^∞ no analítica). Defínase

$$\varphi(x) = \begin{cases} e^{-1/x^2} & x \neq 0, \\ 0 & x = 0. \end{cases}$$

Por inducción se demuestra que $\varphi^{(n)}(0) = 0$ para todo $n \in \mathbb{N}_0$. Luego su serie de Taylor en 0 es la serie nula, que converge a 0 para todo x , pero $\varphi(x) \neq 0$ para $x \neq 0$. Así, $\varphi \in C^\infty(\mathbb{R})$ pero **no es analítica en 0**.

Esta función es la piedra de toque con la que se construyen las funciones meseta y las particiones de la unidad, herramientas indispensables en análisis diferencial y teoría de distribuciones.

Observación 13.36. *La condición $R_n(x) \rightarrow 0$ (convergencia del resto de Taylor) es una hipótesis adicional, no automática para funciones de clase C^∞ . La **analiticidad** es una propiedad más restrictiva y “rígida” que la diferenciabilidad infinita.*

Teorema 13.37 (Unicidad y álgebra de series de potencias). *Si $\sum a_n(x-c)^n = \sum b_n(x-c)^n$ en algún intervalo con centro c , entonces $a_n = b_n$ para todo n . Dentro del radio de convergencia, las series de potencias pueden:*

- **Sumarse:** con radio $\geq \min(R_1, R_2)$.
- **Multiplícase** (producto de Cauchy): con radio $\geq \min(R_1, R_2)$.
- **Componerse:** si $g(0) = 0$ (o más generalmente $|g(x)| < R_f$), entonces $f(g(x))$ se puede expandir en serie de potencias con radio positivo.

Observación 13.38. *La teoría de series de potencias cierra un ciclo conceptual que une la aritmética de los reales, el análisis de funciones y los métodos de aproximación. Estas herramientas son la base del análisis complejo, la teoría de ecuaciones diferenciales ordinarias, la física matemática y los métodos numéricos modernos.*

Bibliografía

- [Bourchtein and Bourchtein, 2022] Bourchtein, A. and Bourchtein, L. (2022). *Theory of Infinite Sequences and Series*. Springer Nature Switzerland / Birkhäuser, Cham, Switzerland.
- [Larson and Edwards, 2010] Larson, R. and Edwards, B. H. (2010). *Cálculo 1 de una variable*. McGraw-Hill Interamericana, México, 9 edition.
- [Leithold, 1998] Leithold, L. (1998). *El Cálculo*. Oxford University Press - Harla México, México, 7 edition.
- [Piskunov, 1977a] Piskunov, N. (1977a). *Cálculo diferencial e integral*, volume 1. Editorial Mir, Moscú.
- [Piskunov, 1977b] Piskunov, N. (1977b). *Cálculo diferencial e integral*, volume 2. Editorial Mir, Moscú.
- [Purcell et al., 2007] Purcell, E. J., Varberg, D., and Rigdon, S. E. (2007). *Cálculo*. Pearson Educación, México, 9 edition.
- [Smith et al., 2019] Smith, R. T., Minton, R. B., and Rafhi, Z. A. T. (2019). *Cálculo: Trascendentes Tempranas*. McGraw-Hill, México, 5 edition.
- [Spivak, 2012] Spivak, M. (2012). *Calculus*. Editorial Reverté, Barcelona, 3 edition. Versión española de la 4ta edición original.
- [Stewart, 2012] Stewart, J. (2012). *Calculus*. Cengage Learning, 7 edition.