

IUT GEII – Outils Mathématiques et Logiciels (OML2)

Fractions rationnelles

Andrés F. López-Lopera
Laboratoire de Mathématiques pour l'Ingénieur (LMI)
Université Polytechnique Hauts-de-France (UPHF)
2021 – 2022

1. Fractions rationnelles
2. Décomposition en éléments simples
3. Méthodes de calcul des coefficients

Fractions rationnelles

- Ici, on s'intéresse à découper en plusieurs fractions élémentaires, une fraction initial résultant du quotient de deux polynômes, e.g. :

$$\frac{P(x)}{Q(x)} = \frac{x + \alpha}{(x - \beta)(x + \delta)} = \frac{A}{(x - \beta)} + \frac{B}{(x + \delta)}$$

- Les fractions rationnelles vont permettre la résolution d'intégrales :

$$\int \frac{x + \alpha}{(x - \beta)(x + \delta)} dx = \int \frac{A}{(x - \beta)} dx + \int \frac{B}{(x + \delta)} dx$$

- Dans les domaines des sciences et des techniques, cette démarche représente un outil très utile permettant la caractérisation de système
 - e.g., on pourra écrire la fonction de transfert donnée par la transformée de Laplace d'un tel système pour le caractériser

- On appelle *fraction rationnelle* tout fonction F telle que :

$$F : \begin{cases} \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} & (\text{ou } \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}) \\ F = \frac{P}{Q} \end{cases},$$

où P et Q sont deux polynômes à coefficients réelles (où à coefficients complexes)

Exemple.

$$F(x) = \frac{P(x)}{Q(x)} = \frac{x^2 - 1}{(x - 1)(x + 2)}$$

- On dit qu'une fraction rationnelles F est *irréductible* si P et Q n'ont pas de racines communes dans \mathbb{C} , e.g. :

$$\frac{P(x)}{Q(x)} = \frac{x+1}{(x-2)(x+3j)}$$

- Soit F une fraction rationnelles irréductible et soit α un nombre complexe
 - α est un *zéro* de F (ou une *racine*) si $F(\alpha) = 0$ (c'est-à-dire une racine de P)
 - α est un *pôle* de F si α est une *racine* de Q
 - α est un *pôle d'ordre k* de F si α est une *racine d'ordre k* de Q

Exemple.

$$F(x) = \frac{P(x)}{Q(x)} = \frac{x + \alpha}{(x - \beta)(x + \delta)^2}$$

Dans cet exemple :

- α est un zéro de F
- β est un pôle de F
- δ est un pôle d'ordre k de F

Théorème. Soit $F = \frac{P}{Q}$ une fraction rationnelle irréductible. Il existe deux polynômes uniques E et R tels que

$$\begin{cases} F = E + \frac{R}{Q} \\ \deg(R) < \deg(Q) \end{cases}$$

- On appelle E la *partie entière* de F
- Si $\deg(P) < \deg(Q)$ alors $E = 0$. Sinon il faut effectuer la division euclidienne de P par Q et on a $\deg(E) = \deg(P) - \deg(Q)$

Exemple. Considérez la fraction rationnelle donnée par :

$$F(x) = \frac{x^4 + 3x^2 - x + 1}{x^2 + 1}$$

· On effectue tout d'abord la division euclidienne :

$$\begin{array}{r|l} x^4 + 3x^2 - x + 1 & x^2 + 1 \\ -x^4 - x^2 & x^2 + 2 \\ \hline 2x^2 - x + 1 & \\ -2x^2 & -2 \\ \hline -x - 1 & \end{array}$$

· Finalement, on obtient :

$$F(x) = \frac{x^4 + 3x^2 - x + 1}{x^2 + 1} = \frac{(x^2 + 1)(x^2 + 2) + (-x - 1)}{x^2 + 1} = x^2 + 2 - \frac{x + 1}{x^2 + 1}$$

d'où on obtient $E = x^2 + 2$, $R = -(x + 1)$ et $Q = x^2 + 1$

Décomposition en éléments simples

Décomposition en éléments simples sur \mathbb{C}

· Soit $F = \frac{P}{Q}$ une fraction rationnelles irréductible, où le polynôme Q se factorise sur \mathbb{C} sous la forme :

$$Q(x) = (x - \alpha_1)^{k_1} (x - \alpha_2)^{k_2} \cdots (x - \alpha_r)^{k_r},$$

où $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ sont les racines complexes de Q d'ordre k_1, k_2, \dots, k_r .

· Alors, il existe un unique polynôme E et d'uniques nombres complexes A_{ij} (avec $1 \leq i \leq r$ et $1 \leq j \leq k_i$) tels que

$$\begin{aligned} F(x) = E(x) + & \quad \text{(partie entière)} \\ & \frac{A_{11}}{(x - \alpha_1)} + \frac{A_{12}}{(x - \alpha_1)^2} + \cdots + \frac{A_{1k_1}}{(x - \alpha_1)^{k_1}} + \quad \text{(partie principale par ligne)} \\ & \frac{A_{21}}{(x - \alpha_2)} + \frac{A_{22}}{(x - \alpha_2)^2} + \cdots + \underbrace{\frac{A_{2k_2}}{(x - \alpha_2)^{k_2}}}_{\text{élément simple 1ère espèce}} + \\ & \dots \\ & \frac{A_{r1}}{(x - \alpha_r)} + \frac{A_{r2}}{(x - \alpha_r)^2} + \cdots + \frac{A_{rk_r}}{(x - \alpha_r)^{k_r}} \end{aligned}$$

Exemples.

$$F_1(x) = \frac{x-3}{(x+1)^2(x-j)(x+j)} = \frac{A_{11}}{(x+1)} + \frac{A_{12}}{(x+1)^2} + \frac{A_2}{(x-j)} + \frac{A_3}{(x+j)}$$

$$F_2(x) = \frac{1}{(x-2)^3(x-5)^2} = \frac{A_{11}}{(x-2)} + \frac{A_{12}}{(x-2)^2} + \frac{A_{13}}{(x-2)^3} + \frac{A_{21}}{(x-5)} + \frac{A_{22}}{(x-5)^2}$$

· Soit $F = \frac{P}{Q}$ une fraction rationnelles irréductible, où le polynôme Q se factorise sur \mathbb{R} sous la forme :

$$Q(x) = (x - \alpha_1)^{k_1} \cdots (x - \alpha_r)^{k_r} (x^2 + p_1x + q_1)^{l_1} \cdots (x^2 + p_sx + q_s)^{l_s}$$

où $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ sont les racines réelles de Q d'ordre k_1, k_2, \dots, k_r ;
 $(x^2 + p_i x + q_i)^{l_i}$ sont les polynômes de degré 2 à discriminant négatif (donc irréductible sur \mathbb{R})

Décomposition en éléments simples sur \mathbb{R}

· Il existe un unique polynôme E et d'uniques nombres réels A_{ij} , B_{ij} et C_{ij} tels que

$$\begin{aligned}
 F(x) = & E(x) + && \text{(partie entière)} \\
 & \frac{A_{11}}{(x - \alpha_1)} + \frac{A_{12}}{(x - \alpha_1)^2} + \cdots + \frac{A_{1k_1}}{(x - \alpha_1)^{k_1}} + && \text{(partie principale par ligne)} \\
 & \dots \\
 & \frac{A_{r1}}{(x - \alpha_r)} + \frac{A_{r2}}{(x - \alpha_r)^2} + \cdots + \underbrace{\frac{A_{rk_r}}{(x - \alpha_r)^{k_r}}}_{\text{élément simple 1ère espèce}} + \\
 & \frac{B_{11}x + C_{11}}{(x^2 + p_1x + q_1)} + \frac{B_{12}x + C_{12}}{(x^2 + p_1x + q_1)^2} + \cdots + \underbrace{\frac{B_{1l_1}x + C_{1l_1}}{(x^2 + p_1x + q_1)^{l_1}}}_{\text{élément simple 2ème espèce}} + \\
 & \dots \\
 & \frac{B_{s1}x + C_{s1}}{(x^2 + p_sx + q_s)} + \frac{B_{s2}x + C_{s2}}{(x^2 + p_sx + q_s)^2} + \cdots + \frac{B_{sl_s}x + C_{sl_s}}{(x^2 + p_sx + q_s)^{l_s}}
 \end{aligned}$$

Exemple. On considère la fraction rationnelle donnée par :

$$F(x) = \frac{x^3 - 21x - 7}{(x + 2)(x - 1)^2(x^2 + 1)}$$

Exemple. On considère la fraction rationnelle donnée par :

$$F(x) = \frac{x^3 - 21x - 7}{(x+2)(x-1)^2(x^2+1)}$$

· La décomposition en éléments simple sur \mathbb{R} est de la forme :

$$F(x) = \frac{A_1}{(x+2)} + \frac{A_{21}}{(x-1)} + \frac{A_{22}}{(x-1)^2} + \frac{B_1x + C_1}{(x^2+1)}$$

· La décomposition en éléments simple sur \mathbb{C} est de la forme :

$$F(x) = \frac{A_1}{(x+2)} + \frac{A_{21}}{(x-1)} + \frac{A_{22}}{(x-1)^2} + \frac{A_3}{(x-j)} + \frac{A_4}{(x+j)}$$

Note. Puisque j et $\bar{j} = -j$ sont racines complexes de (x^2+1) , les coefficients A_3 et A_4 seront conjugué l'un de l'autre

Méthodes de calcul des coefficients

Pôles simples

· Cette méthode permet de calculer le coefficient d'un élément simple correspondant à un pôle simple :

$$F(x) = \frac{P(x)}{Q(x)} = \frac{P(x)}{(x - \alpha)Q_1(x)} = \frac{A}{(x - \alpha)} + \dots, \quad (1)$$

où α est un pôle simple

Principe :

1. On multiplie (1) par $(x - \alpha)$:

$$(x - \alpha)F(x) = \frac{P(x)}{Q_1(x)} = A + (x - \alpha) \cdot [\dots]$$

2. On prend $x = \alpha$:

$$\frac{P(\alpha)}{Q_1(\alpha)} = A$$

· On résume ce principe en écrivant : $A = [(x - \alpha)F(x)]_{x=\alpha}$

Exemple. Décomposer en éléments simple la fraction rationnelle :

$$F(x) = \frac{x^3 - 21x - 7}{(x+2)(x-1)^2(x^2+1)}$$

Solution.

$$F(x) = \frac{x^3 - 21x - 7}{(x+2)(x-1)^2(x^2+1)} = \frac{A_1}{(x+2)} + \frac{A_{21}}{(x-1)} + \frac{A_{22}}{(x-1)^2} + \frac{B_1x + C_1}{(x^2+1)}$$

· Calcul de A_1 :

$$A_1 = [(x+2)F(x)]_{x=-2} = \left[\frac{x^3 - 21x - 7}{(x-1)^2(x^2+1)} \right]_{x=-2} = \frac{3}{5}$$

Pôles multiples “dernier” coefficient

· La méthode précédente permet également de calculer le coefficient d'un élément simple d'ordre maximal pour un pôle donné :

$$F(x) = \frac{P(x)}{Q(x)} = \frac{P(x)}{(x - \alpha)^n Q_1(x)} = \frac{A_1}{(x - \alpha)} + \cdots + \frac{A_n}{(x - \alpha)^n} + \cdots, \quad (2)$$

où α est un pôle d'ordre n

Principe :

1. On multiplie (2) par $(x - \alpha)^n$:

$$(x - \alpha)^n F(x) = \frac{P(x)}{Q_1(x)} = A_1(x - \alpha)^{n-1} + \cdots + A_n + (x - \alpha)^n \cdot [\cdots]$$

2. On prend $x = \alpha$:

$$\frac{P(\alpha)}{Q_1(\alpha)} = A_n$$

· On résume ce principe en écrivant : $A_n = [(x - \alpha)^n F(x)]_{x=\alpha}$

Exemple (continuation).

$$F(x) = \frac{x^3 - 21x - 7}{(x+2)(x-1)^2(x^2+1)} = \frac{A_1}{(x+2)} + \frac{A_{21}}{(x-1)} + \frac{A_{22}}{(x-1)^2} + \frac{B_1x + C_1}{(x^2+1)}$$

· Calcul de A_{22} :

$$A_{22} = [(x-1)^2 F(x)]_{x=1} = \left[\frac{x^3 - 21x - 7}{(x+2)(x^2+1)} \right]_{x=1} = -\frac{9}{2}$$

Remarque. On ne peut calculer que le coefficient d'ordre 2 avec la méthode précédente

$$A_{21} \neq [(x-1)F(x)]_{x=1}$$

$$[(x-1)F(x)]_{x=1} = \left[\frac{x^3 - 21x - 7}{(x+2)(x-1)(x^2+1)} \right]_{x=1} = \left[A_{21} + \frac{A_{22}}{(x-1)} \right]_{x=1}$$

Forme quadratique “dernier” coefficient

· La même méthode permet de calculer le coefficient d'un élément simple de 2-ème espèce d'ordre maximal pour un facteur quadratique donné :

$$F(x) = \frac{P(x)}{(x^2 + px + q)^n Q_1(x)} = \frac{B_1x + C_1}{(x^2 + px + q)} + \cdots + \frac{B_nx + C_n}{(x^2 + px + q)^n} + \cdots, \quad (3)$$

Principe :

1. On multiplie (3) par $(x^2 + px + q)^n$:

$$(x^2 + px + q)^n F(x) = (B_1x + C_1)(x^2 + px + q)^{n-1} + \cdots + (B_nx + C_n) + (x^2 + px + q)^n \cdot [\cdots],$$

2. On pose $x = \alpha$, où α est une racine de $(x^2 + px + q)$

$$\frac{P(\alpha)}{Q_1(\alpha)} = B_nj + C_n$$

3. Dans l'équation obtenue, on trouve B_n et C_n en identifiant parties réelles et imaginaires

Exemple (continuation).

$$F(x) = \frac{x^3 - 21x - 7}{(x+2)(x-1)^2(x^2+1)} = \frac{A_1}{(x+2)} + \frac{A_{21}}{(x-1)} + \frac{A_{22}}{(x-1)^2} + \frac{B_1x + C_1}{(x^2+1)}$$

· Calcul de B_1 et C_1 : une racine de $x^2 + 1$ est donnée par $\alpha = j$

$$jB_1 + C_1 = [(x^2 + 1)F(x)]_{x=j} = \frac{j^3 - 21j - 7}{(j+2)(j-1)^2} = -j\frac{36}{10} + \frac{37}{10},$$

d'où on obtient $B_1 = \frac{18}{5}$ et $C_1 = \frac{37}{10}$

La limite en $+\infty$

· Cette méthode consiste à multiplier d'abord par x , et à en prendre la limite lorsque $x \rightarrow \infty$

Exemple (continuation).

$$\lim_{x \rightarrow \infty} x \frac{x^3 - 21x - 7}{(x+2)(x-1)^2(x^2+1)} = \lim_{x \rightarrow \infty} \left[x \frac{A_1}{(x+2)} + x \frac{A_{21}}{(x-1)} + x \frac{A_{22}}{(x-1)^2} + x \frac{B_1x + C_1}{(x^2+1)} \right],$$

d'où on obtient

$$0 = A_1 + A_{21} + B_1 \quad \rightarrow \quad A_{21} = -A_1 - B_1 = 3$$

Les valeurs particulières

- La méthode consiste à prendre pour x de valeurs particulières et ainsi d'avoir un système d'équations qui permet déterminer les coefficients manquants

Exemple (continuation).

- Si on considère $x = 0$, on obtient :

$$F(0) = \left[\frac{x^3 - 21x - 7}{(x+2)(x-1)^2(x^2+1)} \right]_{x=0} = \left[\frac{A_1}{(x+2)} + \frac{A_{21}}{(x-1)} + \frac{A_{22}}{(x-1)^2} + \frac{B_1x + C_1}{(x^2+1)} \right]_{x=0},$$

d'où on obtient :

$$-\frac{7}{2} = \frac{A_1}{2} - A_{21} + A_{22} + C_1,$$

et finalement :

$$A_{21} = \frac{7}{2} + \frac{A_1}{2} + A_{22} + C_1 = \frac{7}{2} + \frac{3}{10} - \frac{9}{2} + \frac{37}{10} = 3$$

La méthode de “secours” : mise au même dénominateur et identification

- Cette méthode consiste à mettre la décomposition en éléments simples au même dénominateur et à ensuite identifier les différents coefficients

Exemple.

$$F(x) = \frac{1}{(x+1)(x+2)} = \frac{A}{(x+1)} + \frac{B}{(x+2)}$$

- On multiplie par $(x+1)(x+2)$:

$$(x+1)(x+2)F(x) = 1 = A(x+2) + B(x+1) = (A+B)x + (2A+B),$$

d'où on obtient le système d'équations :

$$A + B = 0$$

$$2A + B = 1$$