



Diurex 80 WG



** Herbicida pre y post-emergente temprano.*

** Amplio espectro de control de hoja ancha y gramíneas.*

** Herbicida selectivo a dosis bajas*

Diurex 80 WG

GENERALIDADES

DIUREX 80 WG es un herbicida sistémico residual derivado de la urea. Controla una gran variedad de malezas de hoja ancha y angosta. Puede ser aplicado tanto en pre-emergencia como en post emergencia dirigida de las malezas.

DIUREX 80 WG está recomendado para ser usado en los cultivos de Caña de Azúcar y Piña.

MODO DE ACCIÓN

Por ser la vía radicular la forma más importante de absorción de **DIUREX 80 WG**, este precisa ser activado por lluvia o irrigación para llevar el herbicida a la región donde se ubican las semillas y las raíces, asimismo es poco soluble en agua, por esto permanecerá cerca de la superficie debido a su capacidad de ser adsorbido por los coloides del suelo. Debido a esta propiedad es que en los suelos arcillosos y/o ricos en materia orgánica se usan las dosis más altas y en suelos arenosos las dosis más bajas para evitar el peligro de ser lixiviado y llegar a las raíces de los cultivos menos tolerantes.

MODO DE APLICACIÓN

Disuelva la dosis indicada de **DIUREX 80 WG** en un poco de agua hasta obtener una pasta uniforme en un recipiente separado. Llene la pulverizadora con la mitad del volumen de agua necesario. Añada al tanque la premezcla del producto manteniendo el agitador mecánico en funcionamiento y acabe de llenar el tanque con el volumen total de agua requerido.

MÉTODO DE APLICACIÓN

El producto debe ser aplicado con equipos adecuados que posean agitación continua. Cuando se está pulverizando, evitar paradas, marchas lentas y goteras, así como mantener presión uniforme. Con equipos terrestres no usar menos de 200 litros de agua / ha. con equipos aéreos no usar menos de 50 litros de agua/ha.

PRINCIPALES MALEZAS CONTROLADAS

Hoja Ancha		Hoja Angosta	
<i>Sida rhombifolia</i> L.	Malva taporita	<i>Cyperus rotundus</i>	Coquito
<i>Tridax procumbens</i> L.	Falsa sanana	<i>Echinochloa colona</i>	Pasto colorado
<i>Chenopodium album</i>	Quinua	<i>Eleusine indica</i>	Pata de gallo
<i>Amaranthus quitensis</i>	Chiori	<i>Paspalum notatum</i> F.	Gramma negra
		<i>Rottboellia cochinchinensis</i> C.	Rogelia

CAÑA DE AZÚCAR

Aplicar luego del corte o el plantío. El tratamiento puede ser repetido pero no se debe exceder los 8 kg/ha. por año de cultivo.

Dosis: 1,5 - 2,0 kg/ha.

PIÑA

Diurex 80 WG, debe ser aplicado al cultivo en forma dirigida cuando las malezas tengan de 2-3 hojas verdaderas. El tratamiento puede ser repetido pero no se debe exceder los 8 kg/ha. por ciclo del cultivo.

Dosis: 2,5 - 3,0 kg/ha.



Tercer Anillo esq. Av. La Salle
Telf.: (3) 33 88 100
www.mainter.com.bo
Santa Cruz - Bolivia