

	REGISTRO	Código: AR-IN-01-02 Versión: 0 Edición: 03-11-12 Página 1 de 2
	CATALOGO DE PRODUCTOS	



FOXTRINE

Fabricante	:	Tagros Chemical Ltd. – India
Composición	:	Deltametrina 2,5 % SC
Clasificación química	:	Piretroide
Formulación	:	Suspensión concentrada
Clase toxicológica	:	IV, Etiqueta Verde (Precaución)

Información General

FOXTRINE es un insecticida recomendado para el control de insectos rastreros (cucarachas, hormigas) e insectos voladores (mosquitos, moscas).


Especialmente indicado para desinfectar casas, viviendas, hoteles, escuelas, almacenes, depósitos, recomendado para interiores.

Modo de acción

La formulación de FOXTRINE permite obtener un muy buen efecto inicial y un prolongado efecto residual de control en diferentes superficies. No mancha las superficies tratadas, es estable a la luz y el calor y su mecanismo de acción es por contacto.

Modo de aplicación

PLAGA	USO
CONTROL DE INSECTOS VOLADORES	<p>Tratamiento:</p> <p>Diluir 30 ml de FOXTRINE en 5 litros de agua. Diluir 60 ml de FOXTRINE en 10 litros de agua. Diluir 120 ml de FOXTRINE en 20 litros de agua.</p> <p>Tasa de aplicación: 5 litros de este liquido por 100 m2.</p>
CONTROL DE INSECTOS RASTREROS	<p>Tratamiento:</p> <p>Diluir 50 ml de FOXTRINE en 5 litros de agua. Diluir 100 ml de FOXTRINE en 10 litros de agua. Diluir 200 ml de FOXTRINE en 20 litros de agua.</p> <p>Tasa de aplicación: 5 litros de este liquido por 100 m2.</p>

	REGISTRO	Código: AR-IN-01-02 Versión: 0 Edición: 03-11-12 Página 2 de 2
	CATALOGO DE PRODUCTOS	

Advertencias

No manipular con las manos desnuda - No comer, beber, fumar o mascar durante la aplicación - En los tratamientos de cocina o áreas de alimentos, retirar o cubrir los utensilios propios para la elaboración de los mismos durante la aplicación - Mantener alejado del alcance de los niños y de personas inexpertas - Lavar la piel contaminada y la ropa después de usada - Destruir contenedores vacíos después de su uso - En caso de contacto con la piel y ojos, lávelos inmediatamente con abundante agua durante al menos 15 minutos - En caso de ingestión, beber uno o dos vasos de agua e induzca el vómito - Llamar al médico que trata los síntomas.