



MAKHTESHIM
A G A N



MAYORAL®
herbicida para caña

POR MÁS DE
100 DÍAS
CAÑA LIMPIA

UN NUEVO CONCEPTO EN HERBICIDAS PARA CAÑA



MAYORAL es un herbicida residual pre-emergente para Caña planta y Caña soca, compuesto por una mezcla de dos herbicidas.

Esta mezcla equilibrada permite obtener un excelente control en malezas difíciles, asegurando un período prolongado de más de **100 días** sin la competencia de las mismas.



En Su Cultivo de Caña.
SOLO CAÑA

Un Producto. Muchos Beneficios.

- ➔ Máxima residualidad.
- ➔ Excelente control de malezas difíciles en Caña hoja y Caña soca.
- ➔ Bajo costo de control por más tiempo.
- ➔ Disminución de las labores en el cultivo.
- ➔ Mejor establecimiento y arranque inicial del cultivo.
- ➔ Menor competencia inicial: cultivo vs malezas.
- ➔ El producto no se retiene en el rastrojo, por lo que no es una limitante para la acción herbicida.




Modo de Acción

Su modo de absorción se da por hojas y raíces, siendo rápidamente traslocado vía xilema y floema, acumulándose en los tejidos meristemáticos de las malezas.

Síntomas de control: El cese del crecimiento ocurre poco después del tratamiento, pero la acción de **MAYORAL** será evidente pocas semanas después de la aplicación. En las malezas emergidas se observa una disminución del crecimiento y acortamiento de entrenudos.



Momento de Aplicación



Aplicar en **PRE-EMERGENCIA** del cultivo de la caña (antes del brote).

Caña hoja: puede aplicarse inmediatamente después de la siembra.

Caña soca: una vez cosechada, se aplica antes de la brotación; no hay retención por el rastrojo, se va incorporando al suelo con el rocío o lluvia.

Al ser herbicida pre-emergente requiere condiciones de humedad de suelo adecuadas.

Recomendaciones de Uso

Malezas	Dosis	Momento de Aplicación
Bremura (<i>Cynodon dactylon</i>) Coquito (<i>Cyperus rotundus</i>) Rogelia (<i>Rottboellia cochinchinensis</i>) Pata de gallo (<i>Eleusine indica</i> L.) Camotillo (<i>Ipomoea purpurea</i>) Santa Lucia (<i>Commelina diffusa</i>) Chiori (<i>Amaranthus</i> ssp.)	Suelos livianos 500 cc/ha	<p>Aplicar en PREEMERGENCIA DEL CULTIVO en caña hoja o soca.</p> <p>Se puede aplicar en preemergencia o post emergencia temprana de las malezas.</p> <p>Para alcanzar la máxima actividad del producto aplicar en malezas no emergidas o que no superen las 4 hojas verdaderas y estén en un período de activo crecimiento.</p>
	Suelos pesados 600 cc/ha	

MAYORAL, no se retiene en el rastrojo, por lo que no es un limitante para la acción del producto.



Tercer Anillo esq. Av. La Salle • Telf. (3) 33 88 100 • Fax (3) 342 6839
www.mainter.com.bo • E-mail: mainter@mainter.com.bo • Santa Cruz - Bolivia