




ATRANEX

90 WG

Herbicida pre-emergente y post-emergente
Eficiente control de hoja ancha y hoja angosta.
Amplio rango de absorción (raíces y hojas).
Acción residual prolongada.
Fácil manejo y manipuleo.

www.mainter.com.bo

 **MAINTER**
DIVISION AGRO



GENERALIDADES

Atranex 90 WG es un herbicida perteneciente al grupo de las triazinas. Es un herbicida que puede ser usado tanto en pre-emergencia como en post-emergencia temprana. Controla a su vez malezas de hoja ancha y hoja angosta. Puede ser utilizado con seguridad en los cultivos de Maíz y Sorgo. Para potenciar el efecto del producto este puede ser usado en mezcla con otros herbicidas.

MODO DE ACCION

Atranex 90 WG es un herbicida de acción sistémica y residual, que se trasloca hacia arriba a través del xilema, se acumula en los meristemas apicales y en las hojas. Es absorbido tanto por las raíces como por las hojas, pero principalmente por las raíces. El producto es un inhibidor de la fotosíntesis que causa clorosis seguida de la muerte de la maleza. Para tener una buena acción del producto se hace necesaria la activación de este, ya sea por lluvia o irrigación. Se necesitan por lo menos 20 mm. para una activación eficaz.

MOMENTO DE APLICACION

La aplicación del producto debe ser efectuada antes de la emergencia del cultivo o en post-emergencia temprana (malezas de hasta 5 cm).

MODO DE APLICACION

Disuelva la dosis indicada de Atranex 90 WG en un poco de agua hasta lograr una pasta uniforme. Llene la pulverizadora con la mitad del volumen de agua necesario. Añada al tanque la premezcla del producto manteniendo el agitador mecánico en funcionamiento acabe de llenar el tanque con el volumen total de agua requerido. En las aplicaciones en post-emergencia se deberá añadir aceite mineral al 1%.

METODO DE APLICACIÓN

Con equipos terrestres no usar menos de 200 litros de agua por hectárea, con equipos aéreos no usar menos de 50 litros de agua por hectárea. En todo los casos se debe asegurar una distribución uniforme.

PRINCIPALES MALEZAS CONTROLADAS

Hoja Ancha	Hoja Angosta
Chiori	Rogelia
Sanana	<i>Rottboellia cochinchinensis</i>
Leche leche	
Chupurujume	
Verdolaga	
Malva taporita	
Emilia	
Torito	

USOS Y DOSIS RECOMENDADAS

Cultivo	Epoca y Dosis de Aplicación
Maíz	Aplicar el producto inmediatamente después de la siembra (pre-emergencia) o en post-emergencia siempre y cuando las malezas no tengan mas de 5 cm. Dosis pre-emergencia 1.0 a 1.5 kg/ha, post-emergencia 1.5 a 2.0 kg/ha.
Sorgo	Aplicar el producto inmediatamente después de la siembra (pre-emergencia) o en post-emergencia siempre y cuando las malezas no tengan mas de 5 cm. Dosis pre-emergencia 1.0 a 1.5 kg/ha, post-emergencia 1.5 a 2.0 kg/ha.

