

Geometría multisimpléctica: primeras definiciones y propiedades básicas.

Ángel Blasco Muñoz

Escuela Internacional de Doctorado, Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), España.

8 de enero de 2026



Referencias.

- [1] Ralph Abraham y Jerrold E. Marsden. *Foundations of mechanics*. 2nd ed. AMS Chelsea Pub./American Mathematical Society, 2008.
- [2] F. Cantrijn, A. Ibort y M. De León. "Hamiltonian structures on multisymplectic manifolds". En: *Rend. Sem. Mat. Univ. Politec. Torino* 54.3 (1996), págs. 225-236.
- [3] F. Cantrijn, A. Ibort y M. De León. "On the geometry of multisymplectic manifolds". En: *J. Aust. Math. Soc. A* 66.3 (1999), págs. 303-330.
- [4] J. F. Cariñena, M. Crampin y L. A. Ibort. "On the multisymplectic formalism for first order field theories". En: *Differential Geometry and its Applications* 1.4 (1991), págs. 345-374.
- [5] Paulette Libermann y Charles-Michel Marle. *Symplectic Geometry and Analytical Mechanics*. Springer Netherlands, 1987.

Contenidos.

- 1 Introducción.
- 2 Espacios vectoriales multisimpléticos.
- 3 Subespacios característicos.
- 4 Caracterización de las estructuras multisimpléticas canónicas.
- 5 Variedades multisimpléticas.
- 6 Estructuras Hamiltonianas en variedades multisimpléticas.
- 7 Modelos canónicos para variedades multisimpléticas. Coordenadas de Darboux.

Contenidos.

- 1 Introducción.
- 2 Espacios vectoriales multisimplécticos.
- 3 Subespacios característicos.
- 4 Caracterización de las estructuras multisimplécticas canónicas.
- 5 Variedades multisimplécticas.
- 6 Estructuras Hamiltonianas en variedades multisimplécticas.
- 7 Modelos canónicos para variedades multisimplécticas. Coordenadas de Darboux.

Se pretende ofrecer una introducción a la Geometría Multisimpléctica basada en el estudio de [2] y [3] y ver sus propiedades básicas, las cuales forman un marco abstracto de estudio para la teoría clásica de campos, la geometría mecánica, la dinámica... y demás ramas relacionadas con la física-matemática.

Contenidos.

- 1 Introducción.
- 2 Espacios vectoriales multisimpléticos.
- 3 Subespacios característicos.
- 4 Caracterización de las estructuras multisimpléticas canónicas.
- 5 Variedades multisimpléticas.
- 6 Estructuras Hamiltonianas en variedades multisimpléticas.
- 7 Modelos canónicos para variedades multisimpléticas. Coordenadas de Darboux.

Definición

Un espacio vectorial multisimplético de orden $k + 1$ es un par (\mathcal{V}, ω) formado por un espacio vectorial \mathcal{V} y una $(k + 1)$ -forma en \mathcal{V} no degenerada.

Definición

Un espacio vectorial multisimplético de orden $k + 1$ es un par (\mathcal{V}, ω) formado por un espacio vectorial \mathcal{V} y una $(k + 1)$ -forma en \mathcal{V} no degenerada.

ω se denomina *forma multisimplética* (de grado $k + 1$).

Definición

Un espacio vectorial multisimplético de orden $k + 1$ es un par (\mathcal{V}, ω) formado por un espacio vectorial \mathcal{V} y una $(k + 1)$ -forma en \mathcal{V} no degenerada.

ω se denomina *forma multisimplética* (de grado $k + 1$).

$i_v \omega = 0 \iff v = 0$ para $v \in \mathcal{V}$.

Definición

Un espacio vectorial multisimplético de orden $k + 1$ es un par (\mathcal{V}, ω) formado por un espacio vectorial \mathcal{V} y una $(k + 1)$ -forma en \mathcal{V} no degenerada.

ω se denomina *forma multisimplética* (de grado $k + 1$).

$i_v \omega = 0 \iff v = 0$ para $v \in \mathcal{V}$.

La no-degeneración de la forma multisimplética significa que la aplicación inducida:

$$\hat{\omega} : \mathcal{V} \rightarrow \wedge^k \mathcal{V}^*$$

$$v \mapsto i_v \omega$$

es inyectiva.

Espacios vectoriales multisimpléticos.

Dos espacios vectoriales multisimpléticos (\mathcal{V}, ω) y $(\tilde{\mathcal{V}}, \tilde{\omega})$ del mismo orden $(k + 1)$, son isomorfos si existe un isomorfismo

$$\Psi : \mathcal{V} \rightarrow \tilde{\mathcal{V}}$$

tal que:

$$\tilde{\omega}(\Psi(v_1), \dots, \Psi(v_{k+1})) = \omega(v_1, \dots, v_{k+1})$$

para todo $v_i \in \mathcal{V}$, $(i = 1, \dots, k + 1)$.

Espacios vectoriales multisimpléticos.

Por [1] sabemos que cualquier espacio vectorial V , el espacio $V \times V^*$ admite una forma simpléctica canónica Ω definida:

$$\Omega((v_1, \alpha_1), (v_2, \alpha_2)) = \alpha_2(v_1) - \alpha_1(v_2)$$

Espacios vectoriales multisimpléticos.

Por [1] sabemos que cualquier espacio vectorial V , el espacio $V \times V^*$ admite una forma simpléctica canónica Ω definida:

$$\Omega((v_1, \alpha_1), (v_2, \alpha_2)) = \alpha_2(v_1) - \alpha_1(v_2)$$

¿Esta estructura tiene su extensión natural en el marco multisimplético?

Espacios vectoriales multisimpléticos.

Por [1] sabemos que cualquier espacio vectorial V , el espacio $V \times V^*$ admite una forma simpléctica canónica Ω definida:

$$\Omega((v_1, \alpha_1), (v_2, \alpha_2)) = \alpha_2(v_1) - \alpha_1(v_2)$$

¿Esta estructura tiene su extensión natural en el marco multisimplético?

Si. Dado un k con $1 \leq k \leq \dim V$, el espacio $V \times \wedge^k V^*$ puede ser equipado con una $(k+1)$ -forma canónica Ω definida:

$$\Omega((v_1, \alpha_1), \dots, (v_{k+1}, \alpha_{k+1})) = \sum_{i=1}^{k+1} (-1)^i \alpha_i(v_1, \dots, \hat{v}_i, \dots, v_{k+1})$$

Espacios vectoriales multisimpléticos.

Por [1] sabemos que cualquier espacio vectorial V , el espacio $V \times V^*$ admite una forma simpléctica canónica Ω definida:

$$\Omega((v_1, \alpha_1), (v_2, \alpha_2)) = \alpha_2(v_1) - \alpha_1(v_2)$$

¿Esta estructura tiene su extensión natural en el marco multisimplético?

Si. Dado un k con $1 \leq k \leq \dim V$, el espacio $V \times \wedge^k V^*$ puede ser equipado con una $(k+1)$ -forma canónica Ω definida:

$$\Omega((v_1, \alpha_1), \dots, (v_{k+1}, \alpha_{k+1})) = \sum_{i=1}^{k+1} (-1)^i \alpha_i(v_1, \dots, \hat{v}_i, \dots, v_{k+1})$$

Proposición:

$(V \times \wedge^k V^*, \Omega)$ es un espacio vectorial multisimplético de orden $k+1$.

Espacios vectoriales multisimpléticos.

En adelante, por simplicidad, utilizaremos la notación $\mathcal{V}_V^k = V \times \wedge^k V^*$.

Consideramos la siguiente aplicación lineal sobreyectiva

$$\pi : V \longrightarrow W$$

y su secuencia exacta corta

$$0 \rightarrow \ker \pi \hookrightarrow V \xrightarrow{\pi} W \rightarrow 0$$

Espacios vectoriales multisimpléticos.

Consideramos la siguiente aplicación lineal sobreyectiva

$$\pi : V \longrightarrow W$$

y su secuencia exacta corta

$$0 \rightarrow \ker \pi \hookrightarrow V \xrightarrow{\pi} W \rightarrow 0$$

Denotamos por $\wedge_r^k \pi$ el espacio de las k -formas exteriores.

Espacios vectoriales multisimpléticos.

Consideramos la siguiente aplicación lineal sobreyectiva

$$\pi : V \longrightarrow W$$

y su secuencia exacta corta

$$0 \rightarrow \ker \pi \hookrightarrow V \xrightarrow{\pi} W \rightarrow 0$$

Denotamos por $\wedge_r^k \pi$ el espacio de las k -formas exteriores.

$$\alpha \in \wedge_r^k \pi \iff i_{v_1} \wedge \dots \wedge i_{v_{r+1}} \alpha = 0$$

Espacios vectoriales multisimpléticos.

$$\wedge_0^k \pi \subseteq \wedge_1^k \pi \subseteq \dots \subseteq \wedge_{k-1}^k \pi \subseteq \wedge^k V^*$$

Denotamos

$$\mathcal{V}_\pi^{(k,r)} = V \times \wedge_r^k \pi$$

$$\wedge_0^k \pi \subseteq \wedge_1^k \pi \subseteq \dots \subseteq \wedge_{k-1}^k \pi \subseteq \wedge^k V^*$$

Denotamos

$$\mathcal{V}_\pi^{(k,r)} = V \times \wedge_r^k \pi$$

Claramente, para $0 \leq r < k$ tenemos que $\mathcal{V}_\pi^{(k,r)}$ es un subespacio de \mathcal{V}_V^k
-CONTAR pg 308 de [3]

$$\wedge_0^k \pi \subseteq \wedge_1^k \pi \subseteq \dots \subseteq \wedge_{k-1}^k \pi \subseteq \wedge^k V^*$$

Denotamos

$$\mathcal{V}_\pi^{(k,r)} = V \times \wedge_r^k \pi$$

Claramente, para $0 \leq r < k$ tenemos que $\mathcal{V}_\pi^{(k,r)}$ es un subespacio de \mathcal{V}_V^k
-CONTAR pg 308 de [3]

Proposición:

Para cada r , con $0 \leq r \leq k-1$ y $k-r \leq \dim W$, $(\mathcal{V}_\pi^{(k,r)}, \Omega)$ es un espacio vectorial multisimplético de orden $k+1$.

Espacios vectoriales multisimpléticos.

La anterior proposición nos indica que para cualquier fibrado π de un espacio vectorial V , hay una familia de subespacios vectoriales multisimpléticos de $(\mathcal{V}_V^k, \Omega)$.

La estructura multisimplética obtenida al restringir Ω a $\mathcal{V}_\pi^{(k,l)} = V \times \wedge_l^k \pi$ es el modelo lineal para la estructura multisimplética canónica que surge en la formulación Hamiltoniana covariante de la teoría de campos (Ver [4]).

Contenidos.

- 1 Introducción.
- 2 Espacios vectoriales multisimplécticos.
- 3 Subespacios característicos.**
- 4 Caracterización de las estructuras multisimplécticas canónicas.
- 5 Variedades multisimplécticas.
- 6 Estructuras Hamiltonianas en variedades multisimplécticas.
- 7 Modelos canónicos para variedades multisimplécticas. Coordenadas de Darboux.

Subespacios característicos.

Sea (\mathcal{V}, ω) un espacio vectorial multisimpléctico con una $(k+1)$ -forma no degenerada ω , y sea W un subespacio de \mathcal{V} . Sea l , con $1 \leq l \leq k$,

Definición

El l -ésimo complemento ortogonal de W es un subespacio lineal de \mathcal{V} definido como:

$$W^{\perp, l} = \{v \in \mathcal{V} \mid i_v \wedge w_1 \wedge \dots \wedge w_l \omega = 0 \text{ para todo } w_i \in W, i = 1, \dots, l\}$$

Subespacios característicos.

Sea (\mathcal{V}, ω) un espacio vectorial multisimpléctico con una $(k+1)$ -forma no degenerada ω , y sea W un subespacio de \mathcal{V} . Sea l , con $1 \leq l \leq k$,

Definición

El l -ésimo complemento ortogonal de W es un subespacio lineal de \mathcal{V} definido como:

$$W^{\perp, l} = \{v \in \mathcal{V} \mid i_v \wedge w_1 \wedge \dots \wedge w_l \omega = 0 \text{ para todo } w_i \in W, i = 1, \dots, l\}$$

$$W^{\perp, 1} \subseteq W^{\perp, 2} \subseteq \dots \subseteq W^{\perp, k}$$

Subespacios característicos.

Sea (\mathcal{V}, ω) un espacio vectorial multisimpléctico con una $(k+1)$ -forma no degenerada ω , y sea W un subespacio de \mathcal{V} . Sea l , con $1 \leq l \leq k$,

Definición

El l -ésimo complemento ortogonal de W es un subespacio lineal de \mathcal{V} definido como:

$$W^{\perp, l} = \{v \in \mathcal{V} \mid i_{v \wedge w_1 \wedge \dots \wedge w_l} \omega = 0 \text{ para todo } w_i \in W, i = 1, \dots, l\}$$

$$W^{\perp, 1} \subseteq W^{\perp, 2} \subseteq \dots \subseteq W^{\perp, k}$$

$$W^{\perp, l} = \mathcal{V} \text{ siempre que } l > \dim W$$

En [3] se enuncian y demuestran las siguientes propiedades:

- $\{0\}^{\perp, I} = \mathcal{V}$ y $\mathcal{V}^{\perp, I} = \{0\}$;
- $U \subset W \implies W^{\perp, I} \subset U^{\perp, I}$;
- $(U + W)^{\perp, I} \subset W^{\perp, I} \cap U^{\perp, I}$;
- $U^{\perp, l_1} \cap W^{\perp, l_2} \subset (U + W)^{\perp, l_1 + l_2 - 1}$ para $l_1 + l_2 \leq k + 1$;
- $U^{\perp, l_1} + W^{\perp, l_2} \subset (U \cap W)^{\perp, \bar{l}}$ para $\bar{l} = \max\{l_1, l_2\}$;

Subespacios característicos.

W es un subespacio de un espacio vectorial multisimpléctico (\mathcal{V}, ω) de orden $k + 1$, entonces:

- I-isotrópico si $W \subset W^{\perp, I}$
- I-coisotrópico si $W^{\perp, I} \subset W$
- I-Lagrangiano si $W = W^{\perp, I}$

Contenidos.

- 1 Introducción.
- 2 Espacios vectoriales multisimplécticos.
- 3 Subespacios característicos.
- 4 Caracterización de las estructuras multisimplécticas canónicas.**
- 5 Variedades multisimplécticas.
- 6 Estructuras Hamiltonianas en variedades multisimplécticas.
- 7 Modelos canónicos para variedades multisimplécticas. Coordenadas de Darboux.

Caracterización de las estructuras multisimplécticas canónicas.

Por [5] sabemos que:

(\mathcal{V}, ω) sea un espacio vectorial simpléctico y L un subespacio Lagrangiano de \mathcal{V} (que siempre existe)

Caracterización de las estructuras multisimplécticas canónicas.

Por [5] sabemos que:

(\mathcal{V}, ω) sea un espacio vectorial simpléctico y L un subespacio Lagrangiano de \mathcal{V} (que siempre existe)

$$(\mathcal{V}, \omega) \cong (\mathcal{V}_L^1, \Omega)$$

con

$$\Omega((v_1, \alpha_1), (v_2, \alpha_2)) = \alpha_2(v_1) - \alpha_1(v_2)$$

Caracterización de las estructuras multisimplécticas canónicas.

Por [5] sabemos que:

(\mathcal{V}, ω) sea un espacio vectorial simpléctico y L un subespacio Lagrangiano de \mathcal{V} (que siempre existe)

$$(\mathcal{V}, \omega) \cong (\mathcal{V}_L^1, \Omega)$$

con

$$\Omega((v_1, \alpha_1), (v_2, \alpha_2)) = \alpha_2(v_1) - \alpha_1(v_2)$$

Todos los espacios vectoriales simplécticos de la misma dimensión "son parecidos", en el sentido de que son isomorfos a algún $(\mathcal{V}_L^1, \Omega)$.

Caracterización de las estructuras multisimplécticas canónicas.

¿Y en el marco multisimpléctico?

Caracterización de las estructuras multisimplécticas canónicas.

¿Y en el marco multisimpléctico?

¿Como tienen que ser los espacios vectoriales multisimplécticos para que sean isomorfos a alguno del tipo $(\mathcal{V}_V^k, \Omega)$?

Donde Ω se define como:

$$\Omega((v_1, \alpha_1), \dots, (v_{k+1}, \alpha_{k+1})) = \sum_{i=1}^{k+1} (-1)^i \alpha_i(v_1, \dots, \hat{v}_i, \dots, v_{k+1})$$

Caracterización de las estructuras multisimplécticas canónicas.

Recordemos que $\mathcal{V}_V^k = V \times \wedge^k V^*$.

Caracterización de las estructuras multisimplécticas canónicas.

Recordemos que $\mathcal{V}_V^k = V \times \wedge^k V^*$. Podemos identificar:

$$V \implies V \times \{0\} \text{ y } \wedge^k V^* \implies \{0\} \times \wedge^k V^*$$

ambos son subespacios de \mathcal{V}_V^k .

Caracterización de las estructuras multisimplécticas canónicas.

Recordemos que $\mathcal{V}_V^k = V \times \wedge^k V^*$. Podemos identificar:

$$V \implies V \times \{0\} \text{ y } \wedge^k V^* \implies \{0\} \times \wedge^k V^*$$

ambos son subespacios de \mathcal{V}_V^k .

Teorema:

V es un subespacio k -Lagrangiano de $(\mathcal{V}_V^k, \Omega)$ y $\wedge^k V^*$ es un subespacio 1-Lagrangiano.

Caracterización de las estructuras multisimplécticas canónicas.

Pongamos $W = \wedge^k V^*$, tenemos entonces que:

$$\wedge^k (\mathcal{V}_V^k / W)^* = \wedge^k V^* = W$$

y, por lo tanto

$$\dim W = \dim \wedge^k (\mathcal{V}_V^k / W)^*$$

Caracterización de las estructuras multisimplécticas canónicas.

Si tomamos $\dim \mathcal{V}_V^k = n$ y $\dim W = p$ entonces tenemos la siguiente relación:

$$p = \binom{n-p}{k}$$

Caracterización de las estructuras multisimplécticas canónicas.

Si tomamos $\dim \mathcal{V}_V^k = n$ y $\dim W = p$ entonces tenemos la siguiente relación:

$$p = \binom{n-p}{k}$$

Observación:

Dado un espacio multisimpléctico n -dimensional (\mathcal{V}, ω) de orden $k+1$, una condición necesaria para que sea isomorfo a un espacio multisimpléctico canónico n -dimensional $(\mathcal{V}_V^k, \Omega)$ es que \mathcal{V} admita un subespacio 1-Lagrangiano W de dimensión p , tal que la anterior relación se cumpla.

Caracterización de las estructuras multisimplécticas canónicas.

Teorema:

Sea (\mathcal{V}, ω) un espacio vectorial multisimpléctico de orden $k + 1$. Entonces, (\mathcal{V}, ω) es isomorfo al espacio vectorial multisimpléctico canónico $(\mathcal{V}_V^k, \Omega)$ si y solo si existe un subespacio W de \mathcal{V} tal que:

- W es 1-Lagrangiano.
- $\dim W = \dim \wedge^k (\mathcal{V}/W)^*$

Caracterización de las estructuras multisimplécticas canónicas.

Teorema:

Sea (\mathcal{V}, ω) un espacio vectorial multisimpléctico de orden $k + 1$. Entonces, (\mathcal{V}, ω) es isomorfo al espacio vectorial multisimpléctico canónico $(\mathcal{V}_V^k, \Omega)$ si y solo si existe un subespacio W de \mathcal{V} tal que:

- W es 1-Lagrangiano.
- $\dim W = \dim \wedge^k (\mathcal{V}/W)^*$

Corolario:

Sea ν una forma de volumen de un espacio vectorial \mathcal{V} $(k + 1)$ -dimensional, entonces el espacio multisimpléctico (\mathcal{V}, ν) es isomorfo a un espacio multisimpléctico canónico de orden $k + 1$.

Contenidos.

- 1 Introducción.
- 2 Espacios vectoriales multisimplécticos.
- 3 Subespacios característicos.
- 4 Caracterización de las estructuras multisimplécticas canónicas.
- 5 Variedades multisimplécticas.**
- 6 Estructuras Hamiltonianas en variedades multisimplécticas.
- 7 Modelos canónicos para variedades multisimplécticas. Coordenadas de Darboux.

Definición:

Una variedad multisimplética (M, ω) de orden $k + 1$ es un par formado por una variedad diferenciable M y una $(k + 1)$ -forma cerrada ω sobre M la cual es a su vez no degenerada. La forma diferencial ω se denomina forma multisimplética (de grado $k + 1$).

Contenidos.

- 1 Introducción.
- 2 Espacios vectoriales multisimplécticos.
- 3 Subespacios característicos.
- 4 Caracterización de las estructuras multisimplécticas canónicas.
- 5 Variedades multisimplécticas.
- 6 Estructuras Hamiltonianas en variedades multisimplécticas.**
- 7 Modelos canónicos para variedades multisimplécticas. Coordenadas de Darboux.

Estructuras Hamiltonianas en variedades multisimpléticas.

Contenidos.

- 1 Introducción.
- 2 Espacios vectoriales multisimplécticos.
- 3 Subespacios característicos.
- 4 Caracterización de las estructuras multisimplécticas canónicas.
- 5 Variedades multisimplécticas.
- 6 Estructuras Hamiltonianas en variedades multisimplécticas.
- 7 Modelos canónicos para variedades multisimplécticas. Coordenadas de Darboux.

Modelos canónicos para variedades multisimplécticas.

Coordenadas de Darboux.