

Tarea 2: Propiedades Básicas de la Probabilidad

- Imaginemos el siguiente experimento aleatorio. "Se Lanza un dado continuamente hasta que caiga un 6 y en ese momento dejamos de lanzar el dado".
 - Describe el Espacio Muestral asociado a este Experimento Aleatorio
 - Sea E_n el evento que denota: El número de lanzamientos necesarios hasta completar el experimento. ¿Cuales puntos del espacio muestral están contenidos en E_n ?
 - ¿ Que representa $(\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n)^c$ en términos del experimento aleatorio?
- Tres individuos A, B, C se turnan para lanzar una moneda. Al primero que le salga "Águila" gana. El espacio muestral asociado a este experimento puede ser definido como

$$S = \left\{ 1, 01, 001, 0001, \dots, 0000\dots \right.$$

- Interpreta el Espacio Muestral
 - Define los siguientes eventos en terminos de S
 - A gana = A
 - B gana = B
 - $(A \cup B)^c$

Asume que A lanza primero la moneda, de no ganar lanza B , de no ganar lanza C y en caso de no ganar nadie se repite el proceso
- Si al jugar **Poker** asumimos que las $\binom{52}{5}$ manos son igualmente probables. ¿ Cual es la probabilidad de que nos hayan repartido :
 - Una Flor? **Decimos que una mano de poker es una flor si las 5 cartas de la mano son del mismo palo**
♠, ♦, ♣, ♥
 - Un Par?
 - Dos Pares?
 - Una Tercia?
 - Un Poker? **Tenemos un Poker cuando la mano que nos tocaron contiene 4 cartas con la misma denominación y de diferente palo**
 - Los coeficientes de la ecuación cuadrática $x^2 + bx + c$ están determinados al lanzar un par de dados, el resultado del primer dado determina el valor de b y el del segundo dado el valor de c . Obtén la probabilidad de que la ecuación tenga soluciones reales
 - Dos números m y n son llamados "primos relativos" si el 1 es el único divisor común positivo entre ambos. Así por ejemplo el 8 y el 5 son primos relativos, mientras el 8 y 6 no lo son . Si un número es seleccionado al azar del conjunto $\{1, 2, 3, \dots, 63\}$. Obtén la probabilidad de que este número sea primo relativo con el 63
 - Una clase de Biología tiene 33 alumnos inscritos. Si 17 de ellos sacaron 10's en el primer examen parcial y 14 de ellos sacaron 10's en el segundo examen parcial mientras 11 alumnos no obtuvieron un 10's en ninguno de estos dos exámenes. ¿ Cual es la probabilidad de que un estudiante seleccionado al azar de esta clase haya sacado 10's en ambos exámenes?
 - Una terapeuta acomodara al azar a 5 matrimonios sobre una fila para realizar una actividad. Obtén la probabilidad de que no haya algun esposo sentado junto a su mujer sobre la fila

8. Cinco Personas A, B, C, D, E serán acomodados en una fila de sillas para hacer una actividad conjunta. Asume que cualquier acomodo de los personas es igualmente probable. ¿ Cual es la probabilidad de que:

- Haya exactamente una persona entre A y B ?
- Hayan exactamente dos personas entre A y B ?
- Hayan exactamente tres personas entre A y B ?

9. Una mujer tiene n llaves de las cuales solo uno abre la puerta de su casa.

- Si ella elige las llaves al azar y va descartando una a una las que no funcionan. ¿ Cual sera la probabilidad de que ella abra la puerta en el k -esimo intento?
- Obtén la probabilidad anterior si ella no descarta ninguna llave al intentar abrir la puerta?

10. Michelle juega al **Blackjack** en un casino. El dealer le reparte 2 cartas de la baraja. ¿ Cual es la probabilidad de que ella gane en el primer intento?. Esto es que ella haya recibido un As y algun 10's, J, Q, K de cualquier palo?

11. Para cualquier sucesión de eventos E_1, E_2, \dots prueba que es posible definir una nueva sucesión de eventos F_1, F_2, \dots "disjuntos" (Esto es que $F_i F_j = \emptyset$ si $i \neq j$) tal que:

$$\bigcup_{i=1}^n F_i = \bigcup_{i=1}^n E_i \quad \text{para toda } n \in \mathbb{N}$$

12. Sean \mathbb{P}_1 y \mathbb{P}_2 dos funciones de probabilidad definidas en Ω . Si Definimos una nueva función \mathbb{P} dada por:

$$\mathbb{P}(A) = \frac{\mathbb{P}_1(A) + \mathbb{P}_2(A)}{2} \quad \text{si } A \in \Omega$$

Demuestra que \mathbb{P} es una función de probabilidad sobre Ω

13. Sea \mathbb{P} una función de probabilidad en $\Omega = \{A, B\}$, tal que : $\mathbb{P}(A) = p$ y $\mathbb{P}(B) = 1 - p$ donde $0 \leq p \leq 1$. Definimos \mathbb{Q} otra función en Ω :

$$\mathbb{Q}(\omega) = [\mathbb{P}(\omega)]^2 \quad \text{si } \omega \in \Omega$$

¿ Para que valores de p la función \mathbb{Q} es una probabilidad?

14. Sean $\mathbb{P}_1, \mathbb{P}_2, \dots, \mathbb{P}_k$ funciones de probabilidad en Ω . Sean a_1, a_2, \dots, a_k una sucesión de números . ¿ Que condiciones deben de satisfacer las a_i 's para que: $\sum_{i=1}^k a_i \mathbb{P}_i$ sea una función de probabilidad?

15. Sean $A, B, C \in S$ eventos. Prueba que :

La probabilidad de que exactamente dos de estos eventos ocurra es

$$\mathbb{P}(AB) + \mathbb{P}(AC) + \mathbb{P}(BC) - 3\mathbb{P}(ABC)$$

16. Prueba que $\mathbb{P}(A_i) = 1$ para toda $i \geq 1$ entonces $\mathbb{P}\left(\bigcap_{i=1}^{\infty} A_i\right) = 1$

Hint: Usa la Desigualdad de Boole

17. Sean $E, F \in S$ dos eventos. Decimos que : $E \sim F$ si $\mathbb{P}(A \triangle B) = 0$. Prueba que (\sim) es de equivalencia

18. Prueba el principio de inclusión-exclusión.

$$\mathbb{P}\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) = \sum_{i=1}^n \mathbb{P}(A_i) - \sum_{1 \leq i < j \leq n} \mathbb{P}(A_i \cap A_j) + \dots + (-1)^{n+1} \mathbb{P}(A_1 \cap \dots \cap A_n)$$

Hint: Ver libro [DeGroot]-pp 48

19. Leer y desarrollar el problema "(6a)- Probabilidad y una Paradoja" [Ross-8th. Ed]- pp 46-48

20. Dado un conjunto S . Si para alguna $k \geq 1$ Se tiene que S_1, S_2, \dots, S_k son subconjuntos mutuamente excluyentes de S tal que $\bigcup_{i=1}^k S_i = S$ entonces decimos que la clase $\{S_1, S_2, \dots, S_k\}$ es una **Partición** de S . Sea T_n el número de diferentes particiones de $\{1, 2, \dots, n\}$. Asi por ejemplo tenemos que $T_1 = 1$ (La única partición posible es $S_1 = \{1\}$ y $T_2 = 2$ (Las dos particiones posibles de un conjunto de dos elementos son $\{\{1, 2\}, \{\{1\}, \{2\}\}\}$).

- Exhibe las particiones y muestra que $T_3 = 5, T_4 = 15$
- Demuestra que

$$T_{n+1} = 1 + \sum_{k=1}^n \binom{n}{k} T_k$$

Usa este resultado para calcular T_{10}

A esta serie de números T_i 's se les conoce como **Números de Bell**

- Exhibe las primeras 5 filas del **Triángulo de Bell**
- Realiza una breve semblanza de dos de los mas grandes matemáticos del Siglo XX.
Srinivasa Ramanujan y **Eric Bell**