

Postulado de Bertrand

Para todo real $x \geq 1$ existe un primo en el intervalo x y $2x$.

Demostración

Para la demostración se considera al coeficiente binomial $\binom{2n}{n} = \frac{2n!}{n!n!}$ y lo que interesa es construir cotas para $\binom{2n}{n}$ que nos acerquen a su valor.

Para $n \geq 5$ demostramos que

$$\frac{1}{2n} 2^{2n} < \binom{2n}{n} < \frac{1}{4} 2^{2n}.$$

En primer lugar lo haremos con

$$\frac{1}{2n} 2^{2n} < \binom{2n}{n}.$$

Sabemos que
$$\binom{2n}{n} = \frac{2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 \cdots n(n+1) \cdots 2n \cdot 1}{1 \cdot 1 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 3 \cdots n \cdot n}$$

Y al multiplicar por $2n$ se tiene que

$$2n \binom{2n}{n} = \frac{2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 \cdots n(n+1) \cdots 2n \cdot 2n}{1 \cdot 1 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 3 \cdots n \cdot n}$$

Nótese que hay $2n$ factores y el más pequeño es 2, por lo tanto

$$2n \binom{2n}{n} > 2^{2n}.$$

Por lo tanto

$$\frac{1}{2n} 2^{2n} < \binom{2n}{n},$$

y con esto se tiene la primera parte de las desigualdades.

Falta demostrar que $\binom{2n}{n} < \frac{1}{4} 2^{2n}$, y en este caso se trabajará con inducción.

Así, para $n = 5$

$$\binom{2n}{n} = 252 < 256 = \frac{1}{4} 2^{10}.$$

Ahora, supongamos que se cumple para $n = k$

$$\binom{2k}{k} < \frac{1}{4} 2^{2k}.$$

El paso que sigue es ver que se cumple para $n = k + 1$. Para llegar a esto se multiplica la desigualdad anterior por $\frac{(2k+1)(2k+2)}{(k+1)(k+1)}$, y obtenemos esto

$$\binom{2k}{k} \frac{(2k+1)(2k+2)}{(k+1)(k+1)} < \frac{1}{4} 2^{2k} \frac{(2k+1)(2k+2)}{(k+1)(k+1)},$$

se puede ver que el lado izquierdo es igual a $\binom{2(k+1)}{k+1}$ y por lo tanto

$$\begin{aligned} \binom{2(k+1)}{k+1} &< \frac{1}{4} 2^{2k} \frac{(2k+1)}{(k+1)} \cdot 2 \\ &= \frac{1}{4} 2^{2k+1} \frac{(2k+1)}{(k+1)} \\ &< \frac{1}{4} 2^{2k+2} \end{aligned}$$

a esta desigualdad se llega cuando se considera que $\frac{(2k+1)}{(k+1)} = \frac{(2+\frac{1}{k})}{(1+\frac{1}{k})}$ tiende a 2 cuando k es grande, por lo tanto $\binom{2(k+1)}{k+1} < \frac{1}{4} 2^{2(k+1)}$.

Con esto demostramos que

$$\frac{1}{2n} 2^{2n} < \binom{2n}{n} < \frac{1}{4} 2^{2n}. \quad \text{--- (1)}$$

-----.

Ahora pasamos a construir más elementos que serán requeridos para tratar de proponer otra estimación de $\binom{2n}{n}$. Para esto haremos lo que sigue.

Consideremos un intervalo de la forma $(10, b] = A$ donde $b \geq 10$; enseguida se construyen intervalos que cubran todo A , pero cada uno de estos inicia en una x y termina en $2x$. Los intervalos se determinan de la siguiente manera:

Sea $b \geq 10$, $a_1 = \left\lceil \frac{b}{2} \right\rceil$, $a_2 = \left\lceil \frac{b}{2^2} \right\rceil$, $a_3 = \left\lceil \frac{b}{2^3} \right\rceil$, $a_4 = \left\lceil \frac{b}{2^4} \right\rceil$, ..., ..., $a_k = \left\lceil \frac{b}{2^k} \right\rceil$, ...

donde $\left\lceil \frac{b}{2^i} \right\rceil$ es el entero inmediato mayor que $\frac{b}{2^i}$

por lo tanto $a_1 \geq a_2 \geq a_3 \geq a_4 \geq \dots \geq a_k \dots$

Y de esto se tiene que

$$a_k < \frac{b}{2^k} + 1 = 2 \left(\frac{b}{2^{k+1}} \right) + 1 \leq 2a_{k+1} + 1,$$

por lo tanto

$$a_k < 2a_{k+1}.$$

Ahora consideramos a m como el mayor entero (inmediato) tal que $a_m \geq 5$ y por lo tanto $a_{m+1} < 5$, y con esto $2a_{m+1} < 10$.

Por otro lado, se sabe que $a_1 \geq \frac{b}{2}$ y en consecuencia $2a_1 \geq b$, entonces los intervalos

$$\begin{aligned} &[a_1 \quad 2a_1] \\ &[a_2 \quad 2a_2] \\ &[a_3 \quad 2a_3] \\ &\quad \cdot \\ &\quad \cdot \\ &[a_{m-1} \quad 2a_{m-1}] \\ &[a_m \quad 2a_m], \end{aligned}$$

Cubren totalmente al intervalo $(10, b]$, y se puede considerar que los intervalos se traslapen.

Ahora pasamos a reconocer el producto de los primos entre 10 y b , con base en los intervalos a_i hasta $2a_i$, y es de esta manera

$$\prod_{10 < p \leq b} p \leq \prod_{a_1 < p \leq 2a_1} p \cdot \prod_{a_2 < p \leq 2a_2} p \cdots \prod_{a_m < p \leq 2a_m} p,$$

se tiene que para cada uno de los factores de la derecha y usando la desigualdad (1), se obtiene que

$$\prod_{n < p \leq 2n} p < \binom{2n}{n} < \frac{1}{4} 2^{2n} = 2^{2(n-1)}.$$

Por lo tanto, el producto de los primos entre 10 y b queda acotado así:

$$\begin{aligned} \prod_{10 < p \leq b} p &< 2^{2(a_1-1)} \cdot 2^{2(a_2-1)} \cdot 2^{2(a_3-1)} \cdots 2^{2(a_m-1)} \\ &= 2^{2(a_1-1+a_2-1+a_3-1+\cdots+a_m-1)} \end{aligned}$$

Pero $a_1 - 1 < \frac{b}{2}$, $a_2 - 1 < \frac{b}{2^2}$, ..., $a_m - 1 < \frac{b}{2^m}$, entonces

$$\prod_{10 < p \leq b} p < 2^{2\left(\frac{b}{2} + \frac{b}{2^2} + \cdots + \frac{b}{2^m}\right)} = 2^{2b\left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2^2} + \cdots + \frac{1}{2^m}\right)}$$

pero $\frac{1}{2} + \frac{1}{2^2} + \cdots + \frac{1}{2^m}$ tiende a 1, por lo tanto

$$\prod_{10 < p \leq b} p < 2^{2b}.$$