

# Dénombrement et combinatoire

## Problèmes de dénombrement

### Exercice 1 (Tirages dans une urne)

Une urne contient  $n$  boules numérotées de 1 à  $n$  (avec  $n \geq 4$ ). On effectue 10 tirages avec remise.

0. Combien y a-t-il de résultats possibles ?

Combien y a-t-il de résultats...

1. Où n'apparaissent que des 2 et des 3 ?
2. Sans 3 ?
3. Contenant exactement deux 3 ?
4. Contenant au moins un 3 ?
5. Contenant exactement deux 3 et quatre 1 ?
6. Où le premier 3 apparaît au  $k$ -ème tirage (pour un  $k \in \llbracket 1, 10 \rrbracket$  fixé) ?

### Exercice 2 (Paris hippiques)

12 chevaux, numérotés de 1 à 12, disputent une course hippique. Au tiercé, un pari est la donnée, dans l'ordre, des trois premiers chevaux arrivés.

Combien y a-t-il de paris possibles ?

Combien y a-t-il de paris où...

1. Le cheval 6 apparaît ?
2. Les trois numéros sont pairs ?
3. Les numéros sont rangés dans l'ordre croissant ?

### Exercice 3 (Mains de 4 cartes)

On étudie les différentes mains de 4 cartes que l'on peut obtenir dans un jeu de 52 cartes.

Combien y a-t-il de mains possibles ?

Combien de mains contiennent :

1. Quatre coeurs ?
2. Exactement un coeur ?
3. Au moins un as ?
4. Au plus un as ?
5. Au plus 3 as ?
6. Exactement 2 rois et 1 trèfle ?

### Exercice 4 (Nourrir les singes)

Dans un zoo, un soigneur se dirige vers l'enclos des singes pour les nourrir : il dispose de 6 fruits à distribuer et l'enclos contient 10 singes distincts.

1. On considère que les 6 fruits sont différents. Combien y a-t-il de distributions possibles :
  - (a) En donnant au plus un fruit à chaque singe ?
  - (b) Si chaque singe peut recevoir de 0 à 6 fruits ?
2. On considère maintenant que les 6 fruits sont 6 bananes identiques. Répondre aux mêmes questions.

### Exercice 5 (Placard à chemises)

Une penderie contient 10 chemises toutes différentes : 4 blanches, 3 bleues, 2 grises et 1 blanche.

1. Combien y a-t-il d'agencements possibles ?
2. Combien y a-t-il d'agencements où les chemises sont regroupées par couleur ?

## Coefficients binomiaux

### Exercice 6 (Application de la formule)

Donner l'expression développée du polynôme  $(x-1)^5 \in \mathbb{R}[x]$ .

### Exercice 7 (Coefficients pairs/impairs)

1. Soit  $n \in \mathbb{N}$ . Calculer :

$$(a) S = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \quad (b) T = \sum_{k=0}^n (-1)^k \binom{n}{k}.$$

$$2. \text{ En déduire : } \sum_{k \text{ pairs}} \binom{n}{k} = \sum_{k \text{ impairs}} \binom{n}{k} = 2^{n-1}.$$

### Exercice 8 (Formule du binôme dérivée)

1. Soit  $n \geq 2$  et  $x \in \mathbb{R}$ . Calculer :

$$(a) \sum_{k=1}^n k \binom{n}{k} x^k \quad (b) \sum_{k=2}^n k(k-1) \binom{n}{k} x^k$$

( On se rappellera du lien entre  $\binom{n}{k}$  et  $\binom{n-1}{k-1}$  )

2. Retrouver ces résultats en dérivant  $(x+1)^n \in \mathbb{R}[x]$ .

### Exercice 9 (Formule de Pascal généralisée)

Soit  $p \in \mathbb{N}$ .

Montrer par récurrence que pour tout  $n \geq p$ ,

$$\sum_{k=p}^n \binom{k}{p} = \binom{n+1}{p+1}.$$

### Exercice 10 (Produit de coeff. binomiaux)

1. Montrer que pour tous  $k \leq p \leq n$ ,

$$\binom{n}{p} \binom{p}{k} = \binom{n}{k} \binom{n-k}{p-k}.$$

2. En déduire l'expression de  $\sum_{p=k}^n \binom{n}{p} \binom{p}{k} x^p$

pour  $x \in \mathbb{R}$ .

## Formule de Vandermonde

Soient  $a, b \in \mathbb{N}$ . Soit  $p \in \mathbb{N}$  avec  $p \leq a + b$ .

1. Une urne contient  $(a + b)$  boules, numérotées de 1 à  $(a + b)$ .

Les boules numérotées 1 à  $a$  sont rouges, les boules numérotées  $(a + 1)$  à  $(a + b)$  sont noires.

On tire  $p$  boules simultanément dans l'urne.

Pour  $k \in \llbracket 1, p \rrbracket$ , combien y a-t-il de tirages contenant exactement  $k$  boules rouges ?

2. En déduire (avec un argument de dénombrement) la formule : 
$$\sum_{k=0}^p \binom{a}{k} \binom{b}{p-k} = \binom{a+b}{p}.$$

3. Retrouver cette formule en développant le polynôme  $(1+x)^a(1+x)^b \in \mathbb{R}[x]$  de deux manières différentes.

4. Justifier que la formule est encore vraie si  $p > a + b$ .

5. Application : pour  $p \in \mathbb{N}$ , calculer  $\sum_{k=0}^n \binom{p}{k}^2$ .