

Guía de estudio 5: Primeros Auxilios y Respuesta a Emergencias

Introducción

RCP básico y DEA, hemorragias, quemaduras, fracturas, asfixia y ahogamiento.

Módulo 1: RCP Básico y DEA

Conceptos clave:

- Secuencia RCP adulto: C-A-B (compresiones, vía aérea, respiración).
- Ritmo compresiones: 100-120 por minuto.
- Profundidad: 5-6 cm en adultos.
- Relación compresión-ventilación (1 reanimador): 30:2.
- DEA: analiza ritmo y puede administrar descarga.
- Colocar DEA inmediatamente si está disponible.
- RCP no interfiere con desfibrilador implantable.
- Detener RCP cuando la víctima recupera signos de vida o llega ayuda.
- Si vomita: girar cabeza, limpiar, continuar.
- Ritmos desfibrilables: fibrilación ventricular, taquicardia ventricular sin pulso.

Preguntas de repaso:

1. ¿Cuál es la secuencia del RCP básico en adultos?
a) A-B-C – **b) C-A-B** – c) B-C-A – d) Solo compresiones
2. ¿A qué ritmo se deben realizar las compresiones?
a) 60-80/min – **b) 100-120/min** – c) 140-160/min – d) Lo más rápido posible
3. ¿Qué ritmo cardíaco es desfibrilable?
a) Asistolia – **b) Fibrilación ventricular o TV sin pulso** – c) Bradicardia sinusal – d) Ritmo sinusal normal

Módulo 2: Hemorragias y Heridas

Conceptos clave:

- Presión directa es primera acción para hemorragia externa grave.
- Torniquete solo si presión directa no controla hemorragia que amenaza la vida.
- Colocar torniquete 5-7 cm por encima de la herida.
- Hemorragia nasal: inclinar hacia adelante y presionar 10-15 min.
- Limpiar herida menor con agua y jabón.
- Herida que necesita sutura: bordes separados, sangrado activo, cara.
- Hematoma: hielo reduce inflamación.
- Mordedura animal: limpiar, cubrir, acudir a urgencias (riesgo rabia).
- Apósito hemostático acelera coagulación.
- No retirar objeto clavado.

Preguntas de repaso:

1. ¿Cuál es la primera acción ante una hemorragia externa grave?
a) Torniquete – **b) Presión directa** – c) Limpiar con alcohol – d) Elevar extremidad
2. ¿Qué hacer ante una hemorragia nasal?
a) Inclinar cabeza atrás – **b) Inclinar adelante y presionar 10-15 min** – c) Tapar con algodón – d) Acostar
3. ¿Qué hacer si un objeto está clavado en una herida?
a) Retirarlo – **b) No retirar, inmovilizar y acudir al hospital** – c) Cortar al ras – d) Aplicar hielo

Módulo 3: Quemaduras y Lesiones por Calor

Conceptos clave:

- Quemadura superficial: enfriar con agua corriente 10-20 min.
- Tercer grado: todas las capas, indolora.
- No aplicar hielo, pasta dental, aceite.
- Golpe de calor: T° >40°C con alteración neurológica, emergencia.
- Quemadura química: lavar con abundante agua 20 min.
- Segundo grado: ampollas y dolor intenso.
- Quemadura eléctrica: desconectar fuente o apartar con objeto no conductor.
- Regla de los nueve: estima superficie corporal quemada.
- Ampolla rota: limpiar, antibiótico tópico, apósito no adherente.
- Hipotermia: T° <35°C.

Preguntas de repaso:

1. ¿Cuál es la primera medida para una quemadura térmica superficial?
a) Hielo – **b) Agua corriente 10-20°C por 10-20 min** – c) Mantequilla – d) Romper ampollas
2. ¿Qué clasificación afecta todas las capas de la piel?
a) Primer grado – b) Segundo grado – **c) Tercer grado** – d) Cuarto grado
3. ¿Qué es el golpe de calor?
a) Insolación leve – **b) $T^{\circ} > 40^{\circ}\text{C}$ + alteración neurológica** – c) Calambres – d) Deshidratación leve

Módulo 4: Fracturas, Esguinces y Luxaciones

Conceptos clave:

- Fractura = hueso; esguince = ligamento.
- Signos de fractura: deformidad, crepitación, movimiento anormal.
- Inmovilizar la zona tal como está.
- Luxación: pérdida de contacto articular (no reubicar).
- Protocolo RICE para esguince agudo.
- Aplicar hielo 15-20 min cada 2-3 horas.
- Fractura abierta: hueso perfora piel → alto riesgo infección.
- Férula improvisada acolchada.
- Fisura: fractura incompleta (grieta).
- La deformidad ósea NO es propia de esguince leve.

Preguntas de repaso:

1. ¿Qué signo es característico de una fractura?
a) Hematoma leve – **b) Deformidad, crepitación, movimiento anormal** – c) Dolor solo palpación – d) Hinchazón difusa
2. ¿Qué hacer ante sospecha de fractura?
a) Mover extremidad – **b) Inmovilizar, hielo, acudir a urgencias** – c) Masajear – d) Calor
3. ¿Qué es una luxación?
a) Fractura intraarticular – **b) Pérdida de contacto articular** – c) Esguince grave – d) Rotura de tendón

Módulo 5: Asfixia, Obstrucción y Ahogamiento

Conceptos clave:

- Adulto que tose con fuerza → animar a toser, no interferir.
- Obstrucción completa consciente → maniobra de Heimlich (compresiones abdominales).
- Ahogamiento inconsciente → iniciar RCP con compresiones.
- Repetir Heimlich hasta que objeto salga o víctima pierda conciencia.
- Embarazada u obesa → compresiones torácicas.
- Si pierde conciencia → iniciar RCP, revisar boca antes de ventilaciones.
- Causa común ahogamiento niños: inmersión sin supervisión (bañeras, cubos).
- Respiración de rescate: 2 ventilaciones iniciales en ahogamiento.
- Signo de obstrucción parcial: tos débil y ruidos estridentes.
- Tras extraer objeto, reevaluar respiración y continuar RCP si necesario.

Preguntas de repaso:

1. ¿Qué hacer si un adulto se ahoga y puede toser con fuerza?
a) Heimlich – **b) Animar a toser, no interferir** – c) Golpes espalda – d) Acostar
2. ¿Cuál es la maniobra para adulto consciente con obstrucción completa?
a) Compresiones torácicas – **b) Heimlich (compresiones abdominales)** – c) Ventilaciones – d) Pinzar nariz
3. ¿Qué hacer si la víctima por ahogamiento está inconsciente?
a) Iniciar RCP con compresiones – b) Extraer agua de pulmones – c) Posición seguridad – d) Palmadas espalda