

ANLIS - Spick

Johanna Koch

Contents

1 Grundlagen	6
1.1 Wurzeln	6
1.2 Potenzen	6
1.3 Brüche	7
1.4 Logarithmen	7
1.5 Binome	7
1.5.1 1. Binom	7
1.5.2 2. Binom	7
1.5.3 3. Binom	7
1.6 Quadratische Gleichung	7
1.7 Ableitungen/Integrationen	8
1.8 Vektoren	10
1.9 Beispiele	10
2 SW01 Funktionen	11
2.1 Lineare Funktion	11
2.2 Polynomfunktion	11
2.3 Quadratische Funktionen	11
2.4 Exponentialfunktion	11
2.5 Logarithmusfunktion	11
3 SW02 Folgen und Reihen	12
3.1 Arithmetische Folgen und Reihen	12
3.1.1 Beispiele von Folgen	12
3.1.2 Summe der Glieder einer AF	12
3.1.3 Nützliche andere Formeln	13
3.2 Geometrische Folgen und Reihen	13
3.3 Rechnen mit Folgen, Eigenschaften	13
4 SW03 Grenzwerte und Stetigkeit	14
4.1 Grenzwert	14
4.1.1 Linksseitiger Grenzwert	14
4.1.2 Rechtsseitiger Grenzwert	14
4.1.3 Zweiseitiger Grenzwert	14

4.1.4	Uneigentliche Grenzwerte	14
4.1.5	Grundlegende Grenzwerte Theorem	14
4.1.6	Rechnen mit Grenzwerten	15
4.1.7	Squeezing-Theorem	16
4.2	Stetigkeit	16
4.2.1	Grenzwert einer Funktion von x - Theorem	16
4.2.2	Rechenregeln	17
4.2.3	Eigenschaften stetiger Funktionen	17
4.2.4	Regula Falsi	17
4.3	Beispiele	18
4.3.1	Geschickt erweitern	18
4.3.2	GW Polynom	18
4.3.3	GW Quotient	18
5	SW04 Differentialrechnung I – Tangente und Ableitung	19
5.1	Die Sekante	19
5.1.1	Sekante durch P und Q	19
5.2	Tangente und Ableitung	19
5.2.1	Beispiel Quadratische Funktion	19
5.3	Ableitung der Potenzfunktion	20
5.3.1	Beispiel Tangente	20
5.3.2	Newton-Raphson Verfahren	20
5.4	Einige Ableitungsregeln	21
5.4.1	Theorem Faktorregel	21
5.4.2	Theorem Produktregel	21
5.5	Quotientenregel	21
5.6	Formeln	21
5.6.1	Ableitungen	22
6	SW05 Differentialrechnung II — Kettenregel	23
6.1	Einseitige Ableitung	23
6.2	Kettenregel	23
6.3	Umkehrfunktion	23
6.4	Ableitung Logarithmus	24
6.5	Ableitung Wurzel	24
6.6	Ableitungen Arkusfunktionen	24
6.7	Ableitungen Areafunktionen	24
7	SW06 Differentialrechnung III – Differential, höhere Ableitungen	25
7.1	Implizite Ableitung	25
7.1.1	Beispiel	25
7.1.2	y nach x	26
7.2	Differential	26
7.2.1	Beispiel Differential	27
7.2.2	Rechenregeln für Differentiale	27
7.3	Monotonie	27

7.3.1	Lokale oder relative Extrema	28
7.4	Höhere Ableitungen	28
7.5	Krümmung	28
8	SW07 Differentialrechnung IV – Kurvendiskussion, Optimierung	29
8.1	Parameterdarstellung von Kurven	29
8.1.1	Beispiel	29
8.1.2	Ableitung eines Vektors	30
8.1.3	Ableitung einer in Parameterform gegebenen Funktion . . .	30
8.1.4	Krümmungskreismittelpunkt	30
8.2	Kurven in Polarkoordinaten	31
8.2.1	Ableitung einer in Polarkoordinaten gegebene Funktion . . .	31
8.3	Kurvendiskussion	32
8.3.1	Symmetrien Beispiele	32
8.3.2	Wende- und Sattelpunkte	33
8.3.3	Beispiel	33
8.4	Optimierungsproblem - Allgemeines Vorgehen	34
8.4.1	Brechungsgesetz	34
8.5	Regel von de l'Hôpital	34
8.5.1	Theorem - Regel von de l'Hôpital für unbestimmte Ausdrücke der Form $0/0$	34
8.5.2	Vorgehen	34
8.5.3	Vorgehen für weitere unbestimmte Ausdrücke	35
9	SW08 Integralrechnung I – Flächenberechnung und Integral	36
9.1	Stammfunktion	36
9.2	Umkehrung der Differentiation	36
9.3	Bestimmtes Integral Flächenberechnung	37
9.3.1	Beispiel Rechter Rand	37
9.3.2	Beispiel Linker Rand	37
9.4	Summen vereinfachen	38
10	SW09 Integralrechnung II – unbestimmtes Integral und Hauptsatz der Infinitesimalrechnung	39
10.1	Unbestimmtes Integral und Flächenfunktion	39
10.1.1	Theorem - unbestimmte Integrale	39
10.1.2	Beispiel	40
10.2	Delta x ändern	40
10.3	Fundamentalsatz der Differential- und Integralrechnung Theorem . .	40
10.3.1	Beispiele	41
10.4	Berechnung bestimmter Integrale mit Stammfunktion	41
10.4.1	Beispiel	41
10.5	1. Substitutionsregel für unbestimmte Integrale - Theorem	42
10.5.1	Beispiele	42
10.6	1. Substitutionsregel für bestimmte Integrale - Theorem	42
10.6.1	Beispiele	43

11 SW10 Integralrechnung III – Integrationstechnik	44
11.1 2. Substitutionsregel	44
11.1.1 Theorem - 2. Substitutionsregel für unbestimmte Integrale	44
11.1.2 Beispiele	45
11.1.3 Theorem - 2. Substitutionsregel für bestimmte Integrale	45
11.1.4 Beispiele	46
11.2 Häufige Integralsubstitutionen	47
11.3 Theorem - Partielle Integration - Produktintegration	48
11.3.1 Beispiel	49
11.3.2 Rekursionsbeziehung - Beispiel	49
11.3.3 Nur einen Faktor - Beispiel	50
11.3.4 Mehrfache partielle Integration - Beispiel	50
11.4 Theorem - Produktintegration für bestimmte Integrale	50
11.4.1 Beispiele	50
11.5 Mittelwerte	51
11.5.1 Theorem - lineare Mittelwert	51
11.5.2 Beispiel	51
11.5.3 Theorem - quadratische Mittelwert	52
11.5.4 Theorem - Mittelwertsatz der Integralrechnung	52
12 SW11 Integralrechnung IV– Anwendungen	53
12.1 Trapezregel	53
12.2 Trapezregel - kurz	53
12.2.1 Beispiel	54
12.3 Simpsonregel - kurz	54
12.3.1 Beispiel	54
12.4 Definition Bogenlänge	54
12.4.1 Beispiel	55
12.5 Kurven in Polarform	55
12.5.1 Beispiel	55
12.6 Kurven in Parameterform	55
12.7 Beispiel	56
13 SW12 Potenz- und Taylor-Reihen	57
13.1 Potenzreihe - Definition	57
13.1.1 Theorem - Konvergenzradius	57
13.2 Definition Taylor-Polynom	58
13.2.1 Beispiel 1	58
13.2.2 Beispiel 2	59
13.3 Definition - Taylor-Reihe	59
13.4 Definition - Restglied nach Lagrange	59
13.4.1 Theorem - Konvergenz von Taylor-Reihen	60
13.5 Definition Binomial-Reihe	60
13.5.1 Beispiel	60
13.6 Rechnen mit Potenzreihen	61
13.6.1 Beispiel - addieren, subtrahieren	61

13.6.2 Beispiel - differenzieren, integrieren	61
14 SW13 Mehrdimensionale Differentialrechnung I	62
14.1 Multivariate Funktionen	62
14.2 Konturlinie	62
14.2.1 Beispiel	62
14.3 Partielle Ableitung	63
14.3.1 Definition	63
14.3.2 Beispiel 1	64
14.3.3 Beispiel 2	64
14.3.4 Beispiel 3	64
14.4 Definition - Der Gradient	64
14.4.1 Beispiel 1	64
14.4.2 Beispiel 2	65
14.4.3 Eigenschaften des Gradienten	65
14.5 Richtungsableitung	66
14.5.1 Beispiel mit Richtungsvektor	66
14.5.2 Beispiel ohne Richtungsvektor	66
14.6 Richtungsableitung und Gradient	67
14.6.1 Beispiel	67

Chapter 1

Grundlagen

1.1 Wurzeln

$$\sqrt{x} = x^{\frac{1}{2}}$$

$$\sqrt{a \times b} = \sqrt{a} \times \sqrt{b}$$

$$\sqrt{a} + \sqrt{b} \neq \sqrt{a+b}$$

$$\sqrt{a^2 \times b} = a \times \sqrt{b}$$

$$\sqrt[b]{a^b} = (a^b)^{\frac{1}{b}} = a$$

$$\sqrt[a]{x^b} = x^{\frac{b}{a}}$$

$$\sqrt{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}$$

$$\sqrt{a} - \sqrt{b} \neq \sqrt{a-b}$$

$$\frac{a}{\sqrt{b}} = \frac{a\sqrt{b}}{b}$$

$$\frac{1}{\sqrt[n]{a}} = a^{-\frac{1}{n}}$$

1.2 Potenzen

$$x^{-a} = \frac{1}{x^a}$$

$$x^a \times x^b = x^{a+b}$$

$$x^{ab} = x^{a \times b}$$

$$\frac{a}{bx^{-c}} = \frac{a}{b} x^{-c}$$

$$\frac{x^a}{x^b} = x^{a-b}$$

$$\frac{a^x}{a^{x+1}} = \frac{1}{a}$$

1.3 Brüche

$$\frac{a}{b} + \frac{c}{d} = \frac{ad}{bd} + \frac{cb}{bd} = \frac{ad+cb}{bd}$$

$$\frac{a}{b} \times \frac{c}{d} = \frac{ac}{bd}$$

$$\frac{1}{x} = x^{-1}$$

$$\frac{1}{x^3} = x^{-3}$$

$$\frac{x}{5} = \frac{1}{5}x$$

$$\frac{a}{b} - \frac{c}{d} = \frac{ad}{bd} - \frac{cb}{bd} = \frac{ad-cb}{bd}$$

$$\frac{\frac{a}{b}}{\frac{c}{d}} = \frac{a}{b} \times \frac{d}{c}$$

$$\frac{1}{x^2} = x^{-2}$$

$$\frac{4}{3}x^{-4} = \frac{4}{3x^4}$$

$$\frac{x^4}{9} = \frac{1}{9}x^4$$

1.4 Logarithmen

$$y = \log_a(x) \Leftrightarrow x = a^y$$

$$\log_b\left(\frac{x}{y}\right) = \log_b(x) - \log_b(y)$$

$$\log_b(xy) = \log_b(x) + \log_b(y)$$

$$\log_b(x^y) = y \log_b(x)$$

1.5 Binome

1.5.1 1. Binom

$$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

1.5.2 2. Binom

$$(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$$

1.5.3 3. Binom

$$(a+b)(a-b) = a^2 - b^2$$

1.6 Quadratische Gleichung

Für:

$$ax^2 + bx + c = 0$$

Dann:

$$x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

1.7 Ableitungen/Integrationen

Wenn integrieren, $+C$ nicht vergessen!

$f(x)$	$f'(x)$
x	1
x^a	ax^{a-1}
$\frac{x^{a+1}}{a+1}$	x^a
$\sqrt[n]{x^m} = x^{\frac{m}{n}}$	$\frac{m}{n}x^{\frac{m}{n}-1}, a \neq -1$
e^x	e^x
a^x	$(\ln(a))a^x (a < 0)$
$\frac{a^x}{\ln(a)}$	a^x
$\ln(x) - x$	$\ln x$
$\ln x $	$\frac{1}{x} = x^{-1}$
$a \times \ln(x)$	$\frac{a}{x}$
$\sin x$	$\cos x$
$\cos x$	$-\sin x$
$\tan x$	$\frac{1}{\cos^2 x} = 1 + \tan^2 x$
$-\cot x$	$\frac{1}{\sin^2 x}$
$\arcsin x$	$\frac{1}{\sqrt{1-x^2}} +$
$-\arcsin x$	$\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$
$\arccos x$	$-\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$
$\arctan x$	$\frac{1}{1+x^2}$
$-\arctan x$	$\frac{1}{1+x^2}$
$\sinh x$	$\cosh x$
$\cosh x$	$\sinh x$
$\tanh x$	$\frac{1}{\cosh^2 x} = 1 + \tanh^2 x$
$\operatorname{arsinh} x$	$\frac{1}{\sqrt{1+x^2}}$
$\operatorname{arcosh} x$	$\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$
$\operatorname{artanh} x$	$\frac{1}{1-x^2}$
$\coth x$	$-\frac{1}{\sinh^2 x}$

* falls $x \in (-1, 1)$

1.8 Vektoren

Länge eines Vektors $\vec{a} = \begin{pmatrix} b \\ c \end{pmatrix}$:

$$|\vec{a}| = \sqrt{b^2 + c^2}$$

Einheitsvektor \vec{a}_0 aus $\vec{a} = \begin{pmatrix} b \\ c \end{pmatrix}$:

$$\vec{a}_0 = \frac{1}{|\vec{a}|} \cdot \vec{a} = \frac{\vec{a}}{|\vec{a}|}$$

1.9 Beispiele

$$\frac{2}{3\sqrt[4]{x^5}} = \frac{2}{3x^{-\frac{5}{4}}} = \frac{2}{3}x^{-\frac{5}{4}}$$

Chapter 2

SW01 Funktionen

2.1 Lineare Funktion

$$f(x) = ax + b$$

a = Steigung

2.2 Polynomfunktion

Grad der Funktion: Höchster Exponent von x.

Nullstellen: Maximal so viele wie der Grad der Funktion.

$$f(x) = ax^n + bx^{n-1} + cx^{n-2} \dots$$

2.3 Quadratische Funktionen

Polynomfunktion zweites Grades

$$f(x) = ax^2 + bx + c$$

2.4 Exponentialfunktion

$$f(x) = a \times b^x$$

2.5 Logarithmusfunktion

Umkehrfunktion von Exponentialfunktion

$$f(x) = \log_b(x)$$

Chapter 3

SW02 Folgen und Reihen

3.1 Arithmetische Folgen und Reihen

$$(a_n) = a_1, a_2, a_3, \dots, a_n, \dots$$

Differenz d zweier beliebiger aufeinanderfolgender Glieder a_n, a_{n+1} ist konstant.

Eine AF ist eindeutig beschrieben durch zwei Größen:

- beliebiges Glied a_n und Differenz d
- zwei beliebige Glieder a_n und a_{n+k}

Bildungsgesetz: Funktionsvorschrift nach welcher aus n das n -Glieder (a_n) berechnet werden kann.

3.1.1 Beispiele von Folgen

$$(a_n) = -\frac{1}{2}, -\frac{1}{4}, -\frac{1}{8}, \dots \text{ Bildungsgesetz: } a_n = -\frac{1}{2^n}$$

$$(a_n) = 1^3, 2^3, 3^3, \dots \text{ Bildungsgesetz: } a_n = n^3$$

$$(a_n) = 0, \frac{1}{2}, \frac{2}{3}, \frac{3}{4}, \dots \text{ Bildungsgesetz: } a_n = \frac{n-1}{n}$$

3.1.2 Summe der Glieder einer AF

$$\sum_{k=1}^n a_k = na_1 + d \frac{n(n-1)}{2} = n \frac{a_1 + a_n}{2}$$

Wobei bei " $n \frac{a_1 + a_n}{2}$ " a_1 das erste Glied ist, a_n das letzte, n die Anzahl Glieder und 2 den Mittelwert vom ersten und letzten Glied bildet.

3.1.3 Nützliche andere Formeln

Gegeben: $a_n = v$, $a_{n+x} = z$

Gesucht d : $d = \frac{z-v}{(n+x)-n}$

3.2 Geometrische Folgen und Reihen

Die geometrische Folge ist dadurch charakterisiert, dass der Quotient q zweier beliebiger aufeinanderfolgender Glieder a_n und a_{n+1} konstant ist.

$$a_{n+1} = qa_n, n = 1, 2 \qquad q = \frac{a_{n+1}}{a_n}$$

Eine GF ist eindeutig beschrieben durch zwei Grössen, entweder:

- durch ein beliebiges Glied a_n und den Quotienten q
- durch zwei beliebige Glieder a_n und a_{n+k}

3.3 Rechnen mit Folgen, Eigenschaften

- Folge (a_n) multipliziert man mit einer reellen Zahl λ , indem man jedes Glied der Folge mit dieser Zahl multipliziert:

$$\lambda(a_n) = (\lambda a_n)$$

- Zwei Folgen (a_n) und (b_n) addiert man, indem man entsprechende Glieder addiert:

$$(a_n) + (b_n) = (a_n + b_n)$$

- Eine Folge heisst **konstante Folge**, falls $a_n = c \in \mathbb{R}, \forall n \in \mathbb{N}$
AF ist konstant wenn $d = 0$,
GF ist konstant wenn $q = 1$
- Eine Folge (a_n) ist **streng monoton zunehmend/abnehmend** falls $(a_{n+1} > a_n)$ bzw $(a_{n+1} < a_n)$
- Eine Folge (a_n) ist **beschränkt** (höhö) falls eine positive Zahl c existiert mit $|a_n| \leq c, \forall n$: alle Glieder der Folge liegen im Graphen unter einem Teppich der Breite $2c$. Anderfalls heisst die Folge (a_n) **unbeschränkt**

Chapter 4

SW03 Grenzwerte und Stetigkeit

4.1 Grenzwert

$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$ oder $f(x) \rightarrow L$, falls $x \rightarrow a$.

4.1.1 Linksseitiger Grenzwert

$$\lim_{x \rightarrow a^-} f(x)$$

4.1.2 Rechtsseitiger Grenzwert

$$\lim_{x \rightarrow a^+} f(x)$$

4.1.3 Zweiseitiger Grenzwert

Der zweiseitige Grenzwert existiert genau dann, wenn links- und rechtsseitiger Grenzwert existieren und diese gleich sind:

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L \text{ genau dann, wenn } \lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = L = \lim_{x \rightarrow a^+} f(x)$$

4.1.4 Uneigentliche Grenzwerte

Grenzwert wächst bis über alle Grenzen wenn man x gegen a gehen lässt:

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \infty$$

4.1.5 Grundlegende Grenzwerte Theorem

$$\lim_{x \rightarrow a} k = k$$

$$\lim_{x \rightarrow a} x = a$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1}{x} = -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x} = \infty$$

4.1.6 Rechnen mit Grenzwerten

Theorem Summe

Falls $a \in \mathbb{R} \cup \{-\infty, +\infty\}$, $\mu, \nu \in \mathbb{R}$ und

$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L_1$ und $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = L_2$ dann gilt:

Der GW einer Summe/Differenz ist gleich der Summe/Differenz der GWs; Konstanten kommen vor den GW:

$$\lim_{x \rightarrow a} [\mu f(x) \pm \nu g(x)] = \mu \lim_{x \rightarrow a} f(x) \pm \nu \lim_{x \rightarrow a} g(x) = \mu L_1 \pm \nu L_2$$

Theorem Produkt

Der GW eines Produkts ist gleich dem Produkt der GWs:

$$\lim_{x \rightarrow a} [f(x)g(x)] = \lim_{x \rightarrow a} f(x) \times \lim_{x \rightarrow a} g(x) = L_1 L_2$$

Theorem Quotient

Ist $L_2 \neq 0$ und g in einer Umgebung von a verschieden von 0, dann ist der **GW des Quotienten gleich dem Quotienten der GWs:**

$$\lim_{x \rightarrow a} \left[\frac{f(x)}{g(x)} \right] = \frac{\lim_{x \rightarrow a} f(x)}{\lim_{x \rightarrow a} g(x)} = \frac{L_1}{L_2}$$

Siehe 4.3.3 GW Quotient für Beispiel.

Folgerungen Exponent

$$\lim_{x \rightarrow a} x^n = \left(\lim_{x \rightarrow a} x \right)^n = a^n \qquad \lim_{x \rightarrow a} [f(x)]^n = \left(\lim_{x \rightarrow a} f(x) \right)^n$$

Folgerungen Polynom

Für ein Polynom $p(x) = c_0 + c_1x + \dots + c_nx^n = \sum_{k=0}^n c_kx^k$ gilt:

$$\lim_{x \rightarrow a} p(x) = c_0 + c_1a + \dots + c_na^n = p(a)$$

Siehe 4.3.2 GW Polynom für Beispiel.

Folgerungen Quotient

Für eine rationale Funktion $r(x) = \frac{p(x)}{q(x)}$ (dabei sind $p(x)$ und $q(x)$ Polynome) und eine $a \in \mathbb{R}$ gilt:

- (a) Falls $q(a) \neq 0$, dann ist $\lim_{x \rightarrow a} r(x) = r(a)$
- (b) Falls $q(a) = 0$ und $p(a) \neq 0$, dann existiert $\lim_{x \rightarrow a} r(x)$ nicht.
- (c) Falls $q(a) = 0$ und $p(a) = 0$, dann kann der GW existieren, muss aber nicht! Siehe 4.3.3 GW Quotient für Beispiel.

4.1.7 Squeezing-Theorem

Gilt für drei Funktionen f , g und h in einer Umgebung von c (evt. mit Ausnahme von c)

$$g(x) \leq f(x) \leq h(x) \text{ und } \lim_{x \rightarrow c} g(x) = \lim_{x \rightarrow c} h(x) = L$$

dann gilt auch $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = L$

4.2 Stetigkeit

Salopp: Eine Funktion f heisst stetig, wenn man deren Graphen zeichnen kann, ohne den Stift absetzen zu müssen.

Genauer ist eine Funktion f stetig in a , falls:

- Die Funktion f dort existiert, d.h. falls $f(a)$ definiert ist.
- Links- und rechtsseitiger Grenzwert existieren und gleich sind

$$\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow a} f(x)$$

- Die genannten Grenzwerte mit dem Funktionswert übereinstimmen.

Zusammengefasst: f ist stetig in a , falls

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$$

Eine Funktion heisst stetig, falls sie überall, d.h. $\forall x \in D(f)$ stetig ist.

4.2.1 Grenzwert einer Funktion von x - Theorem

Sei $a \in \mathbb{R} \cup \{-\infty, +\infty\}$. Gilt dann $\lim_{x \rightarrow c} g(x) = L$ und ist f im Punkt L stetig, dann gilt:

$$\lim_{x \rightarrow c} f(g(x)) = f(\lim_{x \rightarrow c} g(x))$$

Insbesondere gilt zB

$$\lim_{x \rightarrow c} |g(x)| = |(\lim_{x \rightarrow c} g(x))|$$

falls $\lim_{x \rightarrow c} g(x)$ existiert!

4.2.2 Rechenregeln

- Summe und Differenz stetiger Funktionen sind stetig.
- Der Quotient zweier stetiger Funktionen ist dort stetig, wo der Nenner nicht verschwindet.
- Polynome $p(x) = \sum_{k=0}^n a_k x^k$ sind stetig.
- Rationale Funktionen $r(x) = \frac{p(x)}{q(x)}$ sind dort stetig, wo das Nennerpolynom $q(x)$ nicht verschwindet.
- Sinus- ($\sin x$) und Kosinusfunktion ($\cos x$) sind stetig.
- Der Tangens ($\tan x = \frac{\sin x}{\cos x}$) ist stetig, falls $\cos x \neq 0$, dh falls $x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z}$.
- Exponential- und Logarithmusfunktionen sind in ihrem Definitionsbereichen stetig.
- Zusammensetzung stetiger Funktionen ist stetig.
- Eine zusammengesetzte Funktion kann dort unstetig sein, wo eine der verwendeten Funktionen nicht stetig ist.

4.2.3 Eigenschaften stetiger Funktionen

Theorem Zwischenwertsatz

Ist f im Intervall $[a, b]$ stetig, dann nimmt f jeden Wert zwischen $f(a)$ und $f(b)$ (inklusive) mindestens einmal an.


Corollary - Nullstellensatz von Bolzano

Ist f auf $[a, b]$ stetig und gilt $f(a)f(b) < 0$, dann besitzt f in $[a, b]$ wenigstens eine Nullstelle, dh. $\exists x \in [a, b]$ mit $f(x) = 0$

In anderen Worten: Wenn eine Funktion im Bereich $[a, b]$ stetig ist und es vom Intervall a zu b einen Vorzeichenwechsel gibt, dann gibt es mindestens eine Nullstelle.

4.2.4 Regula Falsi

Basierend auf dem Nullstellensatz von Bolzano.



Der Schnittpunkt der Sekante (grün) durch $(a, f(a))$ und $(b, f(b))$ mit der x-Achse ergibt eine erste Näherung für die Nullstelle (NS) von f :

$$x = a - f(a) \frac{b-a}{f(b)-f(a)} = \frac{af(b)-bf(a)}{f(b)-f(a)}$$

Gilt dann $f(x)f(a) < 0$, dann liegt die NS im Intervall $[a, x]$, sonst in $[b, x]$.

Wiederhole die Prozedur mit dem Intervall welches die NS enthält!

4.3 Beispiele

4.3.1 Geschickt erweitern

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x-1}{\sqrt{x}-1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x-1}{\sqrt{x}-1} \times \frac{\sqrt{x}+1}{\sqrt{x}+1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x-1)(\sqrt{x}+1)}{x-1} =$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} (\sqrt{x} + 1) = \lim_{x \rightarrow 1} \sqrt{x} + \lim_{x \rightarrow 1} 1 = 1 + 1 = 2$$

4.3.2 GW Polynom

$$\lim_{x \rightarrow 1} (x^7 - 2x^5 + 1)^{35} = (1^7 - 2 \times 1^5 + 1)^{35} = 0$$

4.3.3 GW Quotient

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{5x^3+4}{x-3} = \frac{\lim_{x \rightarrow 2} 5x^3+4}{\lim_{x \rightarrow 2} x-3} \text{ und wegen der Regel für Polynome:}$$

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{5x^3+4}{x-3} = \frac{5 \times 2^3 + 4}{2-3} = -44$$

Chapter 5

SW04

Differentialrechnung I – Tangente und Ableitung

5.1 Die Sekante

Steigung: $m = \frac{\Delta y}{\Delta x}$

Wobei $\Delta x = x_1 - x_0$ und $\Delta y = y_1 - y_0$

5.1.1 Sekante durch P und Q

$P(x_0|f(x_0)), Q(x_1|f(x_1))$ auf dem Graphen $g(f)$

Steigung der Sekante durch P und Q:

$$m = \frac{f(x_1) - f(x_0)}{x_1 - x_0}$$

Sekantengleichung (Punkt-Richtungs-Form)


$$(y - y_0) = m(x - x_0)$$

Steigung: $m = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \text{Differenzquotient von } f \text{ an der Stelle } x_0$

5.2 Tangente und Ableitung

5.2.1 Beispiel Quadratische Funktion

Gegeben die Funktion (rot) $f(x) = x^2$. Gesucht der Differenzquotient von f an der Stelle x_0 :



$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}$$

$$\frac{(x_0 + \Delta x)^2 - x_0^2}{\Delta x}$$

$$\frac{x_0^2 + 2x_0\Delta x + \Delta x^2 - x_0^2}{\Delta x}$$

$$\frac{2x_0\Delta x + \Delta x^2}{\Delta x} = 2x_0 + \Delta x$$

Steigung der Sekante : $2x_0 + \Delta x$

Gleichung der Sekante:

$$y = x_0^2 + (2x_0 + \Delta x)(x - x_0) = (2x_0 + \Delta x)x - (x_0 + \Delta x)x_0.$$

Für die Tangente an der Stelle x_0 geht man mit dem Punkt Q immer näher an Punkt P, bis $\Delta x = 0$ (Weil die Tangente f nur an einer Stelle berührt)

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} 2x_0 + \Delta x = 2x_0 = \text{Steigung der Tangente}$$

Damit Gleichung der Tangente an f:

$$(y - f(x_0)) = 2x_0(x - x_0)$$

$$y = f(x_0) + 2x_0(x - x_0) = x_0^2 + 2x_0(x - x_0) = 2x_0x - x_0^2$$

5.3 Ableitung der Potenzfunktion

$$f(x) = x^n$$

$$f'(x) = nx^{n-1}$$

5.3.1 Beispiel Tangente

Tangente $t(x)$ an der Stelle $P(1, 1)$ an der Kurve $f(x) = x^2$?

$$f(x) = x^2, f'(x) = 2x$$

$$P(1, 1), P(x_0/f(x_0))$$


$$f'(x_0) = 2x_0 = 2 \times 1 = 2 = \text{Steigung Tangente}$$

$$t(x) = f(x_0) + f'(x_0) \times (x - x_0)$$

$$= 1 + 2(x - 1) = 1 + 2x - 2 = 2x - 1$$

5.3.2 Newton-Raphson Verfahren

Wir wollen die (nichtlineare) Gleichung $f(x) = 0$ lösen, dh wir wollen ein x_* so finden, dass $f(x_*) = 0$. Idee: Starte mit x_0 , und berechne den Schnittpunkt x_1 der Tangente durch $(x_0, f(x_0))$ mit der x-Achse. Wiederhole diesen Schritt!



$$f'(x_k) = \frac{f(x_k) - f(x_{k+1})}{x_k - x_{k+1}} = \frac{f(x_k)}{-\Delta x_k}$$

Ausgehend von x_0 , iterieren wir über $k = 1, 2, \dots$

$$f'(x_k) \Delta x_k = -f(x_k)$$

$$x_{k+1} = x_k + \Delta x_k = x_k - [f'(x_k)]^{-1} f(x_k)$$

5.4 Einige Ableitungsregeln

5.4.1 Theorem Faktorregel

Falls $f'(x)$ existiert, dann darf ein konstanter Faktor $c \in \mathbb{R}$ vor die Ableitung gezogen werden.

$$[c \times f(x)]' = c \times f'(x) \text{ auch geschrieben als } \frac{d}{dx}[c \times f(x)] = c \times \frac{d}{dx}[f(x)]$$

5.4.2 Theorem Produktregel

Existieren die Ableitungen $u'(x)$ und $v'(x)$, dann gilt für die Ableitungen des Produkts die Regel:

$$[u(x) \times v(x)]' = u'(x)v(x) + u(x)v'(x)$$

auch geschrieben als

$$\frac{d}{dx}(u(x)v(x)) = \frac{d}{dx}[u(x)]v(x) + u(x) \times \frac{d}{dx}[v(x)]$$

5.5 Quotientenregel

Existieren die Ableitungen $u'(x)$ und $v'(x)$, dann gilt für die Ableitungen des Quotienten von $u(x)$ und $v(x) \neq 0$ die Regel:

$$\left[\frac{u(x)}{v(x)}\right]' = \frac{u'(x)v(x) - u(x)v'(x)}{(v(x))^2} \text{ kurz } \left[\frac{u}{v}\right]' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$$

auch geschrieben als

$$\frac{d}{dx}\left[\frac{u(x)}{v(x)}\right] = \frac{\frac{d}{dx}[u(x)]v(x) - u(x)\frac{d}{dx}[v(x)]}{(v(x))^2} \text{ kurz } \left[\frac{u}{v}\right]' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$$

5.6 Formeln

$$\text{Steigung: } m = \frac{\Delta y}{\Delta x}$$

$$\text{Tangenten Gleichung: } t(x) = f(x_0) + f'(x_0) \times (x - x_0)$$

Faktorregel: $[c \times f(x)]' = c \times f'(x)$

Produktregel: $[u(x) \times v(x)]' = u'(x)v(x) + u(x)v'(x)$

Quotientenregel: $[\frac{u(x)}{v(x)}]' = \frac{u'(x)v(x) - u(x)v'(x)}{(v(x))^2}$ kurz $[\frac{u}{v}]' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$

5.6.1 Ableitungen

f(x)	f'(x)
x^n	nx^{n-1}
$\sin(x)$	$\cos(x)$
$\cos(x)$	$-\sin(x)$
$\tan(x)$	$\frac{1}{\cos^2(x)}$
e^x	e^x
e^{3x}	$3e^{3x}$
$c(c \in \mathbb{R})$	0
x	1
$\sum_{k=0}^n c_k x^k$	$\sum_{k=0}^n c_k x^{k-1}$

Chapter 6

SW05

Differentialrechnung II — Kettenregel

6.1 Einseitige Ableitung

Strebt Δx in der Definition der Ableitung von der positiven Seite gegen Null erhält man die **rechtsseitige Ableitung von der f an der Stelle x_0** :

$$f'(x_0^+) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0^+} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x} \quad (\text{analog für die linksseitige Ableitung})$$

6.2 Kettenregel

Auch kombinierbar mit anderen Regeln:

$$(f(g(x)))' = f'(g(x)) \times g'(x)$$

6.3 Umkehrfunktion

Durch die Abbildung f wird der Punkt x auf $f(x)$ abgebildet. Die Umkehrabbildung f^{-1} bildet diesen Punkt wieder auf x ab, dh. es gilt $f(f^{-1}(x)) = Id(x) = x$ (die identische Abbildung Id bildet x auf x ab.)

Leite $f(f^{-1}(x)) = x$ nach x ab.

$$[f^{-1}(x)]' = \frac{1}{f'(f^{-1}(x))}$$

6.4 Ableitung Logarithmus

$$(\ln(x))' = \frac{1}{x}$$

$$(a \times \ln(x))' = \frac{a}{x}$$

6.5 Ableitung Wurzel

$$(\sqrt[n]{x^m})' = (x^{\frac{m}{n}})' = \frac{m}{n} x^{\frac{m}{n}-1}$$

6.6 Ableitungen Arkusfunktionen

f(x)	f'(x)
$\sin x$	$\cos x$
$\cos x$	$-\sin x$
$\tan x$	$\frac{1}{\cos^2 x} = 1 + \tan^2 x$
$\arcsin x$	$\frac{1}{\sqrt{1-x^2}} *$
$\arccos x$	$-\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$
$\arctan x$	$\frac{1}{1+x^2}$

* falls $x \in (-1, 1)$

6.7 Ableitungen Areafunktionen

f(x)	f'(x)
$\sinh x$	$\cosh x$
$\cosh x$	$\sinh x$
$\tanh x$	$\frac{1}{\cosh^2 x} = 1 + \tanh^2 x$
$\operatorname{arsinh} x$	$\frac{1}{\sqrt{1+x^2}}$
$\operatorname{arcosh} x$	$\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$
$\operatorname{artanh} x$	$\frac{1}{1-x^2}$

Chapter 7

SW06

Differentialrechnung III – Differential, höhere Ableitungen

7.1 Implizite Ableitung

Explizite Form: $y = f(x)$

Man kann für jedes x den Funktionswert berechnen und die Kurve zeichnen.

Implizite Form: $F(x, y) = 0$

Oft ist eine Auflösung nach y nicht möglich. **Leite Gliedweise nach x ab, wobei $y = y(x)$ als Funktion von x betrachtet werden muss und mit der Kettenregel ableiten.**

7.1.1 Beispiel

$$x^2 + y^2 = R^2$$

$$F(x, y) = x^2 + y^2 - R^2 = 0$$

$x^2 + (y(x))^2 - R^2 = 0$ | differenzieren nach x , Achtung: Leite sowohl was links als auch rechts vom "=" ist!!

$$2x + 2y(x) \times y'(x) - 0 = 0$$

$$y'(x) \times y(x) = -x$$

$$y'(x) = -\frac{x}{y(x)} = -\frac{x}{\sqrt{R^2 - x^2}}$$

7.1.2 y nach x

Kettenregel

$$y^3 = (y(x))^3$$

$$3y(x)^2 y'(x) = 3y^2 y'$$

Produktregel Kettenregel

$$2xy^2 = 2x \times y^2 \mid \text{Produktregel!}$$

$$(2x)' \times y^2 + 2x \times (y^2)' \mid \text{Kettenregel für } (y^2)'$$


$$(2x)' \times y^2 + 2x \times (2y^2 \times y')$$

$$2y^2 + 2x \times 2yy' = 2y^2 + 4xyy'$$

7.2 Differential

Um wieviel verändert sich die Funktion $y = f(x)$, wenn man sich von x_0 um Δx entfernt?

Es gilt $\Delta y = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)$!



Steigung der Tangente (blau) in x_0

$$f'(x_0) = \frac{dy}{dx}$$

Die Symbole dx und dy nennt man **Differentiale**. Das **Differential von f an der Stelle x_0** ist

$$dy = f'(x_0)dx$$

Es gilt also approximativ:

$$\Delta y \approx dy = f'(x_0)dx$$

Statt dy und Δy verwendet man auch die Bezeichnung df und Δf .

- Das Differential $df = dy = f'(x)dx$ der Funktion $y = f(x)$ an der Stelle x ist gleich der Änderungen des Ordinaten- oder y-Wertes der Tangente durch $P(x, f(x))$, wenn man den Abszissen- oder x-Wert um $dx = \Delta x$ ändert.
- Das Differential dy von $y = f(x)$ an der Stelle x wird verwendet, um die wahre Änderung von Δy zu approximieren

$$\Delta y \approx dy = f'(x)dx$$

Diese Approximation ist umso genauer, je kleiner $dx = \Delta x$ ist.

- Das Differential dy ist gleich der Änderung der an der Stelle x linearisierten Funktion, wenn sich x um $dx = \Delta x$ ändert.

- Für eine lineare Funktion gilt somit $dy = \Delta y$
- Vorteil gegenüber der exakten Änderung: die Berechnung für ein anderes $dx = \Delta x$ ist lediglich eine Multiplikation mit $f'(x)$

7.2.1 Beispiel Differential

Sei $f(x) = x^2 + e^{x-1}$. Um wieviel verändert sich f , wenn x von 1 auf 1.1 erhöht wird?

$$f(x) = x^2 + e^{x-1}$$

$$x_0 = 1, x_1 = 1.1$$

Exakt:

$$f(x_1) - f(x_0) = 1.1^2 + e^{1.1-1} - (1^2 + e^{1-1}) = 1.21 + e^{0.1} - 2 = 0.315$$

Approximativ:

$$f'(x) = 2x + e^{x-1} \times 1$$

$$f'(x_0) = 2 \times 1 + e^{1-1} = 3$$

$$f'(x) = 3 = \frac{dy}{dx}; dy = 3dx \mid \text{Differentialschreibweise}$$

$$\Delta y = f(x_1) - f(x_0); \Delta x = x_1 - x_0$$

$$\Delta y \approx dy = 3dx \approx \Delta x = 3 \times 0.1 = 0.3$$

7.2.2 Rechenregeln für Differentiale

Ableitungsregeln	Regeln für Differentiale
$[c]' = 0$	$d[c] = 0$
$[cf]' = cf'$	$d[cf] = cdf$
$[f + g]' = f' + g'$	$d[f + g] = df + dg$
$[fg]' = f'g + fg'$	$d[fg] = df \times g + f \times dg$
$[\frac{f}{g}]' = \frac{f'g - fg'}{g^2}$	$d[\frac{f}{g}] = \frac{df \times g - f \times dg}{g^2}$

7.3 Monotonie

- Gilt $f'(x) > 0$ in einem Intervall I , dann ist f dort **streng monoton wachsend**.
- Gilt $f'(x) \geq 0$ in einem Intervall I , dann ist f dort **monoton wachsend**.
- Gilt $f'(x) < 0$ in einem Intervall I , dann ist f dort **streng monoton fallend**.
- Gilt $f'(x) \leq 0$ in einem Intervall I , dann ist f dort **monoton fallend**.

7.3.1 Lokale oder relative Extrema

Notwendige Bedingung für ein lokales Extremum von f in x_0 : $f'(x_0) = 0$ Diese Bedingung ist aber nicht hinreichend, es ist erst ein **kritischer Punkt**

Wenn $f'(x_0) = 0$ **und**:

$f''(x_0) > 0$ dann liegt ein lokales (oder relatives) Minimum vor. $f''(x_0) < 0$ dann liegt ein lokales (oder relatives) Maximum vor.

7.4 Höhere Ableitungen

$$y'' = f''(x) = \frac{d}{dx}[f'(x)] = \frac{d}{dx}\left(\frac{dy}{dx}\right) = \frac{d^2y}{dx^2}$$

Geometrische Bedeutung: die 2. Ableitung ist positiv wenn die 1. Ableitung (also die Steigung) zunimmt wenn man sich in Richtung zunehmender x entlang der Kurve bewegt.

- Gilt $f''(x) > 0$ in einem Intervall I , dann weist f dort eine **Linkskrümmung** auf. Wir sagen f ist **konvex**.
- Gilt $f''(x) < 0$ in einem Intervall I , dann weist f dort eine **Rechtskrümmung** auf. Wir sagen f ist **konkav**.

7.5 Krümmung

Die Krümmung der Kurve $y = f(x)$ an der Stelle x ist:

$$K(x) = \frac{y''(x)}{[1+(y'(x))^2]^{\frac{3}{2}}}; \text{ Krümmungskreisradius } p(x) = \frac{1}{|K(x)|}$$

Für $K > 0$ hat man eine Links- und für $K < 0$ eine Rechtskrümmung.


Chapter 8

SW07

Differentialrechnung IV – Kurvendiskussion, Optimierung

8.1 Parameterdarstellung von Kurven

Neben der Form $y = f(x)$ kann man Kurven auch in der Parameterform beschreiben. Jedem Wert des Parameters t wird dabei ein Punkt $\vec{x}(t)$ in der Ebene (oder auch im Raum) zugeordnet. Man nennt dies auch Parameterdarstellung der Kurve.



Eine Kurve γ ist eine Abb. der Form:

$$\gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^2, t \mapsto \vec{x}(t) = \begin{bmatrix} x(t) \\ y(t) \end{bmatrix}$$

Für $t = a$ ist man am Kurvenanfang, für ein beliebiges $t \in [a, b]$ an der Stelle $\vec{x}(t)$ und für $t = b$ am Kurvenende.

Für jeden Punkt \vec{x} auf der Kurve gibt es genau ein $t \in [a, b]$ so, dass $\vec{x}(t)$ (und auch die Umkehrung gibt!)

8.1.1 Beispiel

Funktion: $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto y = f(x)$

Parameter: $t = x$

Parameterform: $\gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^2, t \mapsto \vec{x}(t) = \begin{bmatrix} t \\ f(t) \end{bmatrix}$


Funktion: $y = x^2$
 $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}_0^+, x \mapsto x^2$

Kurve: $c : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \times \mathbb{R}_0^+, t \mapsto \begin{bmatrix} t \\ t^2 \end{bmatrix}$

8.1.2 Ableitung eines Vektors

Einen Vektor $\vec{x}(t)$ leitet man nach dem Parameter t ab, indem man jede Komponente des Vektors nach t ableitet.

8.1.3 Ableitung einer in Parameterform gegebenen Funktion



Parameterform der Kurve γ

$$\vec{x}(t) = \begin{bmatrix} x(t) \\ y(t) \end{bmatrix}, a \leq t \leq b.$$


Ist γ gleich dem Graphen von $y = f(x)$ dann gilt für die Steigung der Tangente

$$y' = \frac{\dot{y}}{\dot{x}}$$

wobei \dot{y} die Ableitung von $y(t)$, bzw \dot{x} von $x(t)$ nach t ist.

Beachte: die Steigung der Tangente an y' ist die selbe wie die Steigung des Vektors $\vec{x}(t)$. Und diese lässt sich aus den beiden Komponenten $\dot{y}(t)$ und $\dot{x}(t)$ berechnen.

8.1.4 Krümmungskreismittelpunkt



Punkt auf der Kurve $\vec{x}(t) = [x, y(x)]^T$, Tangente $\vec{t} = [1, y'(x)]^T$, Normale $\vec{n}(x) = [-y'(x), 1]^T$. Mittelpunkt des Krümmungskreises (rot):


$$\vec{x}_M(x) = \vec{x}(x) + \frac{1}{K(x)} \frac{\vec{n}(x)}{|\vec{n}(x)|}$$

Damit hat man für den Krümmungskreismittelpunkt:

$$\vec{x}_M(x) = \begin{bmatrix} x_M(x) \\ y_M(x) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x - y'(x) \frac{1+(y'(x))^2}{y''(x)} \\ y(x) + \frac{1+(y'(x))^2}{y''(x)} \end{bmatrix} \quad \text{wobei } K(x) = \frac{y''(x)}{(1+(y'(x))^2)^{\frac{3}{2}}}$$

8.2 Kurven in Polarkoordinaten

Oft verwendet man anstelle der kartesischen Koordinaten (x, y) Polarkoordinaten (r, ϕ) . Für die Koordinatentransformation gilt:



Polar- zu kartesischen Koordinaten:

$$x = r \cos \phi$$


$$y = r \sin \phi$$

Kartesische zu Polarkoordinaten:

$$r = \sqrt{x^2 + y^2}$$

$$\tan \phi = \frac{y}{x}$$

Beachte: Verwendet man $\phi = \arctan(\frac{y}{x})$ erhält man $\phi \in (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$. Die Vorzeichen von x und y bestimmen, in welchem Quadranten der Punkt P liegt. Damit kann dann $\phi \in [0, 2\pi]$ bestimmt werden.



Eine in Polarkoordinaten gegebene Kurve γ wird durch folgende Abbildung spezifiziert:

$$\gamma : [\alpha, \beta] \rightarrow \mathbb{R}, \phi \mapsto r = r(\phi)$$

Jedem Winkel $\phi \in [\alpha, \beta]$ wird der Abstand der Kurve $r = r(\phi)$ vom Ursprung zugeordnet.

Beachte: Alle Winkel werden von der positiven x-Achse im Gegenuhrzeigersinn gemessen. Hier ist damit $\alpha < 0$ und $\beta > 0$.

8.2.1 Ableitung einer in Polarkoordinaten gegebene Funktion

Die gewöhnliche Ableitung einer Funktion wird bestimmt, indem man die Polarkoordinaten in Parameterform transformiert

$$x = x(\phi) = r(\phi) \cos \phi$$

$$y = y(\phi) = r(\phi) \sin \phi$$

Hier ist jetzt ϕ der Parameter. Formel $y'(x) = \frac{\dot{y}}{\dot{x}}$

$$y'(x) = \frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{d\phi}}{\frac{dx}{d\phi}} = \frac{\dot{r}(\phi) \sin \phi + r(\phi) \cos \phi}{\dot{r}(\phi) \cos \phi - r(\phi) \sin \phi}$$

8.3 Kurvendiskussion

Generelles Vorgehen:

- **Definitions- und Wertebereich, Definitionslücken, Unstetigkeitsstellen**
- **Symmetrien:** ist f gerade $f(x) = f(-x)$, ungerade $f(x) = -f(-x)$ oder T-periodisch $f(x+T) = f(x)$.
- **Nullstellen** $f(x) = 0$; **Schnittpunkte mit y-Achse** $f(0) = y$
- **Pole:** Nenner verschwindet; **senkrechte Asymptoten:** Polgeraden
- **Ableitungen** in der Regel bis zur 3. Ordnung
- **Relative Extremwerte** (Maxima, Minima): Notwendige Bedingung $f'(x) = 0$, $f''(x) > 0 = \text{Minima}$, $f''(x) < 0 = \text{Maxima}$.
- **Monotonieeigenschaften, Wendepunkte, Krümmung**
- **Asymptotisches Verhalten** für $x \rightarrow \pm\infty$
- **Krümmungskreismitelpunkt**
- **Graph G(f) der Funktion f skizzieren**

8.3.1 Symmetrien Beispiele

Funktion	Bemerkung
x^{2n}	Gerade: $x^2, x^4, x^6 \dots$
x^{2n-1}	Ungerade: $x, x^3, x^5 \dots$
$\cos 3x$	Periodisch: $T = \frac{2\pi}{3}$
e^{-x^2}	Gerade
$\sin 2x$	Ungerade, Periodisch $T = \pi$
$x^3 \sin x$	Gerade

In Quotient-funktion: Zähler gerade, Nenner ungerade = Funktion ungerade.

8.3.2 Wende- und Sattelpunkte

Notwendige und hinreichende Bedingung für einen Wendepunkt der Funktion $y =$

$f(x)$ in x_0 :

$f''(x_0) = 0$, und $f'''(x_0) \neq 0$.

Gilt zudem $f'(x_0) = 0$, dann hat man in x_0 einen Sattelpunkt.

8.3.3 Beispiel

Funktion: $y = \frac{-5x^2+5}{x^3}$

Definitions- und Wertebereich:

$$D = \mathbb{R} \setminus \{0\}, W = \mathbb{R}$$

Symmetrie:

Zähler gerade, Nenner ungerade = Funktion ungerade.

Nullstellen:

$$y = \frac{-5x^2+5}{x^3} = 5 \frac{1-x^2}{x^3} = 5 \frac{(1+x)(1-x)}{x^3}$$

$$x_{1,2} = -1, 1$$

Polstellen bei 0:

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{-5x^2+5}{x^3} = \frac{5}{0^-} = -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{-5x^2+5}{x^3} = \frac{5}{0^+} = \infty$$

Ableitungen:

$$y = \frac{-5x^2+5}{x^3}$$

$$y' = 5 \frac{x^2-3}{x^4}$$

$$y'' = 5 \frac{12-2x^2}{x^5}$$

$$y''' = 30 \frac{x^2-10}{x^6}$$

Extrema:

$$y' = 5 \frac{x^2-3}{x^4} = 0; x^2 - 3 = 0; x_{1,2} = \pm\sqrt{3}$$

$$y''(x_1) = y''(\sqrt{3}) = 5 \frac{12-2\sqrt{3}^2}{\sqrt{3}^5} > 0 \text{ Minimum}$$

$$y''(x_2) = y''(-\sqrt{3}) = 5 \frac{12-2 \times -\sqrt{3}^2}{-\sqrt{3}^5} < 0 \text{ Maximum}$$

Wendepunkte:

$$y' = 5 \frac{12-2x^2}{x^4} = 0; 12 - 2x^2 = 0; 6 = x^2; x = \pm\sqrt{6}$$

$$y'''(\pm\sqrt{6}) = 30 \frac{(\pm\sqrt{6})^2-10}{(\pm\sqrt{6})^6} = 30 \frac{-4}{6^3} \neq 0$$

Wendepunkte bei $-\sqrt{6}$ und $\sqrt{6}$

Asymptotisches Verhalten:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{5-5x^2}{x^3} = \lim_{x \rightarrow \infty} 5 \frac{1-x^2}{x^3} = \lim_{x \rightarrow \infty} 5 \left(\frac{1}{x^3} - \frac{1}{x} \right) = 5 \left(\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x^3} - \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x} \right) = 0$$

8.4 Optimierungsproblem - Allgemeines Vorgehen

Bei Extremalwertprobleme (oder Extremwert- oder Extremalaufgaben) sucht man einen Extremwert für ein bestimmtes Problem, zB maximales Volumen, minimale Distanz, etc.

- Zuerst die Funktion bestimmen, welche das Problem beschreibt.
- Aus den Nullstellen der Ableitung ($f'(x) = 0$) erhält man Kandidaten für Extrempunkte x_0 (mit zugehörigen Extremwerten $f(x_0)$)
- Mit den höheren Ableitungen überprüft man, ob es sich um Minima, Maxima oder Sattelpunkte handelt:
Rel. Max in x_0 : $f^{(n)}(x_0) < 0$, n gerade und $f^{(k)}(x_0) = 0$, für $1 \leq k < n$
Rel. Min in x_0 : $f^{(n)}(x_0) > 0$, n gerade und $f^{(k)}(x_0) = 0$, für $1 \leq k < n$
Sattelpunkt x_0 : $f^{(n)}(x_0) \neq 0$, n ungerade und $f^{(k)}(x_0) = 0$, für $2 \leq k < n$
- Die Funktionswerte der gefundenen Maxima (Minima) und die Werte der Funktion an den Rändern werden jetzt verglichen. Das grösste (kleinste) ist der gesuchte Extremwert.

8.4.1 Brechungsgesetz

???

8.5 Regel von de l'Hôpital

8.5.1 Theorem - Regel von de l'Hôpital für unbestimmte Ausdrücke der Form 0/0

Wir nehmen an f und g seien in einer Umgebung von $x = a$ differenzierbar und $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = 0$ und $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = 0$. Dann gilt $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)}$ falls die rechte Seite existiert oder $\pm\infty$ ist.

Weiter gilt die Regel auch für die Grenzübergänge $x \rightarrow a^-$, $x \rightarrow a^+$, $x \rightarrow +\infty$, $x \rightarrow -\infty$.

8.5.2 Vorgehen

- Überprüfe, ob $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)}$ ein unbestimmter Ausdruck der Form 0/0 ist.

- Wenn ja, leite f und g separat ab.
- bestimme den Grenzwert $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)}$. Wenn dieser endlich ist oder $\pm\infty$, dann ist dies der gesuchte Grenzwert.

8.5.3 Vorgehen für weitere unbestimmte Ausdrücke

- Satz gilt entsprechend auch für unbestimmte Ausdrücke der Form $\frac{\infty}{\infty}$
- Unbestimmte Ausdrücke der Form $0 \times \infty$ bringt man mittels der Identität $f(x)g(x) = \frac{f(x)}{\frac{1}{g(x)}}$ auf einen unbestimmten Ausdruck der Form $0/0$.
- Unbestimmte Ausdrücke der Form $\infty - \infty$ lassen sich oft durch geeignete algebraische Umformungen auf unbestimmte Ausdrücke der Form $0/0$ zurückführen.
- Unbestimmte Ausdrücke der Form $0^0, \infty^0, 1^\infty$ schreiben wir in der Form $y = f(x)^{g(x)}$, logarithmieren beide Seiten und erhalten dann mit $\ln y = g(x) \times \ln(f(x))$ einen der oben besprochenen Ausdrücke.

Chapter 9

SW08 Integralrechnung I – Flächenberechnung und Integral

Umkehrung der Differenzierung / Ableitung

9.1 Stammfunktion

Eine differenzierbare Funktion $F(x)$ heisst Stammfunktion von $f(x)$ falls:
 $F'(x) = f(x)$

Eigenschaften der Stammfunktion:

- Zu jeder stetigen Funktion $f(x)$ gibt es ∞ -viele Stammfunktionen
- Zwei beliebige Stammfunktionen $F_1(x)$ und $F_2(x)$ unterscheiden sich nur durch eine additive Konstante, dh
 $F_1(x) - F_2(x) = \text{const}$
- Ist $F_1(x)$ eine beliebige Stammfunktion von $f(x)$, dann ist auch $F_2(x) = F_1(x) + C$ ($C \in \mathbb{R}$) eine Stammfunktion von $f(x)$. Daher ist die Menge aller Stammfunktionen von der Form
 $F(x) = F_1(x) + C$, wobei C eine beliebige (reelle) Konstante ist.

9.2 Umkehrung der Differentiation

Für Polynomfunktion:

$$f(x) = x^n \rightarrow F(x) = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C$$

Für alle anderen Funktionen siehe: 5.6.1 Ableitungen
Konstante $+C$ dabei nicht vergessen!

9.3 Bestimmtes Integral Flächenberechnung

$$f(x), [a, b]$$

$$I = \int_a^b f(x) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n f(x_k) \Delta x$$

$$\Delta x = \frac{b-a}{n}$$

$$x_k = a + k \Delta x$$

Wenn rechter Rand: f an der Stelle $x_k^* = x_k$

Wenn linker Rand: f an der Stelle $x_k^* = x_{k-1}$

$$S_n = \sum_{k=1}^n f(x_k) \Delta x \text{ auflösen bis alle } k \text{ weg (siehe 9.4 Summen vereinfachen)}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_n \text{ auflösen, Resultat gleich Fläche im Intervall } [a, b]$$

9.3.1 Beispiel Rechter Rand

(siehe 9.4 Summen vereinfachen)

$$y = x^2, [0, 1], a = 0, b = 1$$

$$\Delta x = \frac{b-a}{n} = \frac{1-0}{n} = \frac{1}{n}$$

$$x_k = a + k \Delta x = 0 + k \frac{1}{n} = \frac{k}{n}$$

$$\text{Rechter Rand: } x_k^* = x_k, f(x_k^*) = f(x_k) = x_k^2 = \left(\frac{k}{n}\right)^2$$

$$S_n = \sum_{k=1}^n f(x_k) \Delta x = \sum_{k=1}^n \left(\frac{k}{n}\right)^2 \frac{1}{n} = \sum_{k=1}^n \frac{k^2}{n^3} = \frac{1}{n^3} \sum_{k=1}^n k^2$$

$$= \frac{1}{n^3} \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} = \dots = \frac{1}{6} \left(1 + \frac{1}{n}\right) \left(2 + \frac{1}{n}\right)$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{6} \left(1 + \frac{1}{n}\right) \left(2 + \frac{1}{n}\right) = \frac{1}{6} \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right) \left(2 + \frac{1}{n}\right) = \frac{1}{3}$$

9.3.2 Beispiel Linker Rand

(siehe 9.4 Summen vereinfachen)

$$y = x^3, [0, 2], a = 0, b = 2$$

$$\Delta x = \frac{b-a}{n} = \frac{2-0}{n} = \frac{2}{n}$$

$$x_k = a + k \Delta x = 0 + k \frac{2}{n} = \frac{2k}{n}$$

$$\text{Linker Rand: } x_k^* = x_{k-1}, f(x_k^*) = f(x_{k-1}) = x_{k-1}^3 = \left(\frac{2(k-1)}{n}\right)^3$$

$$S_n = \sum_{k=1}^n f(x_k) \Delta x = \sum_{k=1}^n \left(\frac{2(k-1)}{n}\right)^3 \frac{2}{n} = \sum_{k=1}^n \left(\frac{2}{n}\right)^3 (k-1)^3 \frac{2}{n} = \sum_{k=1}^n \left(\frac{2}{n}\right)^4 (k-1)^3$$

$$\left(\frac{2}{n}\right)^4 \sum_{k=1}^n (k-1)^3 = \left(\frac{2}{n}\right)^4 \sum_{k=1}^{n-1} k^3 = \left(\frac{2}{n}\right)^4 \frac{(n(n-1))^2}{n^4} = 4\left(1 - \frac{1}{n}\right)^2$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \lim_{n \rightarrow \infty} 4\left(1 - \frac{1}{n}\right)^2 = 4 \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{n}\right)^2 = 4$$

9.4 Summen vereinfachen

$$\sum_{k=1}^n k = \frac{n(n+1)}{2}$$

$$\sum_{k=1}^n k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$$

$$\sum_{k=1}^n k^3 = \left(\frac{n(n+1)}{2}\right)^2$$

$$\sum_{k=1}^n (k-1)^3 = \sum_{k=1}^{n-1} k^3 = \left(\frac{n(n-1)}{2}\right)^2$$

Chapter 10

SW09 Integralrechnung II – unbestimmtes Integral und Hauptsatz der Infinitesimalrechnung

10.1 Unbestimmtes Integral und Flächenfunktion

$$I(x) = \int_a^x f(t) dt$$

a ist ein bestimmter Wert, x ist unbestimmt. Darum unbestimmtes Integral.

10.1.1 Theorem - unbestimmte Integrale

- Das unbestimmte Integral $I(x) = \int_a^x f(t) dt$ stellt den Flächeninhalt zwischen $y = f(t)$ über dem Intervall $[a, x]$ in Abhängigkeit von der oberen Grenze x dar.
- Zu jeder Funktion $f(t)$ gibt es ∞ -viele unbestimmte Integrale, die sich nur durch ihre untere Grenze (a) unterscheiden.
- Die Differenz zweier unbestimmter Integrale $I_1(x)$ und $I_2(x)$ ist eine Konstante.

Die geom. Deutung als Fläche ist nur für $f(t) \geq 0$ und $x \geq a$ möglich. Man muss klar zwischen dem bestimmten Integral (das ist eine reelle Zahl) und dem unbestimmten Integral (das ist eine Funktion der oberen Grenze) unterscheiden!

10.1.2 Beispiel

Zwei unbestimmte Integrale der Normalparabel $f(t) = t^2$


$$I_1(x) = \int_0^x t^2 dt \text{ und } I_2(x) = \int_1^x t^2 dt$$

Deuten Sie den Unterschied $I_1(x) - I_2(x)$ geometrisch!

$$A = I_1(x) - I_2(x) = \int_0^1 t^2 dt$$

10.2 Delta x ändern

Wir lassen die unterschiedliche Bezeichnung zwischen der Integrationsvariablen und der oberen Grenze fallen. Aus der Abb. liest man folgendes:



Einerseits hat man $\Delta I = I(x + \Delta x) - I(x)$ andererseits gilt die Approximation $\Delta I \approx f(x) \Delta x$. Also zusammengefasst:

$$f(x) \approx \frac{I(x + \Delta x) - I(x)}{\Delta x}$$

Man kann zeigen, dass für stetige f gilt:

$$f(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{I(x + \Delta x) - I(x)}{\Delta x} = I'(x)$$

Wegen $I'(x) = f(x)$ ist also das unbestimmte Integral (oder die Flächenfunktion) $I(x)$ eine Stammfunktion von $f(x)$.

10.3 Fundamentalsatz der Differential- und Integralrechnung Theorem

Jedes unbestimmte Integral $\int_a^x f(t) dt$ der stetigen Funktion $f(x)$ ist eine Stammfunktion von $f(x)$:

$$I(x) = \int_a^x f(t) dt \implies I'(x) = f(x).$$

Folgerungen aus dem Fundamentalsatz:

- $I(x)$ ist wegen $I'(x) = f(x)$ eine stetig differenzierbare Funktion (falls f stetig).
- Jedes unbestimmte Integral hat die Form

$$I(x) = \int_a^x f(t)dt = F(x) + C$$

wobei $F(x)$ irgendeine (spezielle) Stammfunktion von $f(x)$ und C_1 eine geeignete (reelle) Konstante bedeutet (die von a abhängt).

- Die Menge aller unbestimmter Integrale von $f(x)$ hat die Form $\int f(x)dx = F(x) + C$ ($F'(x) = f(x)$) wobei $F(x)$ irgendeine (spezielle) Stammfunktion von $f(x)$ ist und $C \in \mathbb{R}$ alle reellen Werte durchläuft. Man nennt C Integrationskonstante.
- Für stetige Funktionen sind Stammfunktionen und unbestimmtes Integral das selbe.

10.3.1 Beispiele

$$F_1(x) = \int (2x + 1)dx = x^2 + x + C$$

$$F_2(x) = \int e^x dx = e^x + C$$

$$F_3(x) = \int \frac{4}{1+x^2} dx = 4 \arctan(x) + C$$

$$F_4(x) = \int \ln(x) dx = x \ln(x) - x + C$$

10.4 Berechnung bestimmter Integrale mit Stammfunktion

Es gilt:

$$I(x) = \int_a^x f(t)dt = F(x) + C$$

$$I(a) = \int_a^a f(x)dx = F(a) + C = 0 \rightarrow C = -F(a)$$

somit gilt:

$$I(x) = \int_a^x f(t)dt = F(x) - F(a), \text{ und schliesslich } \int_a^b f(t)dt = F(b) - F(a)$$

Das Integral hängt nicht von der Wahl der Stammfunktion $F(x)$ ab: man kann irgendeine (spezielle) Stammfunktion wählen!

10.4.1 Beispiel

Berechnen Sie die bestimmten Integrale $\int_0^1 x^2 dx$.

$$\int_0^1 x^2 dx = \left[\frac{1}{3}x^3 + C \right]_0^1 = \left(\frac{1}{3}1^3 + C \right) - \left(\frac{1}{3}0^3 + C \right) = \frac{1}{3} + C - 0 - C = \frac{1}{3}$$

→ Hier beim bestimmten Integral zum Flächenberechnen kann man $+C$ weglassen (aber nur hier, da es sich immer rauskürzt)!

Berechnen Sie die bestimmten Integrale $\int_0^{\pi} \sin x dx$.

$$\int_0^{\pi} \sin x dx = [-\cos x]_0^{\pi} = -[\cos x]_0^{\pi} = -(\cos \pi - \cos 0) = -(-2) = 2$$

10.5 1. Substitutionsregel für unbestimmte Integrale - Theorem

Es gilt:

$$\int f(g(x))g'(x)dx = \left[\int f(u)du \right]_{u=g(x)}$$

Vorgehen:

- Substituiere formal $g(x) = u, g'(x)dx = du$
- Integriere unbestimmt nach u
- Ersetze u wieder durch $g(x)$

10.5.1 Beispiele

Berechne das unbestimmte Integral $I = \int (x^2 + 1)^{50} 2x dx$

$$u = x^2 + 1$$

$$\frac{du}{dx} = 2x$$

$$du = 2x dx$$

$$I = \int (x^2 + 1)^{50} 2x dx = \int u^{50} du = \frac{1}{51} u^{51} + C = \frac{1}{51} (x^2 + 1)^{51} + C$$

Berechne das unbestimmte Integral $I = \int x \cos x^2 dx$

$$u = x^2$$

$$\frac{du}{dx} = 2x$$

$$du = 2x dx$$

$$\int x \cos x^2 dx = \frac{1}{2} \int \cos x^2 2x dx = \frac{1}{2} \int \cos(u) du = \frac{1}{2} \int \sin(u) + C = \frac{1}{2} \int \sin(x^2) + C$$

10.6 1. Substitutionsregel für bestimmte Integrale - Theorem

Es gilt:

$$\int_a^b f(g(x))g'(x)dx = \int_{g(a)}^{g(b)} f(u)du$$

Vorgehen:

- Substituiere formal $g(x) = u, g'(x)dx = du$
- Ersetze die x-Grenzen a,b durch die u-Grenzen $g(a), g(b)$
- Integriere

10.6.1 Beispiele

Berechne das bestimmte Integral $I = \int_0^2 x(x^2 + 1)^3 dx$

$$u = u(x) = x^2 + 1$$

$$\frac{du}{dx} = 2x$$

$$du = 2x dx$$

$$I = \int_0^2 x(x^2 + 1)^3 dx = \frac{1}{2} \int_0^2 2x(x^2 + 1)^3 dx$$

Intervallgrenzen: 2, 0. Neue Grenzen: $u(2) = 5, u(0) = 1$

$$\frac{1}{2} \int_1^5 u^3 du = \frac{1}{2} \left[\frac{1}{4} u^4 \right]_1^5 = \frac{1}{8} [u^4]_1^5 = \frac{1}{8} (625 - 1) = 78$$

Berechne das bestimmte Integral $I = \int_0^{\frac{\pi}{3}} \frac{\cos x}{1 + 4 \sin^2 x} dx$

$$u = u(x) = \sin x$$

$$\frac{du}{dx} = \cos x$$

$$du = \cos x dx$$

Intervallgrenzen: $\frac{\pi}{3}, 0$. Neue Grenzen: $u(\frac{\pi}{3}) = \frac{\sqrt{3}}{2}, u(0) = 0$

$$\int_0^{\frac{\sqrt{3}}{2}} \frac{du}{a + 4u^2} = \int_0^{\frac{\sqrt{3}}{2}} \frac{du}{a + (2u)^2} = \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\sqrt{3}}{2}} \frac{2du}{a + (2u)^2}$$

$$v = v(x) = 2u$$

$$\frac{dv}{du} = 2$$

$$dv = 2du$$

Intervallgrenzen: $\frac{\sqrt{3}}{2}, 0$, neue Grenzen: $v(\frac{\sqrt{3}}{2}) = \sqrt{3}, v(0) = 0$

$$\frac{1}{2} \int_0^{\sqrt{3}} \frac{dv}{1 + v^2} = \frac{1}{2} [\arctan(v)]_0^{\sqrt{3}} = \frac{1}{2} (\arctan \sqrt{3} - \arctan 0) = \frac{\pi}{6}$$

Chapter 11

SW10 Integralrechnung III – Integrationstechnik

11.1 2. Substitutionsregel

Die 2. Substitutionsregel ist flexibler und auf beliebige Integrale anwendbar:

$$\int f(x)dx$$

indem man dort $x = u(t)$ setzt und somit wegen $dx = u'(t)dt$ schreiben kann.

$$\int f(x)dx = \left[\int f(u(t))u'(t)dt \right]_{t=u^{-1}(x)}$$

u muss im verwendeten t -Intervall umkehrbar sein, damit man $x = u(t)$ nach t auflösen, dh. durch x ausdrücken kann ($t = u^{-1}(x)$).

11.1.1 Theorem - 2. Substitutionsregel für unbestimmte Integrale

$$\text{Es gilt: } \int f(x)dx = \left[\int f(u(t))u'(t)dt \right]_{t=u^{-1}(x)}$$

Vorgehen:

- Wähle eine geeignete invertierbare Substitutionsfunktion u
- Substituiere formal $x = u(t)$, $dx = u'(t)dt$
- Integriere nach t
- Drücke t durch x aus

11.1.2 Beispiele

Berechne $I = \int x^2 \sqrt{x-1} dx$

$$u = x - 1$$

$$x = u + 1$$

$$\frac{du}{dx} = 1$$

$$du = dx$$

$$\begin{aligned} I &= \int x^2 \sqrt{x-1} dx = \int (u+1)^2 \sqrt{u} du = \int (u^2 + 2u + 1) u^{\frac{1}{2}} du = \int (u^{\frac{5}{2}} + 2u^{\frac{3}{2}} + u^{\frac{1}{2}}) du \\ &= \frac{u^{\frac{7}{2}}}{\frac{7}{2}} + \frac{u^{\frac{5}{2}}}{\frac{5}{2}} + \frac{u^{\frac{3}{2}}}{\frac{3}{2}} + C = \frac{2}{7} u^{\frac{7}{2}} + \frac{2}{5} u^{\frac{5}{2}} + \frac{2}{3} u^{\frac{3}{2}} + C \\ &= \left(\frac{2}{7} u^{\frac{6}{2}} + \frac{2}{5} u^{\frac{4}{2}} + \frac{2}{3} u^{\frac{2}{2}} \right) u^{\frac{1}{2}} + C = \left(\frac{2}{7} u^{\frac{6}{2}} + \frac{2}{5} u^{\frac{4}{2}} + \frac{2}{3} u^{\frac{2}{2}} \right) \sqrt{u} + C = \left(\frac{2}{7} u^3 + \frac{2}{5} u^2 + \frac{2}{3} u \right) \sqrt{u} + C \\ &= \left(\frac{2}{7} (x-1)^3 + \frac{2}{5} (x-1)^2 + \frac{2}{3} (x-1) \right) \sqrt{x-1} + C \end{aligned}$$

Berechne $I = \int \frac{dx}{\sqrt{1+e^x}}$ es werden zwei Substitutionen benötigt.

$$u = e^x$$

$$\frac{du}{dx} = e^x$$

$$du = e^x dx \implies dx = \frac{du}{e^x} = \frac{du}{u}$$

$$I = \int \frac{dx}{\sqrt{1+e^x}} = \int \frac{\frac{du}{u}}{\sqrt{1+u}} = \int \frac{du}{u\sqrt{1+u}}$$

$$v = \sqrt{1+u}$$

$$v^2 = 1+u \implies u = v^2 - 1$$

$$\frac{du}{dv} = 2v$$

$$du = 2v dv$$

$$\int \frac{2v dv}{(v^2-1)v} = 2 \int \frac{dv}{v^2-1} = \frac{1}{2} 2 \log \left| \frac{v-1}{v+1} \right| + C = \log \left| \frac{\sqrt{1+u}-1}{\sqrt{1+u}+1} \right| + C = \log \left| \frac{\sqrt{1+e^x}-1}{\sqrt{1+e^x}+1} \right| + C$$

11.1.3 Theorem - 2. Substitutionsregel für bestimmte Integrale

$$\text{Es gilt: } \int_a^b f(x) dx = \int_{u^{-1}(a)}^{u^{-1}(b)} f(u(t)) u'(t) dt$$

Vorgehen:

- Wähle eine geeignete invertierbare Substitutionsfunktion u
- Substituiere formal $x = u(t), dx = u'(t) dt$
- Ersetze die x -Grenzen a, b durch die t -Grenzen $u^{-1}(a), u^{-1}(b)$
- Integriere

11.1.4 Beispiele

Berechne $I = \int_1^2 x^2 \sqrt{x-1} dx$

$$t = x - 1$$

$$x = t + 1$$

$$\frac{dx}{dt} = 1$$

$$dx = dt$$

Alte Grenzen: $a = 1, b = 2$ neue Grenzen: $t(a) = 0, t(b) = 1$

$$\begin{aligned} \int_0^1 (t+1)^2 \sqrt{t} dt &= \int_0^1 (t^2 + 2t + 1) t^{\frac{1}{2}} dt = \int_0^1 (t^{\frac{5}{2}} + 2t^{\frac{3}{2}} + t^{\frac{1}{2}}) dt = \left[\frac{2}{7} t^{\frac{7}{2}} + \frac{4}{5} t^{\frac{5}{2}} + \frac{2}{3} t^{\frac{3}{2}} \right]_0^1 \\ &= \frac{2}{7} + \frac{4}{5} + \frac{2}{3} - 0 = \frac{184}{105} \end{aligned}$$

Berechne $I = \int_0^{\ln 3} \frac{dx}{\sqrt{1+e^x}}$ es werden zwei Substitutionen benötigt.

$$u = e^x$$

$$x = \ln u$$

$$dx = \frac{1}{u} du$$

$$I = \int_0^{\ln 3} \frac{dx}{\sqrt{1+e^x}} = \int_0^{\ln 3} \frac{1}{\sqrt{1+e^x}} dx$$

Alte Grenzen: $a = 0, b = \ln 3$, neue Grenzen: $u(\ln 3) = 3, u(0) = 1$

$$\int_1^3 \frac{1}{\sqrt{1+u}} \times \frac{1}{u} du$$

$$v = \sqrt{1+u}$$

$$v^2 = 1+u$$

$$u = v^2 - 1$$

$$\frac{du}{dv} = 2v$$

$$du = 2v dv$$

Alte Grenzen: $a = 1, b = 3$, neue Grenzen: $v(1) = \sqrt{2}, v(3) = 2$

$$\int_{\sqrt{2}}^2 \frac{1}{v} \frac{1}{v^2-1} 2v dv = 2 \int_{\sqrt{2}}^2 \frac{dv}{v^2-1} = 2 \left[\frac{1}{2} \log \left| \frac{v-1}{v+1} \right| \right]_{\sqrt{2}}^2 \approx 0.6641$$

11.2 Häufige Integralsubstitutionen

A) Integraltyp	Substitution
$\int f(ax + b)dx$	$u = ax + b$ $dx = \frac{du}{a}$

Merkmal: Die Variable x tritt in der linearen Form $ax + b$ auf ($a \neq 0$)

A) Beispiele	Substitution
$\int (2x - 3)^6 dx$	$u = 2x - 3$
$\int \sqrt{4x + 5} dx$	$u = 4x + 5$
$\int e^{4x+2} dx$	$u = 4x + 2$

B) Integraltyp	Substitution
$\int f(x)f'(x)dx$	$u = f(x)$ $dx = \frac{du}{f'(x)}$

Merkmal: Der Integrand ist das Produkt aus einer Funktion $f(x)$ und ihrer Ableitung $f'(x)$

B) Beispiele	Substitution
$\int \sin(x) \cos(x) dx$	$u = \sin x$
$\int \frac{\ln x}{x} dx$	$u = \ln x$

C) Integraltyp	Substitution
$\int \frac{f'(x)}{f(x)} dx$	$u = f(x)$ $dx = \frac{du}{f'(x)}$

Merkmal: Im Zähler steht die Ableitung des Nenners.

C) Beispiele	Substitution
$\int \frac{2x-3}{x^2-3x+1} dx$	$u = x^2 - 3x + 1$
$\int \frac{e^x}{e^x+5} dx$	$u = e^x + 5$

D) Integraltyp	Substitution
$\int f(x; \sqrt{a^2 - x^2}) dx$	$x = a \sin u$ $dx = a \cos(u) du$ $\sqrt{a^2 - x^2} = a \cos u$
Merkmal: Der Integrand enthält eine Wurzel vom Typ $\sqrt{a^2 - x^2}$	
D) Beispiele	Substitution
$\int \sqrt{r^2 - x^2} dx$	$x = r \sin u$
$\int x \times \sqrt{r^2 - x^2} dx$	$x = r \sin u$
$\int \frac{x}{\sqrt{4-x^2}}$	$x = 2 \sin u$
E) Integraltyp	Substitution
$\int f(x; \sqrt{a^2 + x^2}) dx$	$x = a \sinh u$ $dx = a \cosh(u) du$ $\sqrt{a^2 + x^2} = a \cosh u$
Merkmal: Der Integrand enthält eine Wurzel vom Typ $\sqrt{a^2 + x^2}$	
E) Beispiele	Substitution
$\int \sqrt{x^2 + 1} dx$	$x = \sinh u$
$\int \frac{dx}{\sqrt{x^2 + 4}}$	$x = 2 \sinh u$
F) Integraltyp	Substitution
$\int f(x; \sqrt{x^2 - a^2}) dx$	$x = a \cosh u$ $dx = a \sinh(u) du$ $\sqrt{x^2 - a^2} = a \sinh u$
Merkmal: Der Integrand enthält eine Wurzel vom Typ $\sqrt{x^2 - a^2}$	
F) Beispiele	Substitution
$\int \sqrt{x^2 - 9}$	$x = 3 \cosh u$
$\int \frac{x}{\sqrt{x^2 - 25}} dx$	$x = 5 \cosh u$

11.3 Theorem - Partielle Integration - Produktintegration

Es gilt: $\int u'(x)v(x)dx = u(x)v(x) - \int u(x)v'(x), dx$

Vorgehen (Ziel: das Integral auf der Rechten Seite muss einfacher sein):

- Zerlege den Integranden in ein Produkt von zwei Faktoren
- Ein Faktor ist $u'(x)$, der andere ist $v(x)$

- Der erste Faktor $u'(x)$ kommt auf die rechte Seite überall in integrierter Form, dh als $u(x)$ vor
- Der zweite Faktor $v(x)$ kommt auf der rechten Seite nur unter dem Integral in abgeleiteter Form, dh als $v'(x)$ vor

Ausserdem:

$$\begin{aligned}(uv)' &= u'v + uv' \\ uv &= \int u'v dx + \int uv' dx \\ uv - \int u'v dx &= \int uv' dx\end{aligned}$$

11.3.1 Beispiel

Berechne $I = \int x \cos(x) dx$

$$u = x$$

$$u' = 1$$

$$v = \sin x$$

$$v' = \cos x$$

$$\rightarrow uv - \int u'v dx = \int uv' dx$$

$$\begin{aligned}I &= \int x \cos(x) dx = x \sin x - \int 1 \sin x dx = x \sin x - (-\cos x) + C \\ &= x \sin x + \cos x + C\end{aligned}$$

$$\text{Probe: } (x \sin x + \cos x + C)' = 1 \sin x + x \cos x - \sin x + 0 = x \cos(x) dx$$

11.3.2 Rekursionsbeziehung - Beispiel

Bei Integralen vom Typus $\int x^n \exp(\lambda x) dx$, $\int x^n \sin x dx$ und $\int x^n \cos x dx$, ($n \in \mathbb{N}$) lässt sich der vorkommende Exponent durch partielle oder Produktintegration um eins erniedrigen und somit rekursiv auf Null bringen.

Beispiel:

Leite eine Rekursionsbeziehung her, um $I_n = \int x^n \exp(\lambda x) dx$ zu berechnen.

$$u = x^n$$

$$u' = nx^{n-1}$$

$$v = \frac{1}{\lambda} e^{\lambda x}$$

$$v' = e^{\lambda x}$$

$$\frac{1}{\lambda} e^{\lambda x} x^n - \int nx^{n-1} \frac{1}{\lambda} e^{\lambda x} dx = \frac{1}{\lambda} e^{\lambda x} x^n - \frac{n}{\lambda} \int x^{n-1} e^{\lambda x} dx$$

$$I_{n-1} = \int x^{n-1} e^{\lambda x} dx$$

$$I_n = \frac{1}{\lambda} e^{\lambda x} x^n - \frac{n}{\lambda} I_{n-1}; I_0 = \frac{1}{\lambda} e^{\lambda x} + C$$

$$\begin{aligned}I_1 &= \frac{1}{\lambda} e^{\lambda x} x^1 - \frac{1}{\lambda} I_0 = \frac{1}{\lambda} e^{\lambda x} x^1 - \frac{1}{\lambda} \left(\frac{1}{\lambda} e^{\lambda x} + C \right) \\ &= \frac{1}{\lambda} e^{\lambda x} x^1 - \frac{1}{\lambda^2} e^{\lambda x} - \frac{C}{\lambda}; -\frac{C}{\lambda} = C_1\end{aligned}$$

11.3.3 Nur einen Faktor - Beispiel

Künstlich ein Produkt herstellen um partielle oder Produktintegration anwenden.

Berechne mit Hilfe partieller Integration $I = \int \ln x dx$.

$$I = \int \ln x dx = \int 1 \times \ln x dx$$

$$u = \ln x$$

$$u' = \frac{1}{x}$$

$$v = x$$

$$v' = 1$$

$$\int 1 \times \ln x dx = x \ln x - \int \frac{1}{x} x dx = x \ln x - x + C$$

$$\text{Probe: } (x \ln x - x + C)' = 1 \ln x + x \frac{1}{x} - 1 + 0 = \ln x$$

11.3.4 Mehrfache partielle Integration - Beispiel

Oft muss man mehrere Male hintereinander partiell integrieren!

Berechne mit Hilfe partieller Integration $I = \int e^{\alpha x} \sin(\beta x) dx$

$$u = \sin(\beta x)$$

$$u' = \beta \cos(\beta x)$$

$$v = \frac{1}{\alpha} e^{\alpha x}$$

$$v' = e^{\alpha x}$$

$$\frac{1}{\alpha} e^{\alpha x} \sin(\beta x) - \frac{\beta}{\alpha} \int e^{\alpha x} \cos(\beta x) dx$$

$$u = \cos(\beta x)$$

$$u' = -\beta \sin(\beta x)$$

$$v = \frac{1}{\alpha} e^{\alpha x}$$

$$v' = e^{\alpha x}$$

$$\frac{1}{\alpha} e^{\alpha x} \sin(\beta x) - \frac{\beta}{\alpha} \left(\frac{1}{\alpha} e^{\alpha x} \cos(\beta x) + \frac{\beta}{\alpha} \int e^{\alpha x} \sin \beta x dx \right)$$

wat

11.4 Theorem - Produktintegration für bestimmte Integrale

$$\text{Es gilt: } \int_a^b u'(x)v(x)dx = [u(x)v(x)]_a^b - \int_a^b u(x)v'(x)dx$$

Das Vorgehen ist (fast) exakt gleich bei unbestimmten Integralen ausser dass bei bestimmten Integralen die obere und untere Integrationsgrenze ins Spiel kommt.

11.4.1 Beispiele

Berechne mit Hilfe partieller Integration $I = \int_0^R x e^{-x} dx$.

$$u = x$$

$$u' = 1$$

$$v = -e^{-x}$$

$$v' = e^{-x}$$

$$[-xe^{-x}]_0^R + \int_0^R e^{-x} dx = -Re^{-R} + [-e^{-x}]_0^R = -Re^{-R} - e^{-R} - (-1) = 1 - (1 + R)e^{-R} = 1 - \frac{1+R}{e^R}$$

Berechne mit Hilfe partieller Integration $I = \int_0^{\pi} \sin^2 x dx$

$$I = \int_0^{\pi} \sin^2 x dx = \int_0^{\pi} \sin x \sin x dx$$

$$u = \sin x$$

$$u' = \cos x$$

$$v = -\cos x$$

$$v' = \sin x$$


$$[-\sin x \cos x]_0^{\pi} + \int_0^{\pi} \cos^2 x dx = 0 + \int_0^{\pi} (1 - \sin^2 x) dx = \int_0^{\pi} dx - \int_0^{\pi} \sin^2 x dx$$

$$I = [x]_0^{\pi} - I$$

$$2I = \pi$$

$$I = \frac{\pi}{2}$$

11.5 Mittelwerte



Der lineare Mittelwert \bar{y}_{linear} der Funktion $y = f(x)$ über dem Intervall $[a, b]$ gibt an, welchen Wert diese Funktion im Mittel hat.

Die Fläche des Rechtecks der Höhe \bar{y} ist gleich der Fläche der Kurve $y = f(x)$

$$A = \bar{y}_{linear}(b-a) = \int_a^b f(x) dx$$

11.5.1 Theorem - lineare Mittelwert

Der lineare Mittelwert von f über $[a, b]$: $\bar{y}_{linear} = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx$

11.5.2 Beispiel

Berechne den linearen Mittelwert der Funktion $y = \ln x$ im Intervall $[1, 5]$

$$\bar{y}_{linear} = \frac{1}{5-1} \int_1^5 \ln x dx = \frac{1}{4} [x(\ln x)]_1^5 = \frac{1}{4} (5(\ln 5 - 1)) - 1(0 - 1) \approx 1.012$$

11.5.3 Theorem - quadratische Mittelwert

Der quadratische Mittelwert von $y = f(x)$ über dem Intervall $[a, b]$ ist definiert durch:

$$\bar{y}_{\text{quadratisch}} = \sqrt{\frac{1}{b-a} \int_a^b [f(x)]^2 dx}$$

Sowohl lineare wie auch quadratische Mittelwerte werden oft im Zusammenhang mit periodischen Funktionen verwendet. In diesem Fall ist das Intervall $[a, b]$ meist ein Intervall von der Länge einer Periode T . Dabei ist es egal, welches der unendlich vielen Intervalle mit dieser Eigenschaft verwendet wird. Meist verwendet man deshalb das Intervall $[0, T]$.

11.5.4 Theorem - Mittelwertsatz der Integralrechnung

Ist f auf dem Intervall $[a, b]$ stetig, dann gibt es einen Punkt $\epsilon \in [a, b]$ so, dass gilt:


$$f(\epsilon)(b-a) = \int_a^b f(x) dx$$

Chapter 12

SW11 Integralrechnung IV– Anwendungen

12.1 Trapezregel

Unterteile das Intervall $[a, b]$ in n gleich grosse Teilintervalle $[x_{j-1}, x_j], j = 1, 2, \dots, n$.



In jedem Teilintervall approximiere man die Funktion f durch eine lineare Funktion. Das Integral über jedes Teilintervall wird approximiert durch die Trapezfläche.

Die Summe der Trapezflächen ist dann eine gute Approximation des bestimmten Integrals, vor allem wenn man n genügend gross wählt:

$$\int_a^b f(x) dx \approx \sum_{j=1}^n \frac{h}{2} (f(x_{j-1}) + f(x_j)) \text{ wobei } h = \frac{b-a}{n}.$$

Der bei der Trapezregel

$$\int_a^b f(x) dx \approx \frac{b-a}{2} (f(x_0) + 2f(x_1) + 2f(x_2) + \dots + 2f(x_{n-1}) + 2f(x_n)) = I_T(h)$$

gemachte Fehler ϵ_T ist für genügend anständige (zB stückweise stetige) Funktion f beschränkt durch

$$|\epsilon_T| = \left| \int_a^b f(x) dx - I_T(h) \right| \leq \frac{(b-a)^3}{12n^2} \max_{a \leq \epsilon \leq b} |f''(\epsilon)|$$

12.2 Trapezregel - kurz

Funktion: $f(x)$

Intervall: $[a, b]$

Anzahl Teilintervalle: n

Fläche: $\int_a^b f(x)dx = \frac{1}{2} \frac{b-a}{n} (y_0 + 2y_1 + 2y_2 + \dots + 2y_{n-1} + y_n)$

y_i also die versch. y in Formel oben: $y_i = f(x_i) = f(a + i \frac{b-a}{n}); 0 \leq i \leq n$

12.2.1 Beispiel

$$f(x) = \frac{3}{x}$$

$$[a, b] = [1, 4]$$

$$n = 3$$

$$\int_a^b f(x)dx = \frac{1}{2} \frac{b-a}{n} (y_0 + 2y_1 + 2y_2 + \dots + 2y_{n-1} + y_n) = \frac{1}{2} \frac{4-1}{3} (y_0 + 2y_1 + 2y_2 + y_3)$$

Die versch. y herausfinden mit: $y_i = f(x_i) = f(a + i \frac{b-a}{n})$

$$y_0 = f(x_0) = f(1 + 0 \frac{4-1}{3}) = f(1) = 3$$

$$y_1 = f(x_1) = f(1 + 1 \frac{4-1}{3}) = f(2) = 1.5$$

$$y_2 = f(x_2) = f(1 + 2 \frac{4-1}{3}) = f(3) = 1$$

$$y_3 = f(x_3) = f(1 + 3 \frac{4-1}{3}) = f(4) = 0.75$$

Einsetzen:

$$\frac{1}{2} \frac{4-1}{3} (3 + 2(1.5) + 2(1) + 0.75) = 4.375$$

12.3 Simpsonregel - kurz

Funktion: $f(x)$

Intervall: $[a, b]$

Anzahl Teilintervalle: n

$$\text{Fläche: } \int_a^b f(x)dx \approx \frac{b-a}{6n} (y_0 + 4y_1 + 2y_2 + 4y_3 + \dots + 2y_{2n-2} + 4y_{2n-1} + y_{2n})$$

y_i also die versch. y in Formel oben: $y_i = f(x_i) = f(a + i \frac{b-a}{2n}); 0 \leq i \leq 2n$

12.3.1 Beispiel

Gleiches Vorgehen wie bei der Trapezregel!

12.4 Definition Bogenlänge

Ist $y = f(x)$ eine glatte Kurve (f' ist stetig) im Intervall $[a, b]$, dann ist die Länge dieser Kurve über $[a, b]$ gegeben durch:

$$L = \int_a^b \sqrt{1 + [f'(x)]^2} dx = \int_a^b \sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2} dx$$

12.4.1 Beispiel

Berechne die Bogenlänge L der Kurve $y = x^{\frac{3}{2}}$ von $(1, 1)$ nach $(2, 2\sqrt{2})$.

$$L = \int_1^2 \sqrt{1 + (f'(x))^2} dx = \int_1^2 \sqrt{1 + \left(\frac{3}{2}\right)^2 x^{\frac{1}{2}}^2} dx = \int_1^2 \sqrt{1 + \frac{9}{4}x} dx$$

$$t = 1 + \frac{9}{4}x$$

$$dt = \frac{9}{4}dx$$

$$dx = \frac{4}{9}dt$$

$$= \int_{\frac{13}{4}}^{\frac{22}{4}} \sqrt{t} \frac{4}{9} dt = \int_{\frac{13}{4}}^{\frac{22}{4}} t^{\frac{1}{2}} \frac{4}{9} dt$$

$$\int t^{\frac{1}{2}} dt = \frac{t^{\frac{3}{2}}}{\frac{3}{2}}$$

$$= \frac{4}{9} \left[\frac{2}{3} t^{\frac{3}{2}} \right]_{\frac{13}{4}}^{\frac{22}{4}} = \frac{8}{27} \left(\left(\frac{22}{4} \right)^{\frac{3}{2}} - \left(\frac{13}{4} \right)^{\frac{3}{2}} \right) = \frac{8}{27(8)} (22 \times \sqrt{22} - 13 \times \sqrt{13})$$

12.5 Kurven in Polarform

Das Bogenelement ist

$$(ds)^2 = (rd\phi)^2 + (dr)^2 = \sqrt{(r(\phi))^2 + (r'(\phi))^2} d\phi$$

Integration von α bis β liefert die Bogenlänge.

Die Bogenlänge einer in Polarkoordinaten gegebenen glatten Kurven (dh r' stetig)

$r = r(\phi)$ mit $\alpha \leq \phi \leq \beta$ ist gegeben durch:

$$L = \int_{\alpha}^{\beta} \sqrt{(r(\phi))^2 + (r'(\phi))^2} d\phi$$

12.5.1 Beispiel

Man hat $r(\phi) = R$ und damit, weil r gar nicht von ϕ abhängt $r'(\phi) = 0$. Also findet man für den Umfang des Kreises mit Radius R :

$$U = \int_0^{2\pi} \sqrt{(r(\phi))^2 + (r'(\phi))^2} d\phi = \int_0^{2\pi} \sqrt{R^2 + 0^2} d\phi = \int_0^{2\pi} R d\phi = 2\pi R$$

12.6 Kurven in Parameterform

Das infinitesimale Bogenelement der Kuve in Parameterform

$$\gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^2, t \mapsto \vec{x}(t) = \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix}$$

ist gegeben durch

$$ds = |\dot{\vec{x}}(t)| dt = \sqrt{(\dot{x}(t))^2 + (\dot{y}(t))^2} dt$$

Integration von $t = a$ bis $t = b$ liefert die Bogenlänge der in Parameterform gegebene Kurve

$$L = \int_a^b ds = \int_a^b |\dot{\vec{x}}(t)| dt = \int_a^b \sqrt{(\dot{x}(t))^2 + (\dot{y}(t))^2} dt$$

12.7 Beispiel

$$\gamma = \begin{pmatrix} R \cos(t) \\ R \sin(t) \end{pmatrix} = R \begin{pmatrix} \cos(t) \\ \sin(t) \end{pmatrix}$$

$$\dot{\gamma}(t) = R \begin{pmatrix} -\sin(t) \\ \cos(t) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix}$$

$$(\dot{x}(t))^2 = (-R \sin(t))^2 = R^2 \sin^2 t$$

$$(\dot{y}(t))^2 = (R \cos(t))^2 = R^2 \cos^2 t$$

$$(\dot{x}(t))^2 + (\dot{y}(t))^2 = R^2 \sin^2 t + R^2 \cos^2 t = R^2 (\sin^2 t + \cos^2 t) = R^2$$

$$L = \int_a^b \sqrt{(\dot{x}(t))^2 + (\dot{y}(t))^2} dt = \int_0^{2\pi} \sqrt{R^2} dt = \int_0^{2\pi} R dt = \dots = 2\pi R$$

Chapter 13

SW12 Potenz- und Taylor-Reihen

13.1 Potenzreihe - Definition

Eine Potenzreihe in Potenzen von $(x - x_0)$ ist eine Reihe der Form

$$\sum_{k=0}^{\infty} a_k (x - x_0)^k = a_0 + a_1 (x - x_0) + a_2 (x - x_0)^2 + a_3 (x - x_0)^3 + \dots$$

Hier sind die a_k ($k = 0, 1, \dots$) die Koeffizienten, x_0 der Entwicklungspunkt und x die Variable der Potenzreihe.

13.1.1 Theorem - Konvergenzradius

Für jede Potenzreihe

$$\sum_{k=0}^{\infty} a_k (x - x_0)^k = a_0 + a_1 (x - x_0) + a_2 (x - x_0)^2 + a_3 (x - x_0)^3 + \dots$$

gibt es eine reelle $R \geq 0$, genannt Konvergenzradius, sodass die Potenzreihe konvergiert, falls $|x - x_0| < R$, und divergiert, falls $|x - x_0| > R$ (für $|x - x_0| = R$ kann die Reihe entweder konvergieren oder divergieren). Dabei gilt:

$$R = \lim_{k \rightarrow \infty} \left| \frac{a_k}{a_{k+1}} \right|, \text{ bzw. } R = \left(\lim_{k \rightarrow \infty} \sqrt[k]{|a_k|} \right)^{-1}$$

falls einer oder beide dieser Grenzwerte existiert.

Beispiel

Berechne den Konvergenzradius der Potenzreihe

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{3^k} = 1 + \frac{x}{3} + \frac{x^2}{3^2} + \dots$$

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{3^k} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{3^k} (x - x_0)^k$$

wobei: $a_k = \frac{1}{3^k}, x_0 = 0$

$$R = \lim_{k \rightarrow \infty} \left| \frac{a_k}{a_{k+1}} \right| = \lim_{k \rightarrow \infty} \left| \frac{\frac{1}{3^k}}{\frac{1}{3^{k+1}}} \right| = \lim_{k \rightarrow \infty} \left| \frac{1}{3^k} \frac{3^{k+1}}{1} \right| = \lim_{k \rightarrow \infty} |3| = 3$$

$$R = \left(\lim_{k \rightarrow \infty} \sqrt[k]{|a_k|} \right)^{-1} = \frac{1}{R} = \lim_{k \rightarrow \infty} \sqrt[k]{|a_k|} = \lim_{k \rightarrow \infty} \sqrt[k]{\left| \frac{1}{3^k} \right|} = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{1}{3}$$

$$= \frac{1}{R} = \frac{1}{3} \longrightarrow R = 3$$

Konvergenzradius = 3

13.2 Definition Taylor-Polynom

Wir nehmen an, dass die Funktion $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto f(x)$ genügend oft stetig differenzierbar ist. Dann ist das Taylor-Polynom n-ten Grades von f an der Stelle x_0 definiert durch:

$$T_n(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k$$

$$= f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \frac{f''(x_0)}{2!}(x - x_0)^2 + \frac{f'''(x_0)}{3!}(x - x_0)^3 + \dots$$

Ist $x = 0$, nennt man $T_n(x)$ auch Maclaurin-Polynom n-ten Grades von f .

$$a_k = \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}$$

13.2.1 Beispiel 1

Bestimmen sie die Taylor-Polynome 2-ten und 3-ten Grades von $f(x) = e^x$ an der Stelle $x_0 = 0$ (auch Maclaurin-Polynome genannt).

k	$f^k(x)$	$f^k(x_0)$
0	e^x	1
1	e^x	1
2	e^x	1
3	e^x	1

$$T_n(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k$$

$$= \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!} (x - 0)^k = \sum_{k=0}^n \frac{x^k}{k!} = \frac{1}{0!} + \frac{x^1}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \dots + \frac{x^n}{n!}$$

13.2.2 Beispiel 2

Bestimmen sie die Taylor-Polynome 2-ten und 3-ten Grades von $f(x) = x^3 + 2x^2 - x + 3; x_0 = 0$

k	$f^k(x)$	$f^k(x_0)$
0	$x^3 + 2x^2 - x + 3$	3
1	$3x^2 + 4x - 1$	-1
2	$6x + 4$	4
3	6	6
4	0	0

$$T_0(x) = f^{(0)}(x_0) = 3$$

$$T_1(x) = f^{(1)}(x_0)(x - x_0) + f^{(0)}(x_0) = 3 - (x - 0) = 3 - x$$

$$T_2(x) = T_1(x) + \frac{f^{(2)}(x_0)}{2!} = 3 - x + \frac{4}{2}(x - x_0)^2 = 3 - x + 2x^2$$

$$T_3(x) = 3 - x + 2x^2 + x^3 = f(x)$$

13.3 Definition - Taylor-Reihe

Wir nehmen an, die Funktion $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto f(x)$ sei beliebig oft differenzierbar. Dann ist die Taylor-Reihe von f an der Stelle x_0 definiert durch:

$$T(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \frac{f''(x_0)}{2!} (x - x_0)^2 + \frac{f'''(x_0)}{3!} (x - x_0)^3 + \dots$$

Ist $x_0 = 0$, dann nennt man $T(x)$ auch Maclaurin-Reihe von f .

Die ersten zwei Terme ergeben die lineare Approximation der Funktion f an der Stelle x_0 bzw 0.

13.4 Definition - Restglied nach Lagrange

Die Frage ist, ob die Taylor-Reihe einer Funktion wirklich gleich der Funktion ist. Kann man also schreiben $T(x) = f(x)$?

Die Antwort liefert das Restglied nach Lagrange: Es ist gleich dem Fehler, den wir machen, wenn wir die Funktion f durch das n-te Taylor-Polynom ersetzen.

Falls die Funktion $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto f(x)$ mindestens $(n + 1)$ -mal stetig differenzierbar ist, dann gilt:

$$f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k + R_n(x)$$

wobei das Restglied nach Lagrange gegeben ist durch:

$$R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!} (x - x_0)^{n+1} \text{ mit } c \text{ zwischen } x \text{ und } x_0$$

13.4.1 Theorem - Konvergenz von Taylor-Reihen

Die Taylor-Reihe von f an der Stelle x_0 konvergiert in ihrem Konvergenzbereich genau dann gegen $f(x)$ wenn das n . Restglied nach Lagrange:

$$R_n(x) = f(x) - \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k \text{ für } n \rightarrow \infty \text{ gegen } 0 \text{ konvergiert.}$$

Wir schreiben dann:

$$f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k + \frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!} (x - x_0)^{n+1}$$

Eine beliebig oft differenzierbare Funktion von f lässt sich in einer Umgebung $(x_0 - R, x_0 + R)$ von x_0 in eine konvergente Taylor-Reihe entwickeln, falls gilt:

$$|f^{(n)}(x)| \leq KM^n \text{ für alle } n \in \mathbb{N} \text{ und alle } x \in (x_0 - R, x_0 + R).$$

Dabei dürfen die Konstanten K und M nicht von n und x abhängen.

13.5 Definition Binomial-Reihe

Binomial-Reihe:

$$(1+x)^\alpha = \sum_{k=0}^{\infty} \binom{\alpha}{k} x^k \text{ mit } \binom{\alpha}{k} = \frac{\alpha \cdot (\alpha-1) \cdots (\alpha-k+1)}{k \cdot (k-1) \cdots 3 \cdot 2 \cdot 1}$$

Ist definiert für $\alpha \in \mathbb{R}$ und $|x| < 1$

13.5.1 Beispiel

Wie lautet die Binomial-Reihe von $\sqrt{1+x}$? Schreiben sie die ersten 3 Glieder auf.

$$\sqrt{1+x} = (1+x)^{\frac{1}{2}} = \sum_{k=0}^{\infty} \binom{\frac{1}{2}}{k} x^k$$

$$\sqrt{1+x} \approx \binom{\frac{1}{2}}{0} x^0 + \binom{\frac{1}{2}}{1} x^1 + \binom{\frac{1}{2}}{2} x^2$$

$$\binom{\frac{1}{2}}{0} = \frac{1}{1} = 1$$

$$\binom{\frac{1}{2}}{1} = \frac{\frac{1}{2}}{1} = \frac{1}{2}$$

$$\binom{\frac{1}{2}}{2} = \frac{\frac{1}{2} \cdot (\frac{1}{2}-2+1)}{2 \cdot 1} = -\frac{1}{8}$$

$$\sqrt{1+x} = 1 + \frac{1}{2}x - \frac{1}{8}x^2$$

13.6 Rechnen mit Potenzreihen

- Potenzreihen lassen sich im Konvergenzbereich gliedweise addieren und subtrahieren.
- Potenzreihen lassen sich im Konvergenzbereich gliedweise differenzieren und integrieren.

13.6.1 Beispiel - addieren, subtrahieren

$$e^x = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{k!} = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^4}{4!} + \frac{x^5}{5!} + \dots$$

$$e^{-x} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{k!} = 1 - x + \frac{x^2}{2!} - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^5}{5!} + \dots$$

$$e^x + e^{-x} = 2 + 2 \cdot \frac{x^2}{2!} + 2 \cdot \frac{x^4}{4!} + \dots$$

$$e^x - e^{-x} = 2x + 2 \cdot \frac{x^3}{3!} + 2 \cdot \frac{x^5}{5!} + \dots$$

13.6.2 Beispiel - differenzieren, integrieren

Zeigen sie, dass man die Potenzreihe von $\sin x$ erhält, wenn man die Potenzreihe von $\cos x$ gliedweise integriert.

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \frac{x^9}{9!} \dots$$

$$(\sin x)' = 1 - \frac{3x^2}{3!} + \frac{5x^4}{5!} - \frac{7x^6}{7!} + \frac{9x^8}{9!} \dots$$

$$= 1 - \frac{3x^2}{3 \cdot 2!} + \frac{5x^4}{5 \cdot 4!} - \frac{7x^6}{7 \cdot 6!} + \frac{9x^8}{9 \cdot 8!} \dots = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \frac{x^8}{8!} \dots = \cos x$$

Chapter 14

SW13 Mehrdimensionale Differentialrechnung I

14.1 Multivariate Funktionen

$f(x, y) = x + y$, wobei $\mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ (\mathbb{R}^2 weil zwei Argumente, (x, y))

14.2 Konturlinie

Um Kontur- oder Niveaulinien für irgend ein Niveau c zu zeichnen, muss man die Gleichung $f(x, y) = c$ nach (x, y) auflösen.

14.2.1 Beispiel

$$f(x, y) = x^2 - y^2$$


Konturlinie: $f(x, y) = c = \text{const}$

$$x^2 - y^2 = c$$

$$y = \pm\sqrt{x^2 - c}$$

$$x = \pm\sqrt{y^2 + c}$$

14.3 Partielle Ableitung



Sei f eine reellwertige Funktion von zwei Variablen. Wir betrachten die Ebene $y = y_0$ für eine Konstante y_0 . Dann hängt die Funktion


$$g(x) = f(x, y_0)$$

nur noch von der einen Variablen x ab. Diese Funktion können wir mit den bereits bekannten Methoden nach x ableiten. Das Resultat ist nichts anderes, als die partielle Ableitung von f nach x .

$$g'(x) = f_x(x, y_0) = \frac{\partial f(x, y)}{\partial x} \Big|_{x, y=y_0}$$

an der Stelle $(x, y = y_0)$.

Hier bezeichnen f_x , oder $\frac{\partial f(x, y)}{\partial x}$, die partielle Ableitung von f nach der Variablen x .



Analog können wir $x = x_0$ fixieren und erhalten eine Funktion, die nur noch von y abhängt:

$$h(y) = f(x_0, y)$$

Die gewöhnliche Ableitung von h nach y ist dann nichts anderes, als die partielle Ableitung von f nach y

$$h'(y) = f_y(x_0, y) = \frac{\partial f(x, y)}{\partial y} \Big|_{x=x_0, y}$$

an der Stelle $(x = x_0, y)$.

Wieder bezeichnen f_y , oder $\frac{\partial f(x, y)}{\partial y}$, die partielle Ableitung von f nach der Variablen y .

14.3.1 Definition

Die partiellen Ableitungen von f nach x und y an der Stelle (x_0, y_0) sind nach dem oben Gesagten wie folgt definiert:

$$\frac{\partial f}{\partial x} \Big|_{(x_0, y_0)} = f_x(x_0, y_0) =$$

Änderungsrate von f bezüglich x in (x_0, y_0)

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h, y_0) - f(x_0, y_0)}{h}$$

$$\frac{\partial f}{\partial y} \Big|_{(x_0, y_0)} = f_y(x_0, y_0) =$$

Änderungsrate von f bezüglich y in (x_0, y_0)

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0, y_0 + h) - f(x_0, y_0)}{h}$$

14.3.2 Beispiel 1

Sei $f(x, y) = \frac{x^2}{y+1}$. Gesucht $f_x(3, 2)$

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{1}{y+1} \cdot 2x = \frac{2x}{y+1}$$

$$\frac{\partial f}{\partial x} \Big|_{(3,2)} = \frac{2 \cdot 3}{2+1} = 2$$

14.3.3 Beispiel 2

$$f(x, y) = (3xy + 2x)^5$$

$$\frac{\partial f}{\partial x} = 5(3xy + 2x)^4 \cdot (3y + 2) \quad (\text{nach } x \text{ abgeleitet})$$

$$\frac{\partial f}{\partial y} = 5(3xy + 2x)^4 \cdot (3x) \quad (\text{nach } y \text{ abgeleitet})$$

14.3.4 Beispiel 3

$$f(x, y) = e^{x+3y} \sin(x, y)$$

$$\frac{\partial f}{\partial x} = e^{x+3y} \cdot 1 \cdot \sin(x, y) + e^{x+3y} \cdot \cos(x, y) \cdot y = e^{x+3y} (\sin(x, y) + y \cos(x, y))$$

$$\frac{\partial f}{\partial y} = e^{x+3y} \cdot 3 \cdot \sin(x, y) + e^{x+3y} \cdot \cos(x, y) \cdot x = e^{x+3y} (3 \sin(x, y) + x \cos(x, y))$$

14.4 Definition - Der Gradient

Sei f eine reellwertige Funktion (ein Skalar) welche von zwei Variablen x und y abhängt.

Dann ist der Gradient von f derjenige Vektor, dessen Komponenten die partiellen Ableitungen von f nach den einzelnen Variablen sind, dh:

$$\nabla f(\chi) = \begin{bmatrix} f_x(\chi) \\ f_y(\chi) \end{bmatrix} \quad \text{oder ein bisschen ausführlicher} \quad \nabla f(x, y) = \begin{bmatrix} f_x(x, y) \\ f_y(x, y) \end{bmatrix}$$

14.4.1 Beispiel 1

Gesucht ist der Gradient von $f(x, y) = x + e^y$. Wie lautet der Gradient an der Stelle $(1, 1)$.

$$f_x(x, y) = \frac{\partial f}{\partial x} = 1$$

$$f_y(x, y) = \frac{\partial f}{\partial y} = e^y$$

$$\nabla f(x, y) = \begin{bmatrix} f_x(x, y) \\ f_y(x, y) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ e^y \end{bmatrix}$$

$$\nabla f(1,1) = \nabla f|_{(1,1)} = \begin{bmatrix} 1 \\ e \end{bmatrix}$$

14.4.2 Beispiel 2

Gesucht ist der Gradient von $f(x,y) = 3x^2y$ für einen beliebigen Punkt. Wie lautet der Gradient an der Stelle $(1,1)$.

$$f_x(x,y) = \frac{\partial f}{\partial x} = 6xy$$

$$f_y(x,y) = \frac{\partial f}{\partial y} = 3x^2$$

$$\nabla(x,y) = \begin{bmatrix} 6xy \\ 3x^2 \end{bmatrix}$$

$$\nabla(1,1) = \begin{bmatrix} 6 \\ 3 \end{bmatrix}$$


$$\nabla(0,0) = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

14.4.3 Eigenschaften des Gradienten

Ist f eine anständige Funktion, dh insbesondere im Punkt (x_0, y_0) differenzierbar mit dem Gradienten $\nabla f(x_0, y_0) \neq 0$, dann ist:

- die Richtung des Gradienten $\nabla f(x_0, y_0) \neq 0$
 - senkrecht (orthogonal) zu den Konturlinien von f durch (x_0, y_0) , dh den Kurven mit $f(x_0, y_0) = f(x, y)$
 - in Richtung der maximalen Zunahme von f
- der Betrag des Gradienten $||\nabla f(x_0, y_0)||$ ist
 - ist gleich der maximalen Änderungsrate von f in diesem Punkt
 - ist gross, wenn die Konturlinien nahe beieinander sind und klein, wenn sie weit auseinander liegen.

14.5 Richtungsableitung



Die Änderungsrate wird Richtungsableitung von f im Punkt x_0 in Richtung von e genannt und bezeichnet mit:

$$D_e f(x_0) = \lim_{t \rightarrow 0+} \frac{f(x_0 + te) - f(x_0)}{t}$$

14.5.1 Beispiel mit Richtungsvektor

Berechne die Richtungsableitung von $f(x, y) = x + y$ (Ebene) im Punkt $x_0 = [0, 0]^T$ in Richtung des Einheitsvektors $e = [\cos \psi, \sin \psi]^T$. Ist e ein Einheitsvektor?

$$f(x, y) = x + y$$

$$P(0/0)$$

$$e = \begin{pmatrix} \cos \psi \\ \sin \psi \end{pmatrix}$$

$\|e\|$ bedeutet Länge von e

$$\|e\|^2 = \cos^2 \psi + \sin^2 \psi = 1$$

$\|e\| = 1$ Vektor e ist Einheitsvektor, weil Länge = 1

Ableitung von f im Punkt P mit Richtung e :

$$\mathbf{f}(\mathbf{p} + t\mathbf{e}) = f\left(\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} \cos \psi \\ \sin \psi \end{pmatrix}\right) = f\left(\begin{pmatrix} t \cos \psi \\ t \sin \psi \end{pmatrix}\right) = f(t \cos \psi, t \sin \psi) = t \cos \psi + t \sin \psi = t(\cos \psi + \sin \psi)$$

$$\mathbf{f}(\mathbf{p}) = f\left(\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}\right) = f(0, 0) = 0 + 0 = 0$$

$$D_e f(0, 0) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(\mathbf{p} + t\mathbf{e}) - f(\mathbf{p})}{t} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{t(\cos \psi + \sin \psi)}{t} = \cos \psi + \sin \psi$$

14.5.2 Beispiel ohne Richtungsvektor

Für einfachere Berechnung siehe 14.6 Richtungsableitung und Gradient Bestimme die Richtungsableitung von $f(x, y, z) = 2x^2 + 3y^3 + z^2$ in $x_0 = [2, 1, 3]^T$ in Richtung von $a = [1, 0, -2]^T$. Beachte, a ist kein Richtungsvektor.

$$f(x, y, z) = 2x^2 + 3y^3 + z^2$$

$$P(2/1/3)$$

$$|a| = \sqrt{1^2 + 0^2 + (-2)^2} = \sqrt{1+4} = \sqrt{5}$$

$$a_0 = e = \frac{a}{|a|} = \frac{1}{\sqrt{5}} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{5}} \\ 0 \\ -\frac{2}{\sqrt{5}} \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{f}(\mathbf{p} + t\mathbf{e}) = f\left(\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{5}} \\ 0 \\ -\frac{2}{\sqrt{5}} \end{pmatrix}\right) = f\left(\begin{pmatrix} 2 + \frac{t}{\sqrt{5}} \\ 1 \\ 3 - \frac{2t}{\sqrt{5}} \end{pmatrix}\right) = f\left(2 + \frac{t}{\sqrt{5}}, 1, 3 - \frac{2t}{\sqrt{5}}\right)$$

$$x(t) = 2 + \frac{t}{\sqrt{5}}$$

$$y(t) = 1$$

$$z(t) = 3 - \frac{2t}{\sqrt{5}}$$

$$f(t) = 2(x(t))^2 + 3(y(t))^3 + (z(t))^2 = 2\left(2 + \frac{t}{\sqrt{5}}\right)^2 + 3(1)^3 + \left(3 - \frac{2t}{\sqrt{5}}\right)^2 = \mathbf{f}(\mathbf{p} + t\mathbf{e})$$

$$D_e f(0, 0) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(p+te) - f(p)}{t} = \dots = -\frac{4}{\sqrt{5}}$$

Falls wir uns vom Punkt p in Richtung des Vektors a um eine Einheit bewegen, nimmt die Funktion um $-\frac{4}{\sqrt{5}}$ ab.

14.6 Richtungsableitung und Gradient

Für eine anständige (sprich differenzierbare) Funktion kann die Richtungsableitung von f im Punkt p in Richtung des Einheitsvektors e mit Hilfe des Gradienten bestimmt werden:

$$D_e f(p) = \nabla f(p) \cdot e = |\nabla f(p)| \cos \phi$$

14.6.1 Beispiel

$$f(x, y, z) = 2x^2 + 3y^3 + z^2$$

$$P(2/1/3)$$

$$|a| = \sqrt{1^2 + 0^2 + (-2)^2} = \sqrt{1+4} = \sqrt{5}$$

$$e = \frac{a}{|a|} = \frac{1}{\sqrt{5}} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -2 \end{pmatrix}$$

$$\nabla f(x, y, z) = \begin{pmatrix} 4x \\ 9y^2 \\ 2z \end{pmatrix}$$

$$\nabla f(2, 1, 3) = \begin{pmatrix} 8 \\ 9 \\ 3 \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned}
 D_e f(2, 1, 3) &= \nabla f(2, 1, 3) \cdot e = \begin{pmatrix} 8 \\ 9 \\ 3 \end{pmatrix} \cdot \frac{1}{\sqrt{5}} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -2 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{5}} \cdot ((8 \cdot 1) + (9 \cdot 0) + (6 \cdot -2)) \\
 &= \frac{1}{\sqrt{5}} \cdot (8 + 0 - 12) = \frac{-4}{\sqrt{5}}
 \end{aligned}$$