

北京邮电大学 2015 —— 2016 学年第一学期

《大学物理 B》(下) 期末考试答案和评分标准

一、选择题 (每题 3 分, 共 30 分)

A C D B D B D D C C

二、填空题 (每空 2 分, 共 24 分)

1. $y_{\text{反}} = A \cos 2\pi(\nu t - \frac{x}{\lambda})$

$$y_{\text{入}} + y_{\text{反}} = A \cos 2\pi(\nu t + \frac{x}{\lambda}) + A \cos 2\pi(\nu t - \frac{x}{\lambda}) = 2A \cos \frac{2\pi}{\lambda} x \cos 2\pi \nu t$$

2. 圆偏振光, 线偏振光

3. $\frac{\Delta x}{v}$, (同时) $\frac{\Delta x}{v} \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}$ 或 $\Delta x \sqrt{\frac{1}{v^2} - \frac{1}{c^2}}$ 或 $\frac{\Delta x \sqrt{c^2 - v^2}}{cv}$ 或 $(\frac{\Delta x}{v} - \frac{v}{c^2} \Delta x) / \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}$

4. 10 条, 3 条

5. $2m_e c^2$ ($E^2 = E_0^2 + p^2 c^2$ $p^2 = 3m_e^2 c^2$ $p = \sqrt{3}m_e c$) $\lambda = \frac{h}{p} = \frac{h}{\sqrt{3}m_e c}$

6. 概率密度(某一时刻 t 在某点 r 附近的单位体积内发现粒子的概率),

$$\int_V |\Psi(\vec{r}, t)|^2 dV = 1 \text{ 或 } \int_V \Psi \Psi^* dV = 1 \text{ 或 } \int_{-\infty}^{\infty} \Psi \Psi^* dx dy dz = 1$$

三、计算题 (共 36 分)

1. (本题 12 分)

(1) 碰撞后, 盘受力平衡时

$$kl_0 = (M + m)g$$

以平衡位置为原点, 竖直向下为正方向建立坐标系, x 处受力

$$F = (M + m)g - k(l_0 + x) = -kx = (M + m) \frac{d^2 x}{dt^2}$$

$$\frac{dx^2}{dt^2} + \frac{k}{(M+m)} x = 0$$

(4 分)

合外力为线性合外力, 故是简谐振动

其

$$\omega = \sqrt{\frac{k}{M+m}} \quad T = \frac{2\pi}{\omega} = 2\pi \sqrt{\frac{M+m}{k}}$$

(1 分)

(2) 碰撞瞬间为计时起点, 即 $t=0$, 碰后盘运动状态为 (x_0, v_0)

$$x_0 = \frac{Mg}{k} - \frac{(M+m)g}{k} = -\frac{mg}{k} \quad (1 \text{ 分})$$

碰撞前，物理 m 的速度为 v

$$\frac{1}{2}mv^2 = mgh$$

$$v = \sqrt{2gh} \quad (1 \text{ 分})$$

根据动量定理

$$mv = (M+m)v_0$$

$$v_0 = \frac{m}{M+m} \sqrt{2gh} \quad (1 \text{ 分})$$

则系统振动方程为 $x = A \cos(\omega t + \varphi)$ ，其中

$$\omega = \sqrt{\frac{k}{M+m}}$$

$$A = \sqrt{x_0^2 + \frac{v_0^2}{\omega^2}} = \sqrt{\left(\frac{mg}{k}\right)^2 + \frac{2m^2gh}{(M+m)k}} \quad (2 \text{ 分})$$

$$\varphi = \arctan\left(-\frac{v_0}{x_0\omega}\right) = \arctan\sqrt{\frac{2hk}{g(M+m)}} \quad (1 \text{ 分})$$

由于 $x_0 < 0$, $v_0 > 0$

所以 φ 在第三象限 (1 分)

2. (本题 12 分)

(1) 不用考虑半波损失，暗条纹处膜厚 d'

$$2n_1 d' = (2k-1) \frac{\lambda}{2} \quad (k = 1, 2, 3, \dots) \quad (3 \text{ 分})$$

因为 $d' \ll d$

$$k \leq \frac{2n_1 d}{\lambda} + \frac{1}{2} = 4.9$$

$k = 1, 2, 3, 4$ 共四条暗条纹 (1 分)

(2) 距离中心最近级数为第 4 级

$$2n_1 d' = \frac{7}{2}\lambda \quad (2 \text{ 分})$$

$$d' = \frac{7\lambda}{4n_1} = 8.75 \times 10^{-7} \text{m}$$

根据勾股定理

$$[R - (d - d')]^2 + r_k^2 = R^2 \quad (2 \text{ 分})$$

因为 $d - d' \ll R$

$$R \approx \frac{r_k^2}{2(d - d')} = 20 \text{m} \quad (1 \text{ 分})$$

(3) 条纹向内收缩, 或条纹减少, 或条纹间距变大 (3 分)

3、(本题 12 分)

(1) 设两相邻主极大分别为 k 级与 $k+1$ 级

$$d \sin \theta_1 = k\lambda$$

$$d \sin \theta_2 = (k+1)\lambda \quad (2 \text{ 分})$$

$$\text{所以 } d = \frac{\lambda}{\sin \theta_2 - \sin \theta_1} = 6 \times 10^{-6} \text{m} \quad k=2$$

$$N = \frac{L}{d} = 10^4 \quad (1 \text{ 分})$$

$$\text{第四级缺级} \quad \frac{d}{a} = \frac{k}{n} \quad \text{其中, } n = 1, 2, 3 \quad (1 \text{ 分})$$

当 $n=2$ 时, 第 2 级缺级, 与题目不符
故 $n=1, 3$

$$a = \frac{d}{4} \text{ 或 } \frac{3d}{4} \quad \text{即 } 1.5 \times 10^{-6} \text{m 或 } 4.5 \times 10^{-6} \text{m} \quad (\text{每个答案给 1 分, 共 2 分})$$

(2) 主极大位置

$$d \sin \theta = k\lambda$$

$$|k| = \left| \frac{d \sin \theta}{\lambda} \right| < \frac{d}{\lambda} = 10 \quad (2 \text{ 分})$$

其中 $\pm 4, \pm 8$ 级缺级

屏上可能出现的干涉主极大级次为

$$k = 0, \pm 1, \pm 2, \pm 3, \pm 5, \pm 6, \pm 7, \pm 9 \quad (1 \text{ 分})$$

(3) 减少缝宽 a (3 分)

(如果答案为增加缝数 和减小光栅常数 则为 2 分)

四、证明题 (10 分)

证：设 θ 为出射光子的散射角， φ 为反冲电子的散射角

由动量守恒 $\frac{h\nu_0}{c} = \frac{h\nu}{c} \cos \theta + mv \cos \varphi$ (电子动量写成 $m_e c$ 不给分)

$$\frac{h\nu}{c} \sin \theta = mv \sin \varphi$$

可得 $m^2 v^2 c^2 = h^2 (\nu_0^2 - \nu^2 - 2\nu_0 \nu \cos \theta)$ (3 分)

由能量守恒 $h\nu_0 + m_e c^2 = h\nu + mc^2$ (动能写成 $\frac{1}{2} m_e v^2$ 不给分)

则 $mc^2 = h(\nu_0 - \nu) + m_e c^2$ (写成 $h\nu_0 - h\nu = m_e c^2 + E_e$ 不给分) (3 分)

且 $m = \frac{m_e}{\sqrt{1 - v^2 / c^2}}$ (1 分)

可得 $m_e c^2 (\nu_0 - \nu) = h\nu_0 \nu (1 - \cos \theta)$

两边同时除以 $m_e c \nu_0 \nu$ ，得 $c \left(\frac{\nu_0 - \nu}{\nu_0 \nu} \right) = c \left(\frac{1}{\nu} - \frac{1}{\nu_0} \right) = \frac{h}{m_e c} (1 - \cos \theta)$

由于 $\lambda = \frac{c}{\nu}$ ， $\lambda_0 = \frac{c}{\nu_0}$ ，故 $\Delta \lambda = \lambda - \lambda_0 = \lambda_c (1 - \cos \theta) = 2\lambda_c \sin^2 \frac{\theta}{2}$ ，其中 $\lambda_c = \frac{h}{m_e c}$

(只有上式结果，无证明过程，则只给 5 分，也就是说，前面总共 7 分里面扣 2 分)

又 $E_0 = h\nu_0$

$$E_e = mc^2 - m_0 c^2 = h\nu_0 - h\nu$$

所以 $\frac{E_e}{E_0} = \frac{mc^2 - m_0 c^2}{h\nu_0} = \frac{h\nu_0 - h\nu}{h\nu_0}$

$$= \frac{\nu_0 - \nu}{\nu_0} = \frac{c / \lambda_0 - c / \lambda}{c / \lambda_0} = \frac{\lambda - \lambda_0}{\lambda} = \frac{2\lambda_c \sin^2(\theta/2)}{\lambda_0 + 2\lambda_c \sin^2(\theta/2)} \quad (3 \text{ 分})$$