

Part III

Régression linéaire.

On rappelle la régression linéaire entre deux variables d'un point de vue descriptif.

7 Régression linéaire – Statistiques descriptives


Dans certaines situations, on est amené à étudier deux caractères distincts d'une même population. On peut par exemple considérer la taille (x) et le poids (y) d'un ensemble d'individus. L'objectif principal de l'étude est de déterminer l'éventuel lien entre les deux variables x et y .


7.1 Nuage de points

On relève le couple (taille, poids) de 8 individus. On résume les données dans le tableau suivant.

	i	1	2	3	4	5	6	7	8
taille	x_i	150	155	155	150	165	175	170	180
poids	y_i	50	55	60	62	65	70	70	90

Definition 7.1 Soit une population de N individus. Le graphe des N points (x_i, y_i) est appelé nuage de points de la série.





$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n}$$


effectif total \rightarrow

$$\bar{y} = \frac{\sum_{i=1}^n y_i}{n}$$

centre de gravité du nuage

Definition 7.2 Le point ayant pour coordonnées les moyennes (\bar{x}, \bar{y}) est appelé le point moyen.


Il s'agit du centre de gravité du nuage. On rencontrera parfois cette dénomination. Dans notre exemple, le point moyen est $(65.2, 162.5)$.





7.2 Forme du nuage de points

D'une manière générale, trois cas peuvent se présenter en ce qui concerne le profil du nuage :


- (i) forme allongée et rectiligne : les points sont plus ou moins alignés



(ii) forme allongée mais non rectiligne : les points ne sont pas alignés mais ont un profil ordonné



(iii) forme quelconque




7.3 Ajustement affine (droite de régression linéaire)

On s'intéresse plus particulièrement au premier cas 7.2.1. Procéder à un ajustement affine revient à chercher une droite D d'équation

$$y = ax + b$$

7.3.1 La méthode des moindres carrés

L'idée de cette méthode est de chercher la droite qui minimise la somme des carrés des écarts verticaux entre la droite et les points du nuage, les *résidus*.



résidu $y_5 - \hat{y}_5$ valeur sur la droite

On suppose qu'il n'y a pas d'erreur
Sur x — On minimise la somme
des carrés des
écarts entre y observé
et son estimation sur
la droite (erreur sur
 $y = \text{résidu}$)

En pratique, on détermine les coefficients de la droite $D : y = ax + b$ à l'aide de R ou d'un tableur.

La droite ainsi obtenue est unique. Cette droite s'appelle la droite de régression linéaire de y en x par la méthode des moindres carrés et on aura

$$y_i = ax_i + b + e_i,$$

\hat{y}_i estimé par la droite. \uparrow résidu = e_i

On suppose, pour l'instant, que l'étude se fait sur une population entière (statistiques descriptives) et non sur un échantillon (statistiques inférentielles).

$$\text{Var}(x) = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (x_i - \bar{x})^2$$

$$\sigma_x = \sqrt{\text{Var}(x)}$$

$$\sigma_{x,y} = \text{Cov}(x, y) = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y}).$$

Cette quantité est nommée covariance de x et y . Si la quantité σ_x est une distance entre les valeurs de x et \bar{x} , on peut considérer la covariance comme un produit scalaire entre les variables x et y . Ainsi, si la covariance est proche de 0, on peut penser que les variables ont une dynamique qui n'ont rien de commun (penser à l'orthogonalité), c'est à dire le nuage 7.2.3.

On a

$$a = \text{cov}(x, y) / \sigma_x^2,$$

$$b = \bar{y} - a\bar{x}.$$

$$\Leftrightarrow \bar{y} = a\bar{x} + b \Leftrightarrow \text{la droite passe par le centre de gravité.}$$

payper

(x, y) observé par $(x_i, y_i)_{1 \leq i \leq n}$.

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$$

$$\bar{y} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n y_i$$

$$\text{Var}(x) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2$$

$$= \frac{m(x^2) - \bar{x}^2}{n}$$

$$\text{Var}(y) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2$$

$$= \frac{m(y^2) - \bar{y}^2}{n}$$

$$\text{Cov}(x, y) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})$$

$$= \frac{m(xy) - \bar{x}\bar{y}}{n}$$

La droite de régression de y en x par la méthode des moindres carrés a pour équation :

$$y = ax + b$$

avec

$$a = \frac{\text{Cov}(x, y)}{\text{Var}(x)}$$

$$b = \bar{y} - a\bar{x}$$

Modèle: $y_i = ax_i + b + e_i$

↖ erreur

Preuve. On suppose qu'il n'y a pas d'erreur systématique, sinon on pourrait souhaiter traduire ou modifier la pente de la droite. On suppose donc que l'erreur moyenne sur nos observations est nulle


$$\bar{e} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n e_i = 0$$

$$\begin{aligned} \bar{y} &= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (ax_i + b + e_i) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n ax_i + \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n b + \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n e_i \\ &= a \bar{x} + b + 0 \end{aligned}$$

(Red annotations: $\sum_{i=1}^n b = nb$, $\sum_{i=1}^n e_i = \bar{e} = 0$)

D'où $\bar{y} = a\bar{x} + b \Leftrightarrow b = \bar{y} - a\bar{x}$

Résidu = erreur



$$\hat{y}_i = a x_i + b = a x_i + \bar{y} - a \bar{x} = a(x_i - \bar{x}) + \bar{y}$$

\uparrow
 $\bar{y} - a \bar{x}$

On pose la somme des carrés des résidus

$$M(a) = \sum_{i=1}^N (y_i - (\overbrace{a(x_i - \bar{x}) + \bar{y}}^{\hat{y}_i}))^2 = \sum_{i=1}^N (y_i - \bar{y} - \underline{a}(x_i - \bar{x}))^2.$$

Nous cherchons donc la valeur de a qui minimise cette quantité. Dérivons la en a

$$M'(a) = \sum_{i=1}^N (v(a))' = \sum_{i=1}^N 2 v'(a) v(a) \quad \text{avec} \quad v(a) = \overbrace{y_i - \bar{y}}^{\beta} - a \overbrace{(x_i - \bar{x})}^{\alpha}$$

$$v'(a) = - \underbrace{(x_i - \bar{x})}_{\alpha}$$

$$= 2 \sum_{i=1}^N \underbrace{-(x_i - \bar{x})}_{\alpha} \underbrace{((y_i - \bar{y}) - a(x_i - \bar{x}))}_{\beta}$$

$$= 2 \left[- \sum_{i=1}^N (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y}) + a \sum_{i=1}^N (x_i - \bar{x})^2 \right]$$

Pour minimiser, on annule $H'(a)$ -

$$H'(a) = 0 \Leftrightarrow - \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y}) + a \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 = 0$$

$$\begin{aligned} \Leftrightarrow \quad a &= \frac{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2} \\ &= \frac{\text{Cov}(x, y)}{\text{Var}(x)} \end{aligned}$$

Vérifions que c'est un minimum:

$$H''(a) = 2 \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 > 0$$

la fonction est convexe, c'est bien un minimum.

Fin de la preuve

7.3.2 Coefficient de corrélation linéaire

Notons que la méthode des moindres carrés peut être utilisée pour n'importe quelle série double. On peut tout à fait obtenir une droite de régression dans le cas 7.2.3. Pour s'assurer de façon objective (et non purement visuelle) que l'ajustement est valide, on considère un autre paramètre de la série, le coefficient de corrélation linéaire r :

$$r = \frac{cov(x, y)}{\sigma_x \sigma_y}$$

Proposition 7.3 On a les propriétés suivantes :

(i) on a toujours $-1 \leq r \leq 1$;

(ii) le coefficient directeur de la droite de régression et le coefficient de corrélation sont de même signe (celui de la covariance) .


(iii) le degré de corrélation est d'autant plus fort que r est proche de 1 ou -1 .

↳ plus le nuage est rectiligne


C'est l'assertion 3.iii qui nous permet de dire si la droite de régression est proche des points. En pratique, une régression linéaire est légitime si $r > 0.9$ ou si $r < -0.9$.

$$a = \frac{\text{Cov}(x, y)}{\text{Var}(x)} \quad r = \frac{\text{Cov}(x, y)}{\sigma_x \sigma_y}$$

$\uparrow > 0$
 $\uparrow > 0$



Point de vue inférentiel: On n'a plus accès à la population totale (stat descriptive) mais à un échantillon.



échantillon aléatoire: (x_i, y_i) .

Après tirage de l'échantillon, il y a une observation $(x_i = x_i, y_i = y_i)$.

Estimation ponctuelle de la moyenne μ_x et

pour μ_x : $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$ en observant: $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$ μ_y :


pour μ_y : $\bar{Y} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n y_i$

\bar{X} et \bar{Y} sont nommés estimateurs des moyennes.

Problème de biais pour les variances:

→ Caré de la distance moyenne
 σ_n

Sur population entière, on connaît la vraie valeur de la moyenne:












n personnes \Rightarrow n écarts \Rightarrow on divise par n .

$$\text{Var}(x) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2$$

$$\sigma_x = \sqrt{\text{Var}(x)}$$

Estimation sur échantillon: (Va rigoureusement au SS)

Intuitivement, estimer la moyenne sur l'échantillon revient à choisir un individu comme individu moyen  (Ce sera vu par le calcul au SS).

effectif échantillon		nombre d'écarts	Estimateur de la variance
2	 \leftrightarrow 	1	$\frac{1}{2} \sum_{i=1}^2 (X_i - \bar{X})^2$
3	 \leftrightarrow  \leftrightarrow 	2	$\frac{1}{3} \sum_{i=1}^3 (X_i - \bar{X})^2$
n	 \leftrightarrow  \leftrightarrow 	$n-1$	$\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$

Sur population entière

$$\sigma^2 = \text{Var} X = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2$$

$$\sigma = \sqrt{\text{Var} X}$$

$$\text{Cov}(x, y) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})$$

Sur échantillon :

$$S^2 = \text{Var} X = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{X})^2$$

$$S = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{X})^2}$$

$$\text{Cov}(X, Y) = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{X})(y_i - \bar{Y})$$

Si on divise par n dans l'estimateur de la variance, on obtient une valeur à peine plus faible. C'est un estimateur biaisé.

Ce problème d'estimation est-il gênant dans ce qu'on vient de faire? NON

$$a = \frac{\text{Cov}(x, y)}{\text{Var}(x)} = \frac{\cancel{\frac{1}{n}} \sum_i (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\cancel{\frac{1}{n}} \sum_i (x_i - \bar{x})^2} = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\text{Var}(X)}$$

avec
estimateurs non
biaisés.

$$b = \bar{y} - a\bar{x}$$

pas de problème
de biais!

$$r_{xy} = \frac{\cancel{\frac{1}{n}} \sum_i (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{\cancel{\frac{1}{n}} \sum_i (x_i - \bar{x})^2} \sqrt{\cancel{\frac{1}{n}} \sum_i (y_i - \bar{y})^2}}$$

8 Point de vue inférentiel

On peut supposer que x et y sont les observations d'un échantillon des variables X et Y . On écrit donc le modèle $Y = aX + b + \epsilon$ ou, avec des notations plus fréquemment utilisées,

$$Y = \beta_1 X + \beta_0 + \epsilon$$

sur population totale
(pas aciers)

β_1 est estimé par $\hat{\beta}_1 = \frac{\sum (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sum (x_i - \bar{x})^2}$

β_0 est estimé par $\hat{\beta}_0 = \bar{y} - \hat{\beta}_1 \bar{x}$

$\hat{\beta}_1$ et $\hat{\beta}_0$ sont les estimateurs des moindres carrés de β_1 et β_0 .

$y_i = \beta_1 x_i + \beta_0 + \epsilon_i$

erreurs.

On pose

$$\hat{y}_i = \hat{\beta}_1 x_i + \hat{\beta}_0$$


\hat{y}_i prédite par la droite.

Les valeurs β_1 et β_0 calculées ci-dessus sont en réalité les estimations $\hat{\beta}_1$ et $\hat{\beta}_0$ par la méthode des moindres carrés, *i.e.* minimisant la somme des carrés des écarts (par rapport à la droite)

$$SCE = \sum_i \varepsilon_i^2 = \sum_i (y_i - \hat{y}_i)^2$$

8.1 Hypothèses sur les termes d'erreur ε

- Indépendance des erreurs : les $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$ sont indépendants.
- Exogénéité : les variables explicatives (X_1, \dots, X_n) ne sont pas corrélées au terme d'erreur. De plus, les erreurs sont centrées $E(\varepsilon_i) = 0$
- Homoscédasticité : les termes d'erreurs sont supposés de variance constante.
- Normalité des termes d'erreur : les termes d'erreurs suivent une loi normale, centrées, de variance σ^2



à i fixé, c'est constant

$$Y_i = \beta_1 X_i + \beta_0 + \varepsilon_i \quad \varepsilon_i \sim \mathcal{N}(0, \sigma)$$

Donc $Y_i \sim \mathcal{N}(\underbrace{\beta_1 X_i + \beta_0}_{\text{modèle}}; \underbrace{\sigma}_{\text{écart-type de l'erreur}})$ *indépendante*

independence entre ε_i et X_j .

8.2 Équation de la variance

D'après les hypothèses précédentes, il vient que

Équation de la variance

grâce à l'exogénéité. Il suit

$$Var(Y) = Var(\hat{Y}) + Var(\varepsilon),$$

$\beta_1 X + \beta_0 + \varepsilon$

$\beta_1 X_i + \beta_0$

ε_i

$$\sum_i (Y_i - \bar{Y})^2 = \sum_i (\hat{Y} - \bar{Y})^2 + \sum_i (Y_i - \hat{Y})^2.$$

Rapports

$(X_i, Y_i)_{i=1 \dots N}$ observations sur échantillon. Modèle linéaire:

$$Y_i = \beta_1 X_i + \beta_0 + \epsilon_i$$

ensemble aléatoire

$\mathcal{N}(0, \sigma^2)$

constantes

i.i.d

Hypothèses du modèle:

les X_i ne
présentent pas d'erreurs,
ils ne sont pas aléatoires

$$\hat{Y}_i = \beta_1 X_i + \beta_0$$

$\Rightarrow Y_i \sim \mathcal{N}(\hat{Y}_i, \sigma^2)$ indépendantes.

Somme
des carrés
totale

$$SCT = \sum_{i=1}^n (Y_i - \bar{Y})^2$$


Somme des
carrés due
au modèle

$$SCM = \sum_{i=1}^n (\hat{Y}_i - \bar{Y})^2$$

Somme des
carrés due
à l'erreur

$$SCE = \sum_{i=1}^n \epsilon_i^2 = \sum_{i=1}^n (Y_i - \hat{Y}_i)^2$$

observé
estimé par la droite



8.2 Équation de la variance

D'après les hypothèses précédentes, il vient que

$$Var(Y) = Var(\hat{Y}) + Var(\varepsilon),$$

grâce à l'exogénéité. Il suit

$$\sum_i (Y_i - \bar{Y})^2 = \sum_i (\hat{Y} - \bar{Y})^2 + \sum_i (Y_i - \hat{Y})^2.$$

$$SCT = SCM + SCE$$

Notons que
$$SCM = \sum_{i=1}^n (\hat{y}_i - \bar{y})^2 = \sum_{i=1}^n (\beta_1 x_i + \beta_0 - (\beta_1 \bar{x} + \beta_0))^2$$

$$= \sum_{i=1}^n (\beta_1 (x_i - \bar{x}))^2 = \beta_1^2 \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2$$

$$\text{Var } \hat{y} = \frac{\sum (\hat{y}_i - \bar{y})^2}{n-1} = \frac{SCM}{n-1}$$

$$\text{Var } y = \frac{\sum (y_i - \bar{y})^2}{n-1} = \frac{SCT}{n-1}$$

8.3 Coefficient de détermination

Le coefficient de détermination est le rapport de variance de Y expliquée par la régression :

$$R^2 = \frac{\text{Var}(\hat{Y})}{\text{Var}(Y)} = \frac{SCM}{SCT}$$

Le coefficient R^2 est donc la proportion de variance de Y expliquée par le modèle.

$$r_{xy}^2 = \frac{\text{Cov}(x, y)^2}{\text{Var}(x) \text{Var}(y)} = \frac{\boxed{\frac{\text{Cov}(x, y)^2}{\text{Var}^2(x)}} \text{Var}(x)}{\text{Var}(y)} = \frac{\beta_1^2 \text{Var}(x)}{\text{Var}(y)} = \frac{\beta_1^2 \frac{\sum (x_i - \bar{x})^2}{n-1}}{\frac{\sum (y_i - \bar{y})^2}{n-1}} = \frac{SCM}{SCT} = R^2$$

Estimateurs des moindres carrés de β_1 et β_0 :

$$\hat{\beta}_1 = \frac{\sum_{i=1}^N (X_i - \bar{X})(Y_i - \bar{Y})}{\sum_{i=1}^N (X_i - \bar{X})^2}$$

$$\hat{\beta}_0 = \bar{Y} - \hat{\beta}_1 \bar{X}.$$

Si les X_i ne sont pas
aléatoires et seuls Y_i et
 \bar{Y} le sont, alors
 $\hat{\beta}_1$ est une combinaison
linéaire des Y_i et de
 \bar{Y} (elle même combinaison
linéaire des Y_i).

On a vu que les Y_i sont des
normales indépendantes

$$\Rightarrow \hat{\beta}_1 \sim \mathcal{N}(\cdot, \cdot)$$

Theorem 8.1 *Sous les hypothèses du modèle de régression linéaire simple, $\hat{\beta}_1$ suit une loi normale d'espérance β_1 et de variance*

$$\sigma_{\hat{\beta}_1}^2 = \frac{\sigma_\varepsilon^2}{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}.$$

$$\hat{\beta}_1 \sim \mathcal{N}\left(\beta_1, \sqrt{\frac{\sigma_\varepsilon^2}{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}}\right).$$

$\sqrt{\sigma_{\hat{\beta}_1}^2} = \sigma_{\hat{\beta}_1}$

On fait les remarques suivantes.

- Ce théorème montre que $\hat{\beta}_1$ est sans biais pour β_1 . Cela signifie que d'un échantillon à l'autre, la valeur de $\hat{\beta}_1$ oscille autour de la valeur théorique β_1 .
- Ces écarts par rapport à la moyenne β_1 sont distribués selon une loi normale dont la variance est

$$\sigma_{\hat{\beta}_1}^2 = \frac{\sigma_\varepsilon^2}{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}.$$

On note, donc, que la variance de $\hat{\beta}_1$ croît avec σ_ε^2 , mais qu'elle décroît lorsque $\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$ croît. Ainsi, plus les X_i sont nombreux et dispersés, plus notre estimation sera fiable.

- On acceptera que la distribution de $\hat{\beta}_0$ est normale et suit la loi

$$\mathcal{N} \left(\beta_0, \sigma_\varepsilon^2 \left[\frac{1}{n} + \frac{\bar{X}^2}{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2} \right] \right). \quad (\text{Moins indispensable}).$$

On va avoir besoin d'estimer σ_{ε}^2 , variance des erreurs.


$$\bar{\varepsilon} = 0 \Rightarrow \text{Var}(\varepsilon_i) = \frac{\sum (\varepsilon_i - 0)^2}{L} = \frac{\sum \varepsilon_i^2}{L} = \frac{SCE}{L}$$

L $\underbrace{\quad}_{N?, N-1?, N-2?}$

nombre d'écarts observés


pour N données.

Pour $N=2$



Par 2 points, une droite, 0 erreurs.


Pour $N=3$



On suppose que la droite passe par 2 points, il y a 1 erreur

$$L = 3 - 2 = 1$$

Pour $N=4$



$$2 \text{ erreurs : } L = 4 - 2 = 2$$

$\text{Var}(\varepsilon_i)$ est estimée par $\frac{SCE}{N-2}$

$\sum_{i=1}^n \epsilon_i$

$\frac{SCE}{n-2}$ \rightarrow somme de $n-2$ écarts au carré indépendants de lois normales

σ^2 \rightarrow réduites par le carré de leur écart-type

donc $S_E^2 = \frac{SCE}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-2)$.

On avait $\frac{\hat{\beta}_1 - \beta_1}{\sigma_{\hat{\beta}_1}} \sim \mathcal{N}(0,1)$

\parallel

$$\frac{\hat{\beta}_1 - \beta_1}{\sqrt{\frac{\sigma_E^2}{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}}} \sim \mathcal{N}(0,1)$$

si

$\mathcal{N}(0,1)$

$$\frac{\hat{\beta}_1 - \beta_1}{\sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2} \times \frac{\sigma_E}{\sqrt{SCE/(n-2)}}}$$

$$\rightarrow \sqrt{\frac{\chi^2(n-2)}{n-2}}$$

On en déduit que

$$\frac{\hat{\beta}_1 - \beta_1}{\sqrt{\frac{SCE}{(n-2) \sum (x_i - \bar{x})^2}}} \sim t_{n-2}$$

estimation de $\sigma_{\hat{\beta}_1}^2$

Theorem 8.3 *En estimant σ_ε par s_ε , on obtient les distributions des estimateurs suivantes*

$$(\hat{\beta}_0 - \beta_0)/s_{\hat{\beta}_0} \sim t_{n-2}, \quad (\hat{\beta}_1 - \beta_1)/s_{\hat{\beta}_1} \sim t_{n-2},$$

avec

$$s_{\hat{\beta}_1}^2 = \frac{SCE}{(n-2) \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2},$$


et

$$s_{\hat{\beta}_0}^2 = \frac{SCE}{(n-2)} \left[\frac{1}{n} + \frac{\bar{X}^2}{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2} \right].$$

Si le nombre de degrés de liberté est assez élevé (plus de trente), on peut faire une approximation de la loi t de Student par une loi $\mathcal{N}(0, 1)$.

9 Tests sur la pente de la droite

Pour faire simple, les tests F de Fisher et t de Student testent l'hypothèse \mathcal{H}_0 sous laquelle le coefficient β_1 est nul, contre β_1 est non nul (ce qui permet d'affirmer que X explique Y , au moins en partie).



Comprendre : Si X évolue, Y aussi (ne pas y voir un nécessaire lien de cause à effet direct).

X explique $Y \Leftrightarrow \beta_1 \neq 0$.

Pour les tests à venir (Student / Fisher)

$$H_0 = \beta_1 = 0$$

9.1 Test de Student

Notons l'hypothèse nulle

$$H_0 = \beta_1 = 0$$

autrement formulée, H_0 est équivalente à " X n'explique pas Y ". L'estimation de β_1 dans le théorème 8.3 montre que

$$\frac{\hat{\beta}_1 - \beta_1}{s_{\hat{\beta}_1}} \sim t_{n-2},$$

β_1 nul sous H_0 .


et sous H_0 , nous garderons

$$\frac{\hat{\beta}_1}{s_{\hat{\beta}_1}} \sim t_{n-2}.$$

$$\sqrt{\frac{SCE}{(n-2) \sum (X_i - \bar{X})^2}}$$

Rappelons l'estimation

$$s_{\hat{\beta}_1} = \sqrt{\frac{SCE}{(n-2) \sum (X_i - \bar{X})^2}}$$



Nous ferons donc un test (bilatéral) de Student sur la statistique de test $\hat{\beta}_1 / s_{\hat{\beta}_1}$. On rejettera H_0 au seuil α si

$$\frac{|\hat{\beta}_1|}{s_{\hat{\beta}_1}} \geq q_{1-\alpha/2}^{t_{n-2}}.$$

Pb: le test de Student est bilatéral et la statistique du test $\frac{\hat{\beta}_1}{s_{\hat{\beta}_1}}$ n'est pas très belle...

Rappel: $t_{n-2}^2 \sim F_{1, n-2}$

9.2 Table d'ANOVA

L'analyse de la variance, souvent présentée sous forme d'un tableau, permet d'éclairer sur l'influence de la variable X sur la variable Y grâce à l'étude de la décomposition de la variance (8.1). Notons, encore, l'hypothèse nulle

$$\mathcal{H}_0 = \beta_1 = 0.$$

Prenons le carré de la variable du test précédent:

$$\frac{\hat{\beta}_1^2}{S_{\hat{\beta}_1}^2} = \frac{\hat{\beta}_1^2}{\left(\frac{SCE}{(n-2) \sum_i (X_i - \bar{X})^2} \right)} = \frac{\hat{\beta}_1^2 \sum_i (X_i - \bar{X})^2}{SCE_{(n-2)}} \sim (t_{n-2})^2$$


On a vu que c'est SCM

Donc $\frac{\hat{\beta}_1^2}{S_{\hat{\beta}_1}^2} = \frac{SCM}{SCE/(n-2)} \sim \tilde{F}_{1, n-2}$

la variable est assez simple et en lien avec les sommes de carré définies plus tôt.

De plus, c'est un test unilatéral

$$F = \frac{SCM}{SCE/(n-2)}$$



Si $F \geq q_{0.95}^{\tilde{F}_{1, n-2}}$, alors au seuil

5%, on rejette H_0 . On en déduit

que X explique Y .

Ainsi, si la p-value dans la table d'ANOVA est proche de zéro (ou en dessous du seuil fixé), on rejettera la nullité de $\hat{\beta}_1$.

Dans ce cadre, on voit qu'on peut utiliser le test de t de Student pour le rapport $\hat{\beta}_1/s_{\hat{\beta}_1}$ ou F de Fisher pour le carré de ce rapport, sans distinction. Il est totalement équivalent en cas de régression simple (ce n'est pas le cas sur une régression multiple). On note d'ailleurs que la statistique F est le carré de la statistique t .


Dans le cadre d'une régression multiple (sur plusieurs variables explicatives), le test de Fischer teste l'effet global des variables sur la variable Y , les tests de Student testent l'effet de chaque variable explicative sur Y .

10 Exemple : le cas de la régression linéaire simple


On sait que l'on mesure l'âge d'un arbre en comptant les anneaux sur une section transversale du tronc, mais cela nécessite de l'avoir abattu auparavant. Peut-on connaître l'âge à partir de la mesure de sa circonférence ?

Afin de répondre à cette question, on a effectué les mesures sur un échantillon de 27 arbres de la même espèce. À partir de ces données, on a effectué une régression de l'âge en fonction du diamètre . Les résultats ont été traités à l'aide du logiciel SPSS.

Nuage de points



Résidus



Rappel: p -value est le seuil théorique auquel on pourrait encore rejeter ou la valeur de la variable du test.

→ si $p < 0,05$, on rejette H_0 .

Analyse de variance

	Somme des carrés	ddl	Carré moyen	F	Signification
Régression	2905,549	1	2905,55	93,44	,000
Résidu	777,414	25	31,097		
Total	3682,963	26			

test de Fisher.

P value proche de 0.
On rejette H_0 .
diamètre explique significativement l'âge.

$SCM / (SCM / k)$

$9,67^2 \approx 93$

$F_{25,1}$

test de Student.

Résumé de la régression

	Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Signification
	B	Erreur standard	Bêta		
(constante)	-,974	2,604		-,374	,711
DIAMETRE	2,206	,228	,888	9,67	,000

↳ Régression

$$\text{Age} = 2,206 \text{ diamètre} - 0,974$$

Dans le cas de la régression linéaire simple, le test de Student et de Fisher sont totalement équivalents. Par conséquent, il n'est pas surprenant d'observer que $\sqrt{F} = t_{\text{diamètre}}$.

Dans notre exemple, nous avons, tant pour F que pour t , des p -values inférieures à 5%. Nous en concluons que le diamètre explique significativement l'âge des arbres.