

# Question 01. Find  $I$  by calculus techniques

$$I = \int_{-20}^{20} e^{-|x|} dx$$

< Sol >

$$\int_{-20}^{20} e^{-|x|} dx = 2 \int_0^{20} e^{-x} dx = 2 (-e^{-x}) \Big|_0^{20}$$

$$\because e^{-20} \approx 0, \therefore -e^{-x} \Big|_0^{20} = 1 - e^{-20} \approx 1$$

$$I = \int_{-20}^{20} e^{-|x|} dx = 2 \int_0^{20} e^{-x} dx = 2 (-e^{-x}) \Big|_0^{20} = 2 (1 - e^{-20}) \approx 2$$

# Question 02. Simulation Study

(1)

Find mean and variance of importance sampling estimates using proposal  $\phi(x, 0, 1)$  and  $\phi(x, 0, 5)$  or (more proposals). Compare it with that Monte Carlo.

(Which proposal gives a smaller variance? Give arguments to support your finding with using numbers and graphs.)

< Sol >

Derive of important sampling:

$$E_f[h(x)] = \int h(x)f(x)dx, \text{ where } f \text{ is a pdf}$$

$$E_f[h(x)] = \int h(x)f(x)dx = \int h(x)\frac{f(x)}{g(x)}g(x)dx = E_g[h(x)\frac{f(x)}{g(x)}]$$

$g$  is another pdf and  $\frac{f(x)}{g(x)}$

$$\therefore E_f[h(x)] = E_g\left[h(x)\frac{f(x)}{g(x)}\right]$$

$$\text{Var}_f[h(x)] = E_f[h(x)^2] - E_f[h(x)]^2$$

$$\text{Var}_g\left[h(x)\frac{f(x)}{g(x)}\right] = E_g\left[\left(h(x)\frac{f(x)}{g(x)}\right)^2\right] - E_g\left[h(x)\frac{f(x)}{g(x)}\right]^2$$

So if  $I = E_f[h(x)] = E_g\left[h(x)\frac{f(x)}{g(x)}\right]$ , which is better method?  $\rightarrow$  The smaller variance is better.

$$\text{Var}_f[h(x)] - \text{Var}_g\left[h(x)\frac{f(x)}{g(x)}\right] =$$

$$E_f[h(x)^2] - E_f[h(x)]^2 - E_g\left[\left(h(x)\frac{f(x)}{g(x)}\right)^2\right] + E_g\left[h(x)\frac{f(x)}{g(x)}\right]^2$$

$$\therefore E_f[h(x)] = E_g\left[h(x)\frac{f(x)}{g(x)}\right] = I$$

$$\therefore \text{Var}_f[h(x)] - \text{Var}_g\left[h(x)\frac{f(x)}{g(x)}\right] = E_f[h(x)^2] - E_g\left[\left(h(x)\frac{f(x)}{g(x)}\right)^2\right] = E_g\left[h(x)^2\frac{f(x)}{g(x)}\left(1 - \frac{f(x)}{g(x)}\right)\right]$$

If  $\frac{f(x)}{g(x)}\left(1 - \frac{f(x)}{g(x)}\right) > 0 \rightarrow 1 > \frac{f(x)}{g(x)}$ ,  $E_g\left[h(x)\frac{f(x)}{g(x)}\right]$  is better than  $E_f[h(x)]$

So, it is important to choose  $g(x)$ .

這個方法為 Important sampling，若是能找到一個適合的 Important function，便能達到縮減變異數的效果。

下表我們使用 Monte Carlo、Important sampling  $N(0,1)$ 以及 Important sampling  $N(0,5)$ 去估計  $I =$

$$\int_{-20}^{20} e^{-|x|} dx$$

(使用 1000 個樣本去估計一個  $I$ ，並總共估計 5000 個  $I$ ，計算這 5000 個估計量  $I$  的樣本平均與樣本變異數)


	Monte Carlo	Important sampling $N(0,1)$	Important sampling $N(0,5)$
Mean	1.99851	1.98926	1.99872
Variance	0.03619	0.14084	0.00865

小結：

三種方法用於估計  $I = \int_{-20}^{20} e^{-|x|} dx$  都很接近我們使用微積分機算的數值 2，符合理論的推導，三種方法皆為不偏估計的方法。為了比較方法的好壞，我們比較三種方法的變異數。


由上表可以清楚看出三種方法變異數的差異，最大的為 Important sampling 選擇  $N(0,1)$ 當作 important function 時得到的變異數 0.14084 以及最小的為 Important sampling 選擇  $N(0,5)$ 當作 important function 時得到的變異數 0.00865。可見 Important sampling 不一定可以降低變異數，反而會造成變異數變大。我們以圖表解釋為何差異這麼大，將 5000 個估計值，每一個估計值由 1000 個樣本構成，做成散佈圖，看三種方法的估計值浮動範圍差異。

(a) Monte Carlo




由上圖可見，使用 Monte Carlo 方法去估計  $I = \int_{-20}^{20} e^{-|x|} dx$  時，估計值的範圍大約為 (1.4, 2.6)，其中大部分都集中在 (1.8, 2.3)。

(b) Important sampling with  $N(0,1)$




由上圖可見，使用 Important sampling with  $N(0,1)$  方法去估計  $I = \int_{-20}^{20} e^{-|x|} dx$  時，估計值浮動範圍很大，但大部分都集中在 5 以下，偶而會出現極端值。

接著將極端值刪除（大於 3 的值），並重新繪製散佈圖



圖中顯示，雖然大部分的資料點都幾鐘在(1.8,2.2)之間，但仍有很多點出現在 (2.2, 3.0) 之間，甚至更大，浮動範圍比 Monte Carlo 的範圍(1.4, 2.6)來得大。也因此使用 Important sampling 非但沒有降低 Monte Carlo 方法的變異數，反正比 Monte Carlo 的變異數來得大。

(c) Important sampling with  $N(0,5)$



這次 Important sampling 方法去估計  $I = \int_{-20}^{20} e^{-|x|} dx$  時，我們改變 Important function，由  $N(0,1)$  改成  $N(0,5)$ 。從上圖中發現，這 5000 個估計值範圍為  $(1.7, 2.4)$  附近，大多都集中在  $(1.8, 2.1)$  之間，比 Monte Carlo 的範圍  $(1.4, 2.6)$  來得小，因此變異數比 Monte Carlo 的變異數小，縮減量約為 76.1%。

結論：

選擇適當的 Important function 可以使得估計效果與原本使用的方法一樣，同時變異數達到縮減的效果，但選擇不好的 Important function 則會造成變異數變大，雖然估計值差不多。以本題的兩個 Important function  $\phi(x, 0, 1)$  與  $\phi(x, 0, 5)$ ， $\phi(x, 0, 5)$  可以讓整體變異量下降 76.1%，而  $\phi(x, 0, 1)$  造成整體變異量上升。

### # Question 03.


(a) Obtain the mean and variance of  $N(0,1)$  using importance sampling with  $g \sim t_3$ .

同樣取 5000 個估計量，每一個估計量分別取 100, 200,  $\dots$ , 1000 去探討，樣本數是否影響估計效果 < 並觀察估計是否準確。


Important sampling  $t(3)$  去估計 Normal  $(0, 1)$  的平均與變異數

估計標準常態的 mean 的樣本平均與樣本變異數：

n	100	200	300	400	500
Mean of $\hat{\mu}$	0.0001	-0.0005	0.00046	-0.00059	-0.00009
Variance of $\hat{\mu}$	0.00946	0.00463	0.00318	0.00231	0.00189
n	600	700	800	900	1000
Mean of $\hat{\mu}$	-0.00043	-0.00029	-0.00059	0.00054	-0.00023
Variance of $\hat{\mu}$	0.00156	0.00133	0.00118	0.00104	0.00093




(在不同樣本數下的樣本平均)




(在不同樣本數下的樣本變異數)

估計標準常態的 Variance 的樣本平均與變異數：

n	100	200	300	400	500
mean of $\widehat{\sigma^2}$	0.99049	0.99495	0.99774	0.9983	0.99883
Variance of $\widehat{\sigma^2}$	0.01102	0.0054	0.00374	0.00266	0.00222
n	600	700	800	900	1000
Mean of $\widehat{\sigma^2}$	0.99896	0.99943	0.99884	0.99857	0.99917
Variance of $\widehat{\sigma^2}$	0.00183	0.00159	0.00142	0.00126	0.00109



(在不同樣本數下的樣本平均)



(在不同樣本數下的樣本變異數)


小結：

由 Important sampling with t(3)去估計標準常態的 mean 與 Variance，在不同的抽樣樣本數下都蠻接近的標準常態的 mean 0 以及 Variance 1，特別是當抽樣樣本數逐漸變多時，估計值的變異數都逐漸下降，可知樣本數會影響準確度。


(b) Obtain the mean and variance of  $t_3$  using importance sampling with  $g \sim N(0,1)$ .

估計  $t(3)$  的 mean 的樣本平均與樣本變異數：

n	100	200	300	400	500
Mean of $\hat{\mu}$	-0.03472	-0.07704	0.0064	0.01828	0.02777
Variance of $\hat{\mu}$	4.17662	37.85109	0.14083	0.33347	7.30422
n	600	700	800	900	1000
Mean of $\hat{\mu}$	-0.00569	0.00535	0.02893	-0.09281	-0.00659
Variance of $\hat{\mu}$	0.54173	0.35007	4.66431	21.42051	0.64627



(在不同樣本數下的樣本平均)




(在不同樣本數下的樣本變異數)




估計  $t(3)$  的 variance 的樣本平均與樣本變異數：

n	100	200	300	400	500
mean of $\widehat{\sigma^2}$	-12.69518	0.66387	0.50941	1.10809	1.42652
Variance of $\widehat{\sigma^2}$	663024.834	1238.09275	4433.13618	387.9221	16.91081
n	600	700	800	900	1000
Mean of $\widehat{\sigma^2}$	1.33154	-8.73801	-0.81247	1.53318	0.52701
Variance of $\widehat{\sigma^2}$	272.9102	518980.652	22146.2786	19.25389	5697.17336



(在不同樣本數下的樣本平均)




(在不同樣本數下的樣本變異數)

小結：

由 important sampling with  $N(0,1)$  去估計  $t(3)$  的平均與變異數，在不同的抽樣樣本數下，產生極大的差異，估計平均值的部分相對於估計變異數來得準確，估計平均值大多落在 0 的上下，與  $t(3)$  實際的母體平均 0 蠻接近的。再來看估計變異數的部分，跳動範圍蠻大的，甚至出現變異數小於 0 的部分，與  $t(3)$  實際的母體變異數相差甚大，同時估計變異數的變異數跳動範圍也是很大。因此我認為用標準常態去估計  $t(3)$  並不是可行的方法。

(c) Comment on the results.

比較(a)與(b)的部分，由  $t(3)$  去估計  $N(0,1)$  與  $N(0,1)$  去估計  $t(3)$  兩個差異很大，最主要差異性來自於兩個分配的尾巴的部分， $t(3)$  尾巴較厚而  $N(0,1)$  尾巴較薄（下圖），而 important sampling 要估計的好時， $\frac{f(x)}{g(x)}$  要小於 1 ( $f(X)$  為原分配， $g(x)$  為 important function))，所以當  $t(3)/N(0,1)$ ，尾巴的部分會因為  $N(0,1)$  的值太小，而讓比值過大，因而讓 Variance 變過大。因此，用 important sampling with  $t(3)$  去估計  $N(0,1)$  是一個好的方法，但相反用 important sampling with  $N(0,1)$  去估計  $t(3)$  則不是一個好的方法。



(上圖只截取一段尾巴，藍線為  $t(3)$  分配，紅線為  $N(0,1)$  分配)

# Appendix

Code: <http://rpubs.com/YaPi/388887>