सरल रेखा
माइंड मैप

ज्यामिति मूल
- समान्तर चतुर्भुज: विकर्ण समद्विभाजित
- समचतुर्भुज $p_1 = p_2$; चक्रीय $A + C = \pi$

निर्देशांक व दूरी
- $\sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$
- ध्रुवीय $(r\cos\theta, r\sin\theta)$

विभाजन सूत्र
- $\dfrac{mx_2 \pm nx_1}{m \pm n}$
- हरात्मक: AP, AB, AQ H.P. में

त्रिभुज के केन्द्र
- $G,\ I,\ O,\ H$ सूत्र
- $G = \dfrac{H + 2O}{3}$
- समद्विबाहु: संरेख

क्षेत्रफल
- $\frac{1}{2}|\det|$; $0 \Rightarrow$ संरेख
- बहुभुज: क्रमिक सूत्र

बिन्दुपथ
- $P(h,k)$, विलोपन
- दूरियों से वृत्त / शांकव

रेखा के रूप
- $y = mx + c,\ \dfrac{x}{a} + \dfrac{y}{b} = 1$
- $x\cos\alpha + y\sin\alpha = p$
- प्राचलिक r

कोण, पाद, प्रतिबिम्ब
- $\left|\dfrac{m_1 - m_2}{1 + m_1 m_2}\right|$
- पाद / प्रतिबिम्ब अनुपात रूप

दूरियाँ
- $\dfrac{|ax_1 + by_1 + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}$
- समान्तर: $\dfrac{|c_1 - c_2|}{\sqrt{a^2 + b^2}}$

स्थिति व संगामिता
- एक ही ओर: $L(P)L(Q) > 0$
- संगामी: $\det = 0$

प्रतिबिम्ब
- $y = x$ में $(a,b) \to (b,a)$
- एक बिन्दु द्वारा रेखा का प्रतिबिम्ब

रेखाओं का कुल
- $L_1 + \lambda L_2 = 0$
- रैखिक प्राचल: स्थिर बिन्दु

अक्ष परिवर्तन
- $x = X + h$
- $x = X\cos\theta - Y\sin\theta$

कोण समद्विभाजक
- $\dfrac{L_1}{\sqrt{}} = \pm\dfrac{L_2}{\sqrt{}}$
- न्यून: $a_1a_2 + b_1b_2 < 0$ परीक्षण

रेखा-युग्म
- $\tan\theta = \left|\dfrac{2\sqrt{h^2 - ab}}{a + b}\right|$
- $\Delta = 0$; $a + b = 0$ लम्बवत्

समघातीकरण
- $1 = \dfrac{lx + my}{n}$
- OA, OB युग्म देता है