Nevin Thung - 2306203204 - C

Nilai dataset = [1, 2, 2, 3, 4, 6, 8], jumlah data (n) = 7

A. Menghitung SKEWNESS

1) Hitung $\bar{x}$

$$\bar{x} = \frac{\Sigma x}{n} = \frac{1+2+2+3+4+6+8}{7} = \frac{26}{7} \approx 3.714$$

2) Membuat Matrix solusi $(x-\bar{x}), (x-\bar{x})^2, \dots, (x-\bar{x})^4$

x	$(x-\bar{x})$	$(x-\bar{x})^2$	$(x-\bar{x})^3$	$(x-\bar{x})^4$
1	-2.714	7.366	-19.991	54.256
2	-1.714	2.938	-5.036	8.632
2	-1.714	2.938	-5.036	8.632
3	-0.714	0.510	-0.364	0.260
4	0.286	0.082	0.023	0.007
6	2.286	5.224	11.947	27.311
8	4.286	18.370	78.734	337.454
Total	0	37.430	60.277	436.552

3) Hitung varians dan SD

$$s^2 = \frac{\Sigma (x-\bar{x})^2}{n-1} = \frac{37.430}{6} = 6.238$$

$$s = \sqrt{6.238} \approx 2.498$$

4) Skewness

$$S = \frac{\Sigma_{i=1}^{n} (x_i - \bar{x})^3}{(n-1)s^3}$$

$$= \frac{60.277}{6 \times (2.498)^3}$$

$$= 0.645$$

3. menghitung KURTOSIS

$$K = \frac{\Sigma_{i=1}^{n} (x_i - \bar{x})^4}{ns^4} - 3$$

$$= \frac{436.552}{7 \times (2.498)^4} - 3$$

$$= -1.398$$

Dipindai dengan CamScanner