

ベクトル解析

Anko

2023 年 7 月 29 日

目次

1	記法・記号	2
2	ベクトル空間	3
3	ベクトル解析	4

1 記法・記号

定義 (Kronecker のデルタ).

$$\delta_{ij} = \begin{cases} 1 & (i = j) \\ 0 & (i \neq j) \end{cases} \quad (1)$$

定義 (レビ・チビタの完全反対称テンソル (Levi-Civita antisymmetric tensor)).

$\varepsilon_{\mu_1 \dots \mu_k}$ は $\mu_1 \dots \mu_k$ が順列のとき $1 \dots k$ の偶置換なら 1、奇置換なら -1 とする。順列ではないときは 0 とする。

$$\varepsilon_{\mu_1 \dots \mu_k} := \begin{cases} \text{sgn} \begin{pmatrix} 1 & \dots & k \\ \mu_1 & \dots & \mu_k \end{pmatrix} & (\mu_1 \dots \mu_k \text{ が順列のとき}) \\ 0 & (else) \end{cases} \quad (2)$$

$$= \begin{cases} 1 & (\mu_1 \dots \mu_k \text{ が偶置換のとき}) \\ -1 & (\mu_1 \dots \mu_k \text{ が奇置換のとき}) \\ 0 & (else) \end{cases} \quad (3)$$

定義 (Einstein の縮約記法).

同じ項で添字が重なる場合はその添字について和を取る.

$$A_i B_i = \sum_{i=x,y,z} A_i B_i \quad (4)$$

2 ベクトル空間

定義 (ベクトル空間).

体 K 上の加群を K 上のベクトル空間といい、ベクトル空間の元をベクトルという。

定義 (ベクトル空間における内積と外積).

ベクトル $\mathbf{A} = (A_x, A_y, A_z)$, $\mathbf{B} = (B_x, B_y, B_z)$ における内積と外積を定義する。

$$\mathbf{A} \cdot \mathbf{B} = A_x B_x + A_y B_y + A_z B_z \quad (5)$$

$$\mathbf{A} \times \mathbf{B} = (A_y B_z - A_z B_y, A_z B_x - A_x B_z, A_x B_y - A_y B_x) \quad (6)$$

定理 1.

内積と外積について Einstein の縮約記法を用いて次のように書ける。

$$\mathbf{A} \cdot \mathbf{B} = A_i B_i \quad (7)$$

$$\mathbf{A} \times \mathbf{B} = \mathbf{e}_i \varepsilon_{ijk} A_j B_k \quad (8)$$

◇

証明

内積については自明。外積について次のように求められる。

$$(\mathbf{A} \times \mathbf{B})_1 = \varepsilon_{1jk} A_j B_k = A_2 B_3 - A_3 B_2 \quad (9)$$

$$(\mathbf{A} \times \mathbf{B})_2 = \varepsilon_{2jk} A_j B_k = A_3 B_1 - A_1 B_3 \quad (10)$$

$$(\mathbf{A} \times \mathbf{B})_3 = \varepsilon_{3jk} A_j B_k = A_1 B_2 - A_2 B_1 \quad (11)$$

□

3 ベクトル解析

定義.

ベクトル $\mathbf{A} = (A_x, A_y, A_z)$ について勾配 $\nabla \mathbf{A}$ と発散 $\nabla \cdot \mathbf{A}$ 、回転 $\nabla \times \mathbf{A}$ を次のように定義する。

$$\nabla \mathbf{A} = \left(\frac{\partial A_x}{\partial x}, \frac{\partial A_y}{\partial y}, \frac{\partial A_z}{\partial z} \right) \quad (12)$$

$$\nabla \cdot \mathbf{A} = \frac{\partial A_x}{\partial x} + \frac{\partial A_y}{\partial y} + \frac{\partial A_z}{\partial z} = \partial_i A_i \quad (13)$$

$$\nabla \times \mathbf{A} = \left(\frac{\partial A_z}{\partial y} - \frac{\partial A_y}{\partial z}, \frac{\partial A_x}{\partial z} - \frac{\partial A_z}{\partial x}, \frac{\partial A_y}{\partial x} - \frac{\partial A_x}{\partial y} \right) = \epsilon_{ijk} \partial_j A_k \quad (14)$$

定理 2 (勾配・発散・回転の線形性).

それぞれ線形性が成り立つ。

$$\nabla(f + g) = \nabla f + \nabla g \quad (15)$$

$$\nabla \cdot (\mathbf{A} + \mathbf{B}) = \nabla \cdot \mathbf{A} + \nabla \cdot \mathbf{B} \quad (16)$$

$$\nabla \times (\mathbf{A} + \mathbf{B}) = \nabla \times \mathbf{A} + \nabla \times \mathbf{B} \quad (17)$$

◇

証明

$$(\nabla(f + g))_i = \partial_i(f + g) \quad (18)$$

$$= \partial_i f + \partial_i g \quad (19)$$

$$= (\nabla f + \nabla g)_i \quad (20)$$

$$\nabla \cdot (\mathbf{A} + \mathbf{B}) = \partial_i(A_i + B_i) \quad (21)$$

$$= \partial_i A_i + \partial_i B_i \quad (22)$$

$$= \nabla \cdot \mathbf{A} + \nabla \cdot \mathbf{B} \quad (23)$$

$$(\nabla \times (\mathbf{A} + \mathbf{B}))_i = \epsilon_{ijk} \partial_j(A_k + B_k) \quad (24)$$

$$= \epsilon_{ijk} \partial_j A_k + \epsilon_{ijk} \partial_j B_k \quad (25)$$

$$= \nabla \times \mathbf{A} + \nabla \times \mathbf{B} \quad (26)$$

□

定理 3 (スカラー倍の勾配・発散・回転).

スカラー倍はそれぞれ次のようになる。

$$\nabla(fg) = f\nabla g + g\nabla f \quad (27)$$

$$\nabla \cdot (f\mathbf{A}) = f(\nabla \cdot \mathbf{A}) + \mathbf{A} \cdot (\nabla f) \quad (28)$$

$$\nabla \times (f\mathbf{A}) = f(\nabla \times \mathbf{A}) - \mathbf{A} \times (\nabla f) \quad (29)$$

◇

証明

$$(\nabla(fg))_i = \partial_i(fg) \quad (30)$$

$$= f\partial_i g + g\partial_i f \quad (31)$$

$$= (f\nabla g + g\nabla f)_i \quad (32)$$

$$\nabla \cdot (f\mathbf{A}) = \partial_i(fA_i) \quad (33)$$

$$= f\partial_i A_i + A_i\partial_i f \quad (34)$$

$$= f(\nabla \cdot \mathbf{A}) + \mathbf{A} \cdot (\nabla f) \quad (35)$$

$$(\nabla \times (f\mathbf{A}))_i = \varepsilon_{ijk}\partial_j(fA_k) \quad (36)$$

$$= f\varepsilon_{ijk}\partial_j A_k + \varepsilon_{ijk}A_k\partial_j f \quad (37)$$

$$= f\varepsilon_{ijk}\partial_j A_k - \varepsilon_{ikj}A_k\partial_j f \quad (38)$$

$$= (f(\nabla \times \mathbf{A}) - \mathbf{A} \times (\nabla f))_i \quad (39)$$

□

定理 4 (ベクトルの内積・外積の勾配・発散・回転).

$$\nabla(\mathbf{A} \cdot \mathbf{B}) = \mathbf{A} \times (\nabla \times \mathbf{B}) + \mathbf{B} \times (\nabla \times \mathbf{A}) + (\mathbf{A} \cdot \nabla)\mathbf{B} + (\mathbf{B} \cdot \nabla)\mathbf{A} \quad (40)$$

$$\nabla \cdot (\mathbf{A} \times \mathbf{B}) = \mathbf{B} \cdot (\nabla \times \mathbf{A}) - \mathbf{A} \cdot (\nabla \times \mathbf{B}) \quad (41)$$

$$\nabla \times (\mathbf{A} \times \mathbf{B}) = \mathbf{A}(\nabla \cdot \mathbf{B}) - \mathbf{B}(\nabla \cdot \mathbf{A}) + (\mathbf{B} \cdot \nabla)\mathbf{A} - (\mathbf{A} \cdot \nabla)\mathbf{B} \quad (42)$$

◇

証明

$$(\nabla(\mathbf{A} \cdot \mathbf{B}))_i = \partial_i(A_j B_j) \quad (43)$$

$$= (A_j \partial_i B_j + B_j \partial_i A_j) - (A_j \partial_j B_i + B_j \partial_j A_i) + (A_j \partial_j B_i + B_j \partial_j A_i) \quad (44)$$

$$= (\delta_{il} \delta_{jm} - \delta_{im} \delta_{jl})(A_j \partial_l B_m + B_j \partial_l A_m) + (A_j \partial_j B_i + B_j \partial_j A_i) \quad (45)$$

$$= \varepsilon_{kij} \varepsilon_{klm} (A_j \partial_l B_m + B_j \partial_l A_m) + (A_j \partial_j B_i + B_j \partial_j A_i) \quad (46)$$

$$= \varepsilon_{ijk} A_j \varepsilon_{klm} \partial_l B_m + \varepsilon_{ijk} B_j \varepsilon_{klm} \partial_l A_m + A_j \partial_j B_i + B_j \partial_j A_i \quad (47)$$

$$= (\mathbf{A} \times (\nabla \times \mathbf{B}) + \mathbf{B} \times (\nabla \times \mathbf{A}) + (\mathbf{A} \cdot \nabla) \mathbf{B} + (\mathbf{B} \cdot \nabla) \mathbf{A})_i \quad (48)$$

$$\nabla \cdot (\mathbf{A} \times \mathbf{B}) = \partial_i (\varepsilon_{ijk} A_j B_k) \quad (49)$$

$$= \varepsilon_{ijk} (B_k \partial_i A_j + A_j \partial_i B_k) \quad (50)$$

$$= B_k \varepsilon_{kij} \partial_i A_j - A_j \varepsilon_{jik} \partial_i B_k \quad (51)$$

$$= \mathbf{B} \cdot (\nabla \times \mathbf{A}) - \mathbf{A} \cdot (\nabla \times \mathbf{B}) \quad (52)$$

$$(\nabla \times (\mathbf{A} \times \mathbf{B}))_i = \varepsilon_{ijk} \partial_j \varepsilon_{klm} A_l B_m \quad (53)$$

$$= \varepsilon_{kij} \varepsilon_{klm} (B_m \partial_j A_l + A_l \partial_j B_m) \quad (54)$$

$$= (\delta_{il} \delta_{jm} - \delta_{im} \delta_{jl})(B_m \partial_j A_l + A_l \partial_j B_m) \quad (55)$$

$$= (B_j \partial_j A_i + A_i \partial_j B_j) - (B_i \partial_j A_j + A_j \partial_j B_i) \quad (56)$$

$$= A_i \partial_j B_j - B_i \partial_j A_j + B_j \partial_j A_i - A_j \partial_j B_i \quad (57)$$

$$= \mathbf{A}(\nabla \cdot \mathbf{B}) + \mathbf{B}(\nabla \cdot \mathbf{A}) + (\mathbf{B} \cdot \nabla) \mathbf{A} - (\mathbf{A} \cdot \nabla) \mathbf{B} \quad (58)$$

□

定理 5 (有名定理).

$$\nabla \cdot (\nabla \times \mathbf{A}) = 0 \quad (59)$$

$$\nabla \times (\nabla f) = \mathbf{0} \quad (60)$$

$$\nabla \times (\nabla \times \mathbf{A}) = \nabla \cdot (\nabla \mathbf{A}) - \nabla^2 \mathbf{A} \quad (61)$$

◇

証明

$$\nabla \cdot (\nabla \times \mathbf{A}) = \partial_i (\varepsilon_{ijk} \partial_j A_k) \quad (62)$$

$$= \varepsilon_{ijk} \partial_i \partial_j A_k \quad (63)$$

このとき対称性から i, j を交換しても等しい。

$$\varepsilon_{ijk}\partial_i\partial_j A_k = \varepsilon_{jik}\partial_j\partial_i A_k \quad (64)$$

$$\iff \varepsilon_{ijk}\partial_i\partial_j A_k = -\varepsilon_{ijk}\partial_i\partial_j A_k \quad (65)$$

$$\iff \varepsilon_{ijk}\partial_i\partial_j A_k = 0 \quad (66)$$

よって

$$\nabla \cdot (\nabla \times \mathbf{A}) = 0 \quad (67)$$

他も同様にして

$$(\nabla \times (\nabla f))_i = \varepsilon_{ijk}\partial_j\partial_k f = 0 \quad (68)$$

$$(\nabla \times (\nabla \times \mathbf{A}))_i = \varepsilon_{ijk}\partial_j(\varepsilon_{klm}\partial_l A_m) \quad (69)$$

$$= \varepsilon_{kij}\varepsilon_{klm}\partial_j\partial_l A_m \quad (70)$$

$$= (\delta_{il}\delta_{jm} - \delta_{im}\delta_{jl})\partial_j\partial_l A_m \quad (71)$$

$$= \partial_j\partial_i A_j - \partial_j^2 A_i \quad (72)$$

$$= (\nabla \cdot (\nabla \mathbf{A}) - \nabla^2 \mathbf{A})_i \quad (73)$$

□

定理 6 (Gauss の定理).

$$\int_V \nabla \cdot \mathbf{A} \, dV = \oint_{\partial V} \mathbf{A} \cdot d\mathbf{S} \quad (74)$$

◇