

2023 年度京都大学線形代数学（演義）A

第 6 回宿題解答例

中安淳

2023 年 6 月 20 日

宿題 25

次の 4 次正方行列の階数 (a に依存する) を求めよ。

$$\begin{pmatrix} a & 1 & 0 & 1 \\ 1 & a & 1 & 0 \\ 0 & 1 & a & 1 \\ 1 & 0 & 1 & a \end{pmatrix}.$$

解答 与えられた行列の第 1 行から第 3 行を引き第 2 行から第 4 行を引いて、

$$\begin{pmatrix} a & 0 & -a & 0 \\ 0 & a & 0 & -a \\ 0 & 1 & a & 1 \\ 1 & 0 & 1 & a \end{pmatrix}.$$

ここで $a = 0$ の場合、この行列は次になるので階数は 2 である。

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

以下では $a \neq 0$ の場合を考える。第 1 行と第 2 行を a で割って、

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & a & 1 \\ 1 & 0 & 1 & a \end{pmatrix}.$$

第 4 行から第 1 行を引き第 3 行から第 2 行を引いて、

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & a & 2 \\ 0 & 0 & 2 & a \end{pmatrix}.$$

第 3 行と第 4 行を入れ替えて、

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 2 & a \\ 0 & 0 & a & 2 \end{pmatrix}.$$

第 3 行を 2 で割って、

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{2}a \\ 0 & 0 & a & 2 \end{pmatrix}.$$

第 4 行から第 3 行の a 倍を引いて、

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{2}a \\ 0 & 0 & 0 & 2 - \frac{1}{2}a^2 \end{pmatrix}.$$

したがって、 $2 - \frac{1}{2}a^2 = 0$ の時つまり $a = \pm 2$ の時階数は 3 で、そうでない場合階数は 4 である。

以上より求める階数は、 $a = 0$ の時 2 で、 $a = \pm 2$ の時 3 で、いずれでもない場合は 4 である。

宿題 26

行に関する基本変形

- 第 i 行と第 j 行を入れかえる

は実は他の二つの行に関する基本変形

- 第 i 行を c 倍する ($c \neq 0$) と
- 第 i 行に第 j 行の c 倍を加える ($i \neq j$)

のみを用いることでも実現できる。このことを踏まえて、基本行列

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

を他の基本行列

$$\begin{pmatrix} * & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & * \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & * \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ * & 1 \end{pmatrix}$$

の積として表せ。

解答 行列 $\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$ の下の行に上の行を足して、上の行から下の行を引いて、上の行を -1 倍して、下の行から上の行を引けば、

$$\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} a \\ a+b \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} -b \\ a+b \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} b \\ a+b \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} b \\ a \end{pmatrix}$$

で行の交換になる。これを基本行列で考えることで

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

を得る。