

Troubles de la déglutition et psychotropes

⚠ Les troubles de la déglutition sont fréquents chez les usagers de psychotropes. Les antipsychotiques et les anxiolytiques sont les plus à risque. Ces troubles doivent être systématiquement dépistés, car ils peuvent entraîner des complications graves du fait du passage d'aliments, de boisson ou de salive dans les voies aériennes :

- ▶ fausse-roues avec risque d'asphyxie
- ▶ pneumopathies d'inhalation
- ▶ dénutrition et déshydratation

⚠ Différents mécanismes peuvent être en cause

📌 effets extra-pyramidaux sur les muscles impliqués dans la déglutition

- ▶ dyskinésie aiguë
- ▶ syndrome parkinsonien
- ▶ dyskinésie tardive

📌 effets anticholinergiques entraînant

- ▶ sécheresse de la bouche
- ▶ diminution du péristaltisme (contraction) de l'œsophage

📌 hypersialorrhée (hypersalivation)

📌 sédation

📌 perte du réflexe nauséux

⚠ aux associations de psychotropes à fortes doses et à la charge anticholinergique !

⚠ Plusieurs autres facteurs augmentent le risque

- ▶ déficits cognitifs
- ▶ état dentaire : les usagers de psychotropes doivent voir très régulièrement un dentiste !
- ▶ personnes âgées
- ▶ usage d'alcool
- ▶ manger vite ou de gros morceaux

⚠ Chez les usagers de clozapine, il faut surveiller particulièrement les troubles de la déglutition du fait de la charge anticholinergique et de l'hypersialorrhée.

! le risque de pneumopathie d'inhalation est élevé

! il faut réduire au maximum la charge anticholinergique et les benzodiazépines

! en cas de pneumonie, le risque de surdosage est majeur du fait de l'inhibition enzymatique du CYP1A2 : diminuer préventivement de moitié la dose de clozapine si pas de clozapinémie disponible en urgence

📄 Des outils de dépistage existent par ex Eating Assessment Tool-EAT-10

👤 L'avis d'un.e orthophoniste ou d'un.e ergothérapeute est souvent très utile.

Références

<https://doi.org/10.1080/17512433.2019.1577134>

<https://doi.org/10.1136/gpsych-2019-100183>

