

Les effets des benzodiazépines sur la mémoire

 Les benzodiazépines (alprazolam, oxazépam, diazépam, etc.) et molécules apparentées (zopiclone) sont fréquemment prescrits pour leur effets anxiolytiques (↓ anxiété) et hypnotiques (induction et maintien du sommeil).

 Comme tous les médicaments efficaces, leur usage expose à des effets indésirables. La plainte la plus fréquente concerne les effets sur la mémoire. Ces effets amnésiants des benzodiazépines, variables d'une personne à l'autre, augmentent :

- ▶ avec l'âge
- ▶ avec la dose
- ▶ en cas d'association avec d'autres médicaments amnésiants, notamment les psychotropes ayant un effet anticholinergique (cyamémazine, clozapine, hydroxyzine certains antidépresseurs, etc.).

 Les benzodiazépines peuvent perturber la mémoire épisodique, c'est à dire la capacité à se souvenir d'événements passés, et à prévoir ceux à venir. Au quotidien, cela peut entraîner des oublis de RDV, de localisation d'objets, etc.

 Les benzodiazépines peuvent aussi perturber la capacité à mémoriser de nouvelles informations, et entraîner une amnésie dite antérograde. Cet effet est très marqué chez les benzodiazépines à ½ vie courte, c'est à dire celles qui sont rapidement éliminées par l'organisme, comme par ex. les Z-médicaments (zolpidem et zopiclone). On peut oublier totalement ce que l'on a fait ou dit si on ne s'endort pas immédiatement au lit après la prise de ce traitement. Ces effets amnésiants peuvent être utilisés de manière criminelle, les benzodiazépines font partie des substances administrées à l'insu de la personne pour induire une soumission chimique. Du fait de l'amnésie, les personnes ne se souviennent plus d'avoir été victimes d'agression ou autre acte criminel, ce qui complique leur témoignage notamment en cas de dépôt de plainte.

 Du fait de ces effets amnésiants, il est vivement déconseillé de prendre des benzodiazépines pour diminuer l'anxiété immédiatement après l'exposition à un événement traumatique. Cela aggrave les perturbations aiguës de la mémoire générées par le trauma, et augmente le risque de développer un trouble de stress post-traumatique !

 Les effets amnésiants disparaissent en général rapidement après l'arrêt des benzodiazépines. Cependant, des études montrent qu'en cas d'exposition prolongée, des perturbations mnésiques peuvent persister plusieurs mois après l'arrêt. Une association a été mise en évidence entre usage prolongé de benzodiazépine et risque augmenté de démence.

 En l'état actuel des connaissances, on ne peut pas affirmer qu'il existe une relation de cause à effet dans l'apparition de ces déficits cognitifs. En effet, d'autres facteurs pourraient être impliqués chez les usagers de benzodiazépines, liés aux pathologies traitées. Néanmoins, par précaution, il convient de limiter autant que possible la durée de prescription des benzodiazépines.

Références

<https://10.1136/bmj.g5205>

<https://doi.org/10.1093/jat/bkac017>

