

Symptômes dépressifs induits par un médicament

💊 La survenue de symptômes dépressifs, incluant des idées suicidaires, est un effet indésirable mentionné dans la « notice patient » de nombreux médicaments prescrits pour des problèmes de santé non psychiatriques.

? Comment interpréter cette information? La liste de la "notice patient" est établie à partir :

- ☞ des essais thérapeutiques évaluant l'efficacité et la tolérance du médicament avant l'autorisation de mise sur le marché (AMM). Seuls les effets indésirables fréquents sont identifiés du fait du nombre limité de participants
- ☞ des données de pharmacovigilance post-AMM, identifiant des effets indésirables plus rares lorsque des milliers de personnes sont traitées par ce médicament

⚠ Les symptômes dépressifs peuvent être mentionnés même si le lien de cause à effet avec la prise du médicament n'est pas certain :

- ☞ le processus de vérification de ce lien est long et complexe
- ☞ quand des symptômes dépressifs surviennent après l'initiation d'un médicament, il est souvent difficile de déterminer s'ils sont induit par le médicament ou liés au problème de santé entraînant sa prescription (biais d'indication)

💊 Les symptômes dépressifs induits par des médicaments :

- ☞ apparaissent dans les semaines suivant l'initiation
- ☞ sont liés aux propriétés pharmacologiques du médicament : impact sur les neurotransmetteurs, les hormones, le système immunitaire, etc.
- ☞ régressent en général rapidement après l'arrêt du traitement ou la réduction des doses, quand les effets pharmacologiques du traitement disparaissent ou s'atténuent

💊 Les médicaments non psychotropes avec un risque bien documenté de symptômes dépressifs sont (liste non exhaustive) :

- ☞ β -bloquants : surtout les "lipophiles" passant la barrière hémato-méningée (cad pouvant atteindre le cerveau). Le propranolol, très prescrit en psychiatrie, est un des plus à risque. L'aténolol non lipophile est une bonne alternative
- ☞ corticoïdes : surtout à hautes doses (> 40 mg/jour de prednisolone), typiquement mais pas toujours associés à des symptômes hypomaniaques (humeur labile, accélération, etc.)
- ☞ contraceptifs hormonaux : effet lié aux progestatifs, surtout chez les jeunes femmes
- ☞ antipaludéens : méfloquine
- ☞ immuno-modulateurs: interféron- α , interleukine-2

💊 Le niveau de preuve est moins élevé pour d'autres médicaments considérés à risque:

- ☞ par ex l'isotrénoïne prescrit pour l'acné a été suspecté d'induire des symptômes dépressifs, mais des études ont montré que l'effet était inverse, ces symptômes sont le plus souvent améliorés par le traitement de l'acné
- ☞ des biais d'indication pourraient aussi expliquer les associations entre symptômes dépressifs et usage d'anticonvulsivants, d'antimigraineux ou de montelukast (pour l'asthme)

! Chez les personnes concernées par un trouble psychiatrique, une surveillance accrue de l'état psychique et du risque suicidaire est recommandée, et une adaptation des traitements psychotropes peut être nécessaire

Références

<https://doi.org/10.1016/j.jad.2024.01.119>

<https://doi.org/10.1001/jama.2018.6741>

