

FDR: 9.929e−07
Coefficient: −1.31e+00
Value: symrk
LjRoot58
80
60
40
20
0
WT (n=4)
symrk (n=4)
ccamk (n=4)
nsp1 (n=4)
nsp2 (n=4)
Genotype


FDR: 9.929e−07
Coefficient: −1.31e+00
Value: ccamk
LjRoot58
80
60
40
20
0
WT (n=4)
symrk (n=4)
ccamk (n=4)
nsp1 (n=4)
nsp2 (n=4)
Genotype


FDR: 9.929e−07
Coefficient: −1.31e+00
Value: nsp1
LjRoot58
80
60
40
20
0
WT (n=4)
symrk (n=4)
ccamk (n=4)
nsp1 (n=4)
nsp2 (n=4)
Genotype


FDR: 9.929e−07
Coefficient: −1.31e+00
Value: nsp2
LjRoot58
80
60
40
20
0
WT (n=4)
symrk (n=4)
ccamk (n=4)
nsp1 (n=4)
nsp2 (n=4)
Genotype


FDR: 1.935e−05
Coefficient: 1.42e+00
Value: ccamk
LjRoot237
400
300
200
100
WT (n=4)
symrk (n=4)
ccamk (n=4)
nsp1 (n=4)
nsp2 (n=4)
Genotype



FDR: 2.787e−05
Coefficient: −1.18e+00
Value: symrk
G8_LjRoot126
4000
3000
2000
1000
WT (n=4)
symrk (n=4)
ccamk (n=4)
nsp1 (n=4)
nsp2 (n=4)
Genotype


FDR: 3.907e−05
Coefficient: 1.52e+00
Value: symrk
G3_LjRoot129
6000
4000
2000
WT (n=4)
symrk (n=4)
ccamk (n=4)
nsp1 (n=4)
nsp2 (n=4)
Genotype



FDR: 3.907e−05
Coefficient: 1.54e+00
Value: ccamk
6000
4000
2000
G3_LjRoot129
WT (n=4)
symrk (n=4)
ccamk (n=4)
nsp1 (n=4)
nsp2 (n=4)
Genotype


FDR: 9.121e−05
Coefficient: −1.04e+00
Value: ccamk
G8_LjRoot126
4000
3000
2000
1000
WT (n=4)
symrk (n=4)
ccamk (n=4)
nsp1 (n=4)
nsp2 (n=4)
Genotype


FDR: 9.338e−05
Coefficient: 1.90e+00
Value: nsp1
G7_LjRoot117
500
400
300
200
100
WT (n=4)
symrk (n=4)
ccamk (n=4)
nsp1 (n=4)
nsp2 (n=4)
Genotype



FDR: 9.349e−05
Coefficient: 1.38e+00
Value: nsp2
G3_LjRoot129
6000
4000
2000
WT (n=4)
symrk (n=4)
ccamk (n=4)
nsp1 (n=4)
nsp2 (n=4)
Genotype



FDR: 1.752e−04
Coefficient: 1.12e+00
Value: ccamk
G2_LjRoot102
3000
2000
1000
WT (n=4)
symrk (n=4)
ccamk (n=4)
nsp1 (n=4)
nsp2 (n=4)
Genotype


FDR: 1.752e−04
Coefficient: 1.09e+00
Value: nsp1
LjRoot237
400
300
200
100
WT (n=4)
symrk (n=4)
ccamk (n=4)
nsp1 (n=4)
nsp2 (n=4)
Genotype


FDR: 1.802e−04
Coefficient: 1.11e+00
Value: nsp2
G2_LjRoot102
3000
2000
1000
WT (n=4)
symrk (n=4)
ccamk (n=4)
nsp1 (n=4)
nsp2 (n=4)
Genotype


FDR: 1.963e−04
Coefficient: −2.26e+00
Value: nsp1
LjRoot89
200
100
0
WT (n=4)
symrk (n=4)
ccamk (n=4)
nsp1 (n=4)
nsp2 (n=4)
Genotype


FDR: 4.214e−04
Coefficient: −9.87e−01
Value: ccamk
G21_LjRoot111
5000
4000
3000
2000
WT (n=4)
symrk (n=4)
ccamk (n=4)
nsp1 (n=4)
nsp2 (n=4)
Genotype



FDR: 4.495e−04
Coefficient: 9.80e−01
Value: nsp2
LjRoot237
400
300
200
100
WT (n=4)
symrk (n=4)
ccamk (n=4)
nsp1 (n=4)
nsp2 (n=4)
Genotype


FDR: 1.402e−03
Coefficient: −1.35e+00
Value: ccamk
G20_LjRoot162
4000
3000
2000
1000
WT (n=4)
symrk (n=4)
ccamk (n=4)
nsp1 (n=4)
nsp2 (n=4)
Genotype


FDR: 1.634e−03
Coefficient: 1.01e+00
Value: nsp1
G3_LjRoot129
6000
4000
2000
WT (n=4)
symrk (n=4)
ccamk (n=4)
nsp1 (n=4)
nsp2 (n=4)
Genotype

Bacterial order

s Flavobacteriales Rhizobiales
s Pseudomonadales Sphingomonadales


Differencial abundanc
in mutants
Rhizo–
sphere
Root
symrk
ccamk
nsp1
nsp2
symrk
ccamk
nsp1
nsp2
Relative abundance mutant vs. W
Depleted
Non−significant



Lotus
Mean relative abundance in WT
Rhizo–sphere
Root
Nod–ules
0.3
0.2
0.1
0.0
0.50
0.25
0.00


Lotus
Mean relative abundance in WT
Root
Differencial abundance in mutants
symrk
ccamk
nsp1
nsp2
0.0
0.1
0.2
0.3
0.00
0.25
0.50



Lotus
Mean relative abundance in WT
Differencial abundance in mutants
Root
symrk
ccamk
nsp1
nsp2
0.0
0.1
0.2
0.3
0.00
0.25
0.50