
FDR: 1.470e−03
Coefficient: 3.04e+00
Value: nsp1
12500
10000
7500
5000
2500
0
P4_A8
WT (n=6)
symrk (n=6)
ccamk (n=6)
nsp1 (n=6)
nsp2 (n=6)
Genotype


Differencial abundance in mutants
Mean relative abundance in WT
Root
Rhizosphere
Nodules
Root
Rhizosphere
symrk
cerk1
nsp2
0.0
0.5
1.0
0.0
0.3
0.6
0.0
0.3
0.6
Lotus

Hordeum


P1_E8
P2_C12
P2_H12
P4_B10
P4_B11
P4_H7
P5_A1
P5_B10
P2_B1
P4_E5
P4_A8
P2_E3
P4_F10
P5_C5
P1_A1
P1_D2
P1_A8
P1_A9
P2_A1
P2_B12
P2_D8
P2_E10
P2_G8
P3_A2
P4_G1
P4_H11
P5_C1
P2_H11
P3_C6
P4_G3
P1_D3
P4_B2
P5_A10


A
B
C
D
Lotus
Hordeum
Rhizosphere
Root
Enterobacterales
Pseudomonadales
Depleted
Non-significa


Shoot fresh weight/plant (g)
Lotus
Hordeum
0.05
0.04
0.03
0.02
0.01
0.00
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0
c
a
bc
ab
bc
b
ab
c
ac
ac
WT
symrk
ccamk
nsp1
nsp2


A
B
C
D
Lotus
Hordeum
Rhizosphere
Root
Enterobacterales
Pseudomonadales
Depleted
Non-significa