


ПРАКТИЧНИЙ КУРС

# Баланс на тарілці

Як скласти повноцінну їжу без ваг,  
підрахунку калорій і суворих заборон

Посібник для повсякденного життя · 2026



# Як користуватися курсом

Вам не потрібно змінювати все харчування за один день. Прочитайте посібник один раз, а потім оберіть один прийом їжі та застосуйте до нього формулу тарілки.

1

## Подивітьсяся

Що вже є на тарілці? Не оцінюйте — просто назвіть компоненти.

2

## Додайте

Чого бракує для балансу: овочів, білка, гарніру чи жирів?

3

## Перевірте

Як змінюються ситість, енергія та задоволення після їжі?

## Головна ідея

Збалансована тарілка — орієнтир, а не іспит. Пропорції можуть змінюватися залежно від апетиту, активності, доступних продуктів і контексту.

## М'який план на 7 днів

- ✓ **Дні 1–2:** спостерігайте за звичними тарілками, нічого не змінюючи.
- ✓ **Дні 3–4:** додавайте овочі або фрукти до одного прийому їжі.
- ✓ **Дні 5–6:** перевірте джерело білка та розмір гарніру.
- ✓ **День 7:** складіть три варіанти тарілки з продуктів, які любите.

**Важливо.** Матеріал має освітній характер і не замінює персональної консультації лікаря або дієтолога. У разі захворювань ШКТ, нирок, діабету, алергій, вагітності або призначеної лікувальної дієти дотримуйтеся рекомендацій фахівця.

# Чому повноцінна їжа насичує

Ситість — це не лише об'єм їжі. На неї впливають склад, смак, темп прийому їжі, сон, стрес і час від попереднього прийому їжі.

## Білок

Допомагає довше зберігати ситість і бере участь в оновленні тканин. Джерела: риба, м'ясо, яйця, молочні продукти, бобові, тофу.

## Клітковина

Додає об'єму та підтримує травлення. Джерела: овочі, фрукти, бобові, цільні крупи, насіння.

## Вуглеводи

Основне доступне джерело енергії. Перевага цільним продуктам не означає заборону хліба, пасти чи десертів.

## Жири

Допомагають засвоювати жиророзчинні вітаміни й роблять їжу смачнішою. Важливі помірність і різноманіття джерел.

## Чому «салат і кава» часто не працюють

У салаті може бути багато об'єму, але мало енергії та білка. Невдовзі організм закономірно попросить ще їжі. Це не брак сили волі — це недостатньо повноцінний прийом їжі.

об'єм  
і клітковина

+


білок

+

енергія  
з гарніру

**Практика.** Після наступного прийому їжі оцініть ситість через 30 хвилин і через 2–3 години за шкалою від 1 до 10. Не прагніть «правильної» цифри — збирайте спостереження.

# Формула $\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{4}$



## $\frac{1}{2}$ овочі

Свіжі, запечені, тушковані, заморожені — спосіб не принциповий. Частину можна замінити фруктами.

## $\frac{1}{4}$ білок

Порція приблизно з долоню — лише візуальний орієнтир, а не сувора норма.

## $\frac{1}{4}$ гарнір

Крупи, картопля, паста, хліб, кукурудза. За високої активності порція може бути більшою.

### Плюс до тарілки

**Жири:** олія, горіхи, насіння, авокадо, сир або жирна риба. **Напій:** вода за спрагою. **Смак:** спеції, соуси й улюблені добавки допомагають отримувати задоволення та дотримуватися звички.

Формула описує середні пропорції, а не обов'язкову геометрію кожної страви. Суп, рагу, пасту або сендвіч можна подумки розкласти на ті самі компоненти.

# Конструктор продуктів

| Овочі та фрукти                              | Білок                               | Гарнір                                | Жири та смак                       |
|----------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| Броколі<br>Цвітна капуста<br>Морква          | Курка<br>Індичка<br>Пісна яловичина | Гречка<br>Вівсянка<br>Булгур          | Оливкова олія<br>Горіхи<br>Насіння |
| Помідори<br>Огірки<br>Перець                 | Риба<br>Морепродукти<br>Яйця        | Рис<br>Кіноа<br>Кускус                | Авокадо<br>Тахіні<br>Песто         |
| Капуста<br>Буряк<br>Гарбуз                   | Кисломолочний сир<br>Йогурт<br>Сир  | Картопля<br>Батат<br>Кукурудза        | Сметана<br>Сир<br>Йогуртовий соус  |
| Заморожені суміші<br>Квашені овочі<br>Зелень | Сочевиця<br>Квасоля<br>Нут          | Цільнозерновий хліб<br>Паста<br>Лаваш | Хумус<br>Оливки<br>Насіння льону   |
| Яблука<br>Ягоди<br>Цитрусові                 | Тофу<br>Темпе<br>Соевий фарш        | Перлова крупа<br>Пшоно<br>Хлібці      | Гірчиця<br>Соевий соус<br>Спеції   |

## Заморожене — нормально

Овочі, ягоди та риба з морозилки заощаджують час і залишаються повноцінною частиною раціону.

## Консерви — також

Квасоля, нут, тунець, кукурудза й томати без складного готування допомагають скласти їжу за хвилини.

## Моя базова п'ятірка

Запишіть по одному продукту з кожної категорії, який легко придбати й приємно їсти.

---



---



---

# Сніданок і перекуси

Зранку не обов'язково їсти «сніданкові» продукти. Працює та сама логіка: джерело білка + вуглеводи + овочі або фрукти + трохи жиру.

## Солодкий сніданок

Вівсянка + густий йогурт + ягоди + горіхи. Білок і жири роблять кашу ситнішою.

## Солоний сніданок

Яйця + хліб + овочі + авокадо. Розмір порцій визначаєте за апетитом.

## За 2 хвилини

Кисломолочний сир або йогурт + банан + мюслі + насіння. Підходить і як перекус.

## У дорогу

Сендвіч з індичкою або хумусом + овочі + фрукт. Зручно скласти заздалегідь.

## Коли потрібен перекус

- ✓ Між основними прийомами їжі велика перерва.
- ✓ Попереду тренування або активний день.
- ✓ Попередній прийом їжі був невеликим.
- ✓ Ви відчуваєте фізичний голод — це вже достатня причина.

## Формула ситного перекусу

Оберіть 2 компоненти: **вуглеводи або фрукт + білок чи жир**.

Приклади: яблуко + горіхи; хлібці + кисломолочний сир; банан + йогурт; овочі + хумус.

**Кава — напій, а не прийом їжі.** Якщо зранку немає апетиту, почніть із невеликого варіанта й поспостерігайте, як це впливає на вечірній голод.

# 30 поєднань без рецепта

## З птицею та м'ясом

1. Курка + гречка + овочевий салат
2. Індичка + рис + запечені овочі
3. Тефтелі + картопля + капустяний салат
4. Яловичина + булгур + овочі гриль
5. Курка + паста + броколі
6. Лаваш + індичка + овочі + соус

## З рибою та яйцями

7. Лосось + кіноа + зелений салат
8. Тунець + картопля + овочі
9. Біла риба + рис + стручкова квасоля
10. Омлет + хліб + томати
11. Яйця + гречка + огірки
12. Креветки + кускус + овочі

## Без м'яса

13. Сочевиця + рис + салат
14. Нут + булгур + печений перець
15. Тофу + локшина + овочева суміш

## Без м'яса — продовження

16. Квасоля + картопля + капуста
17. Фалафель + піта + овочі + тахіні
18. Кисломолочний сир + хліб + овочі + оливки

## Максимально швидко

19. Тунець + хліб + овочева нарізка
20. Хумус + лаваш + овочі + яйце
21. Заморожені овочі + рис + тофу
22. Квасоля з банки + кускус + томати
23. Готова курка + хліб + салатний мікс
24. Йогурт + вівсянка + фрукт + горіхи

## Знайомі страви

25. Борщ + м'ясо/квасоля + хліб
26. Паста болоньезе + салат
27. Плов + велика порція овочів
28. Вареники + кисломолочний сир/йогурт + салат
29. Сирники + йогурт + ягоди
30. Суп + сендвіч із білковою начинкою

**Не потрібно готувати чотири окремі страви.** Компоненти можуть бути змішані: у супі, рагу, боулі, пасті або сендвічі. Перевіряйте загальну картину.

# Покупки без зайвого

Зручний запас важливіший за ідеальне меню. Оберіть 2–3 продукти з кожної групи — цього достатньо для десятків комбінацій.

## Завжди вдома

- ✓ 2 крупи або паста
- ✓ Бобові або риба в банці
- ✓ Заморожені овочі
- ✓ Олія, горіхи або насіння
- ✓ Спеції та улюблений соус

## Купувати раз на тиждень

- ✓ 2–3 свіжі овочі
- ✓ Фрукти або ягоди
- ✓ Яйця та/або молочні продукти
- ✓ Риба, птиця, м'ясо або тофу
- ✓ Хліб або лаваш

## Мій список

| Овочі та фрукти | Білок | Гарнір | Додатки |
|-----------------|-------|--------|---------|
|                 |       |        |         |

**Спочатку використовуйте те, що вже є.** Перед магазином зазирніть у холодильник і морозилку. Плануйте страви навколо продуктів, які потрібно з'їсти раніше.

# Баланс поза домом

## У кафе

Шукайте страву зі зрозумілим джерелом білка й гарніром. Овочі можна замовити салатом або гарніром окремо.

## Доставка

До піци додайте салат; до супу — сендвіч або білкову закуску; до суші — едамаме або салат.

## У подорожі

Поеднуйте доступне: йогурт + банан + горіхи; сендвіч + овочі; сир + хліб + фрукт.

## У гостях

Ви не зобов'язані складати ідеальні пропорції. Оберіть те, чого хочеться, додайте доступні овочі й зупиніться на комфортній ситості.

## Метод «додати, а не заборонити»

| Якщо хочеться... | Можна додати...                                                                         |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Піцу             | Салат або овочеву нарізку; за бажання — білкову закуску                                 |
| Пасту            | Курку, тунця, бобові або сир + овочі                                                    |
| Картоплю         | Рибу, яйця або м'ясо + салат                                                            |
| Десерт           | Нічого обов'язкового. Їжте його із задоволенням; якщо голодні — спочатку повноцінну їжу |

## Правило одного рішення

Не намагайтеся одночасно обрати «найкорисніше», мінімальну калорійність та ідеальний розмір порції. Запитайте: «Як зробити цей прийом їжі трохи повноціннішим?»

# Голод, ситість і гнучкість

Формула тарілки допомагає зі структурою, але не замінює сигналів тіла. Ваш апетит закономірно змінюється щодня.

| Рівень                | Як може відчуватися                                       | Що можна зробити                                                            |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 1–2<br>сильний голод  | Слабкість, дратівливість, складно обирати й їсти повільно | Поїсти якомога швидше; не вимагати від себе ідеального рішення              |
| 3–4<br>помірний голод | Порожнеча в шлунку, думки про їжу, зниження концентрації  | Зручний момент для повноцінного прийому їжі                                 |
| 5–6<br>нейтрально     | Комфорт, їжа не займає уваги                              | Можна продовжити справи або завершити їжу                                   |
| 7–8<br>ситість        | Задоволення, відчуття наповненості без важкості           | Комфортна точка завершення для багатьох, але не сувора мета                 |
| 9–10<br>переповнення  | Важкість, сонливість, дискомфорт                          | Не компенсувати голодуванням; зробити висновок із контексту й рухатися далі |

## Їжте достатньо

Систематичне недоїдання посилює думки про їжу та ймовірність переїдання пізніше.

## Залишайте місце задоволенню

Смак — повноцінна частина харчування. Задоволеність допомагає завершити прийом їжі.

**Спостереження замість оцінки.** «Я переїла, бо довго не їла» корисніше, ніж «у мене немає сили волі». Перше дає інформацію на наступний раз.

# Мій тиждень без жорсткого меню

Плануйте не рецепти, а комбінації. Залиште 1–2 вікна для доставки, залишків або спонтанного вибору.

| День | Основна комбінація | Швидкий запасний варіант |
|------|--------------------|--------------------------|
| Пн   |                    |                          |
| Вт   |                    |                          |
| Ср   |                    |                          |
| Чт   |                    |                          |
| Пт   |                    |                          |
| Сб   |                    |                          |
| Вс   |                    |                          |

## Мініпідготовка на 45 хвилин

Зваріть одну крупу, підготуйте одне джерело білка, вимийте овочі, змішайте соус. Не обов'язково готувати всю їжу заздалегідь — достатньо скоротити кількість рішень.

# Якого розміру може бути тарілка

Формула  $\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{4}$  показує співвідношення компонентів, але не визначає одну правильну кількість їжі для всіх.

## 18–20 см

### Мала тарілка

Може підійти для перекусу, невеликого сніданку або коли апетит нижчий, ніж зазвичай.

## 22–25 см

### Основна тарілка

Зручний стартовий орієнтир для обіду чи вечері. Метод CDC/ADA часто демонструють на тарілці близько 9 дюймів — приблизно 23 см.

## 26+ см

### Велика тарілка

Пропорції залишаються тими самими, але не обов'язково заповнювати тарілку до країв.

## Розмір — лише відправна точка

- ✓ **Апетит:** у дні з більшим голодом порція закономірно може бути більшою.
- ✓ **Активність:** після тренування або фізичної роботи часто потрібно більше гарніру та/або білка.
- ✓ **Вік і стан здоров'я:** дітям, вагітним, літнім людям та людям із захворюваннями потрібен індивідуальний підхід.
- ✓ **Форма страви:** для супу, боулу чи пасти важливі компоненти, а не діаметр посуду.

**Не зменшуйте посуд, щоб обманути голод.** Почніть із комфортної порції, їжте без поспіху та за потреби візьміть добавку. Сигнали тіла важливіші за сантиметри.

# Чи існують «несумісні» продукти

Для більшості здорових людей немає універсальної заборони поєднувати білки з вуглеводами, фрукти з іншою їжею або молочні продукти з рибою.

## Міф

«Шлунок не може одночасно перетравити різні типи продуктів».

## На практиці

Травна система пристосована до змішаних страв. Саме так виглядає більшість звичайних прийомів їжі.

## Що справді може викликати симптоми

| Ситуація                              | Можлива причина                                              | Що робити                                                                       |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Молочне викликає гази або діарею      | Можлива непереносимість лактози                              | Вести щоденник симптомів і звернутися до лікаря; не виключати всю групу навання |
| Бобові або капуста спричиняють здуття | Ферментація окремих вуглеводів і різке збільшення клітковини | Почати з меншої порції, збільшувати поступово                                   |
| Реакція на конкретний продукт         | Індивідуальна непереносимість, алергія або захворювання ШКТ  | Фіксувати продукт, кількість і симптоми; обговорити з фахівцем                  |

## Не плутайте непереносимість та алергію

Непереносимість частіше пов'язана з травними симптомами. набряк губ, язика чи горла, утруднене дихання або генералізована кропив'янка можуть бути ознаками тяжкої алергічної реакції та потребують невідкладної допомоги.

Без підтвердженого діагнозу не починайте сувору безглютенову, безлактозну або low-FODMAP дієту самостійно: зайві обмеження можуть збіднити раціон.

# Що їсти перед сном

Їжа після певної години не стає автоматично «шкідливою». Важливі ваш голод, розмір порції, час до сну та індивідуальні симптоми.

## Якщо ви просто голодні

Оберіть невелику, знайому й комфортну їжу. Не потрібно лягати спати голодними через правило «не їсти після 18:00».

**Приклади:** йогурт і банан; тост із сиром; вівсянка; яйце з хлібом; кисломолочний сир із ягодами.

## Якщо є печія або рефлюкс

Намагайтеся завершити основний прийом їжі щонайменше за 3 години до того, як лягати. Після їжі залишайтеся у вертикальному положенні.

Ваші тригери можуть відрізнятися: часто симптоми пов'язують із жирною чи гострою їжею, алкоголем, кавою, шоколадом, м'ятою, цитрусовими або томатами.

## Що частіше спричиняє дискомфорт уночі

- ✓ дуже велика порція безпосередньо перед сном;
- ✓ багато жирної або смаженої їжі — вона може посилювати відчуття переповнення;
- ✓ велика кількість газованих напоїв, алкоголю чи кофеїну;
- ✓ продукти, на які саме у вас уже була повторювана реакція;
- ✓ швидка їжа, розмова під час їжі та заковтування повітря.

**Не створюйте універсальний чорний список.** Якщо симптом повторюється, запишіть час, продукт, порцію та самопочуття. Так легше знайти особистий тригер разом із лікарем або дієтологом.

# Здуття: що може допомогти

Невелике газоутворення після їжі є нормальним. Здуття може виникати через заковтування повітря, закреп, особливості травлення або ферментацію вуглеводів бактеріями кишківника.

1

## Їжте повільніше

Сядьте, добре пережовуйте, не пийте через соломинку та не розмовляйте постійно під час жування.

2

## Зменште порцію

Спробуйте менші прийоми їжі замість однієї дуже великої порції, особливо ввечері.

3

## Рухайтеся

Регулярна активність і спокійна прогулянка після їжі можуть підтримувати травлення.

## Продукти, які можуть підсилювати газоутворення у деяких людей

Бобові, броколі, цвітна та білокачанна капуста, цибуля, деякі фрукти, молочні продукти за непереносимості лактози, цільнозернові продукти, газовані напої та підсолоджувачі на «-ол» — сорбітол, ксилітол, еритритол.

## Не прибирайте все одразу

Змінюйте один фактор за раз. Клітковину збільшуйте поступово, бобові починайте з малої порції, консервовані — промивайте.

## Ведіть щоденник 7–14 днів

Записуйте їжу, кількість, швидкість прийому, стрес, випорожнення та симптоми. Один випадок ще не доводить причинний зв'язок.

**Зверніться до лікаря**, якщо здуття часте, сильне або не минає; супроводжується ненавмисним схудненням, кров'ю у випорожненнях, повторним блюванням, тривалою діареєю чи закрепом, температурою або відчутною припухлістю живота. Раптовий сильний біль, блювання кров'ю, неможливість випустити гази чи випорожнитися потребують невідкладної оцінки.

# На чому ґрунтуються рекомендації

Розділи про розмір тарілки, рефлюкс, газоутворення та здуття підготовлені за матеріалами офіційних медичних організацій.

## 1. CDC — Plate Method

Візуальний метод  $\frac{1}{2}$  овочів +  $\frac{1}{4}$  білкових продуктів +  $\frac{1}{4}$  зернових і крохмалистих продуктів.

[cdc.gov/diabetes/professional-info/pdfs/toolkits/activities-guide-508.pdf](https://cdc.gov/diabetes/professional-info/pdfs/toolkits/activities-guide-508.pdf)

## 2. NIDDK — Gas in the Digestive Tract

Причини газоутворення, індивідуальні харчові тригери, звички під час їжі та щоденник симптомів.

[niddk.nih.gov/health-information/digestive-diseases/gas-digestive-tract/eating-diet-nutrition](https://niddk.nih.gov/health-information/digestive-diseases/gas-digestive-tract/eating-diet-nutrition)

## 3. NIDDK — Eating, Diet & Nutrition for GERD

Рекомендація завершувати їжу щонайменше за 3 години до сну за наявності нічних симптомів рефлюксу.

[niddk.nih.gov/health-information/digestive-diseases/acid-reflux-ger-gerd-adults/eating-diet-nutrition](https://niddk.nih.gov/health-information/digestive-diseases/acid-reflux-ger-gerd-adults/eating-diet-nutrition)

## 4. NHS — Bloating

Поширені причини здуття, самопомога та симптоми, за яких потрібна медична оцінка.

[nhs.uk/symptoms/bloating/](https://nhs.uk/symptoms/bloating/)

**Дата перевірки джерел: липень 2026 року.** Рекомендації можуть оновлюватися. Цей курс є освітнім матеріалом і не встановлює діагноз.

# Ваш особистий план

Оберіть зміни, які реально повторювати. Стале «достатньо добре» корисніше за рідкісний ідеал.

## 3 улюблені тарілки

---



---



---

## 3 швидкі варіанти

---



---



---

## Одна дія на цей тиждень

Наприклад: додавати овочі до обіду; тримати в морозилці овочеву суміш; не пропускати сніданок у робочі дні.

---



---

## КОРОТКА ПЕРЕВІРКА ТАРИЛКИ

- |                                                                             |                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Чи є овочі або фрукти?                  | <input checked="" type="checkbox"/> Чи є трохи жирів?                 |
| <input checked="" type="checkbox"/> Чи є помітне джерело білка?             | <input checked="" type="checkbox"/> Чи достатньо їжі для мого голоду? |
| <input checked="" type="checkbox"/> Чи є джерело енергії — гарнір або хліб? | <input checked="" type="checkbox"/> Чи подобається мені те, що я їм?  |

Баланс — це не пункт призначення.  
Це спосіб піклуватися про себе щодня.