


PRODUTIVIDADE

Melhor desempenho após o uso simultâneo das vacinas Porcilis® M1 ID e Porcilis® PCV ID

Em duas provas de campo na Hungria foram realizadas vacinações contra Circovirose Suína (PCV2) e Pneumonia Enzoótica (*M. hyopneumoniae* - Mhyo) com as vacinas Porcilis® M1 ID e Porcilis® PCV ID em leitões com 3 semanas de idade. O ganho de peso médio diário (GPD) superior entre 44 e 59 gramas (g) / dia (d) na fase de crescimento e terminação foi significativamente melhor.⁷



3.120 LEITÕES LACTENTES

Estudo A: 1.810 leitões

Estudo B: 1.322 leitões

Granjas positivas para Circovirose e Pneumonia Enzoótica



PROTOCOLO DE VACINAÇÃO

Grupo PCV – Vacinados com Porcilis® PCV ID -
intradérmica e sem agulhas com o dispositivo IDAL®.

Grupo PM – Vacinados concomitantemente com
Porcilis® M1 ID e Porcilis® PCV ID -
intradérmica sem agulhas com o dispositivo IDAL®.

Grupo M – Vacinados com Porcilis® M1 ID -
intradérmica, dose única de 0,2 mL.

(Grupo M presente somente no Estudo B).

Grupo C – Controle, não vacinados.

FIGURA 1: Alta performance durante a fase de creche.




FIGURA 2: Aumento do GPD ao longo de todo o período do estudo.

