




DẪN CHẤT SESQUITERPEN




Caryophyllen



Elemen



zingiberen




Patchouli alcol

- ▣ Gừng
- ▣ Nghệ
- ▣ Hoắc hương
- ▣ Thanh cao hoa vàng

Gừng (*Zingiber officinale*)

- Tên khoa học
 - ▣ *Zingiber officinale* Rosc., họ Gừng
- Đặc điểm TV
 - ▣ Cây thảo sống lâu năm.
 - ▣ Lá mọc so le, không cuống, hình mác.
 - ▣ Hoa màu vàng, mọc từ gốc
 - ▣ Thân rễ mập thành củ.
- Phân bố
 - ▣ Được trồng ở Việt Nam và nhiều nước trên Thế giới.



GỪNG - Zinger

□ Bộ phận dùng

- ▣ Gừng tươi (Sinh khương)
- ▣ Gừng non chế biến
- ▣ Gừng khô (Can khương)
- ▣ Tinh dầu gừng (Ginger oil)
- ▣ Nhựa dầu gừng



□ Dược liệu

- ▣ Chứa tinh dầu (2-3%), nhựa dầu (4,2-6,5%), chất béo (3%), chất cay: zingeron, zingerol, shagaol
- ▣ Tinh dầu chứa các sesquiterpen, một số monoterpene như geraniol, linalool

□ Công dụng

- ▣ Gừng tươi: làm gia vị, chế biến mứt gừng, gừng non chế biến, trà gừng...
- ▣ Gừng khô, tinh dầu và nhựa dầu gừng làm gia vị, làm chất thơm trong thực phẩm và đồ uống

Sử dụng theo YHCT

- ▣ Sinh khương: nhóm thuốc tân ôn giải biểu
- ▣ Can khương: nhóm thuốc ôn trung khứ hàn.
- ▣ Can khương sao cháy có tác dụng chỉ huyết do hư hàn

Nghệ (*Curcuma longa*)

- Tên khoa học
 - ▣ *Curcuma longa* L., họ Gừng
- Đặc điểm TV
 - ▣ Cây thảo sống lâu năm.
 - ▣ Lá đơn mọc từ thân rễ, bẹ lá cuộn thành thân.
 - ▣ Cụm hoa màu lục hoặc trắng nhạt.
 - ▣ Củ màu vàng
- Phân bố
 - ▣ Được trồng ở Việt Nam và nhiều nước trên Thế giới.






NGHỆ - Tumeric

□ Bộ phận dùng

- ▣ Thân rễ tươi hoặc khô (turmeric)
- ▣ Tinh dầu Nghệ - turmeric oil
- ▣ Nhựa dầu Nghệ - turmeric oleoresin
- ▣ Curcumin



Curcumin



© 2009 HEALTHY PUBLISHER

Curcumin I, II, III

□ Công dụng

- ▣ Nghệ: chống viêm, chữa đau dạ dày, lành vết loét
- ▣ Tinh dầu, nhựa dầu nghệ làm gia vị, chất màu thực phẩm.
- ▣ Curcumin chống oxy hóa



Tinh bột Nghệ



Bột Nghệ

Hoắc hương (*Pogostemon cablin*)

- Tên khoa học
 - ▣ *Pogostemon cablin* (Blanco) Benth., họ Bạc hà
- Đặc điểm TV
 - ▣ Cây thảo sống lâu năm, thân vuông.
 - ▣ Lá mọc đối cuống dài
 - ▣ Hoa mọc thành xim ở tận cùng hoặc kẽ lá.
- Phân bố
 - ▣ Được trồng ở Việt Nam, Đông nam Á và Trung quốc.




THANH CAO HOA VÀNG (*Artemisia annua*)

- Tên khoa học
 - ▣ *Artemisia annua* L., họ Cúc
- Đặc điểm TV
 - ▣ Cây thảo, sống hàng năm
 - ▣ Lá xẻ lông chim 2 lần thành dải hẹp
 - ▣ Hoa màu vàng, mọc thành cụm hình cầu, tập hợp thành chùm kép
- Phân bố
 - ▣ Được trồng ở Việt Nam, Trung Quốc, Nga và cả Bắc Mỹ.



- Bộ phận dùng
 - ▣ Lá đã phơi khô
- Thành phần hóa học
 - ▣ Tinh dầu: 0,4-0,6% (đa số là các sesquiterpen)
 - ▣ Sesquiterpenlacton:




Artemisinin

Gđ phát triển	% artemisinin /lá
Cây xanh	0,06
Bắt đầu ra nụ	1,6
Ra nụ	1,2
Hoa nở	1,0



□ Công dụng

- ▣ Lá và cuống hoa chữa sốt cao, giải độc (Lạng Sơn)
- ▣ Lá Thanh cao hoa vàng thanh nhiệt, bổ dạ dày, cầm máu, lợi mật. YHCT TQ chữa sốt rét (phối hợp với vảy Tê tê).
- ▣ Artemisinin có tác dụng diệt KST sốt rét, đặc biệt sốt rét ác tính → chỉ dùng cho các thuốc chống SR khác bị kháng, dùng đủ liều.



<u>Derivative</u>	<u>R</u>
Artemether	methyl
Arteether	ethyl
Artesunate	$-O-CO-CH_2CH_2-COO^-$
Artelinic Acid	$-O-CH_2-(p\text{-phenyl})-COOH$

DẪN CHẤT BENZENOID



- Các benzenoid
 - ▣ Eugenol (Đinh hương, Hương nhu trắng)
 - ▣ Anethol (Đại hồi)
 - ▣ Aldehyd cinnamic (Quế)

ĐINH HƯƠNG (*Syzygium aromaticum*)


- Tên khoa học
Syzygium aromaticum, họ Sim
Myrtaceae
- Đặc điểm TV
 - ▣ Cây gỗ nhỡ cao 10-12m
 - ▣ Lá bầu dục, đầu nhọn, không rụng
 - ▣ Hoa tập hợp thành xim nhỏ ở đầu cành, tràng màu trắng hồng.
- Phân bố: gốc Indonesia, trồng ở Srilanka, Việt nam

Eugenol (Đinh hương, Hương nhu trắng, Hương nhu tía, Nhân trần, É lớn tròn...)



□ Bộ phận dùng

- ▣ Nụ hoa, cuống hoa, lá
- ▣ Tinh dầu



□ Dược liệu

- ▣ Nụ hoa: 15-20 % tinh dầu
- ▣ Cuống hoa: 5-6,5 %
- ▣ Lá: 1,6-4,5 %
- Tinh dầu: Clove oil cất từ nụ, cuống hoa và lá
Eugenol (78-95 %)



□ Công dụng

▣ Nụ hoa:

Kích thích tiêu hóa, sát khuẩn, giảm đau (tây y và đông y).

Thuốc YHCT: ấm tỳ vị, giáng khí nghịch: chữa nấc, nôn, đau bụng lạnh

Nụ hoa Đinh hương làm gia vị/ thực phẩm

- Dạng cồn thuốc, sắc, ngâm rượu

▣ Tinh dầu Đinh hương:

Làm thuốc sát khuẩn, diệt tủy răng, chế Zn eugenat hàn răng

▣ Công thức bột cari

- 10g Đại hồi
- 10g Đinh hương,
- 20g hạt Mùi khô,
- 50g Nghệ bột
- 10g Quế chi,
- 20g Ớt khô

Rang thơm nghiền thành bột mịn

ĐẠI HỒI (*Illicium verum*)

144

□ Tên khoa học

Illicium verum Hook. f.,
họ Hồ Illiciaceae

□ Đặc điểm TV

- Cây cao 6-10m, mọc thẳng, tán hẹp
- Lá mọc so le, thon dài
- Hoa nhiều màu trắng, hồng, tím
- Quả đại, 8 đại hình sao

anethol (Đại hồi, Tiểu hồi, Hồi nước)



□ Bộ phận dùng

- ▣ Quả
- ▣ Tinh dầu

- Quả: chứa 8-9 % tinh dầu

□ Tinh dầu: Star Anise oil

Trans-anethol (85-90%)

TD hồi Lạng sơn có chất lượng loại 1



Hồi núi (*I. graffithii*)

□ Công dụng

▣ Quả hồi:

Giúp tiêu hóa, giảm đau, lợi sữa.

Giảm co bóp nhu động ruột →
chữa ỉa chảy, nôn mửa, ăn không
tiêu.

Thuốc YHCT: nhóm ôn trung khứ
hàn

■ Dạng dùng bột, rượu thu

▣ Tinh dầu Hồi:

■ Có thể sử dụng như dược liệu

■ Nguyên liệu tổng hợp estrogen

Có thể dùng quả và tinh dầu
làm gia vị, hương liệu cho
thực phẩm.

▣ Tinh dầu Hồi làm dùng
trong sản xuất kem đánh
răng, xà phòng, thuốc lá

▣ Quả hồi chiết acid shikimic
bán tổng hợp Oseltamivir
(Tamiflu®)

QUẾ (*Cinnamomum* sp.)

147

- ▣ *C. cassia* Nees et Bl. Quế Việt nam, quế TQ
 - ▣ *C. zeylanicum* Gare et Bl. Quế Srilanka
-
- Đặc điểm TV
 - ▣ Cây gỗ, cao 10-20m, vỏ thân nhẵn
 - ▣ Lá mọc so le, cuống ngắn, có ba gân hình cung
 - ▣ Hoa trắng, mọc thành chùm xim ở kẽ lá hay đầu cành
 - ▣ Quả hạch hình trứng. Toàn cây có mùi thơm của quế



□ Bộ phận dùng

- ▣ Vỏ thân: Quế nhục
- ▣ Cành nhỏ: Quế chi
- ▣ Tinh dầu Quế (từ cành con và lá)



	Quế Việt nam	Quế Srilanka
V ỏ	TD: 1 - 3% Ald cinnamic: 70 - 95%	TD: 0,5 - 1% Ald cinnamic: 70% Eugenol: 4 - 10%
L á	TD: 0,14 - 1,04% Ald cinnamic: 50 - 80%	TD: 0,75% Eugenol: 70 - 90%



□ Công dụng

▣ Quế nhục:

- vị ngọt cay, đại nhiệt; có tác dụng bổ mệnh môn hỏa, thông huyết mạch, trừ hàn tích
- Điều trị mệnh môn hỏa suy, tạng phủ lạnh, tiêu hóa kém, đau đầy bụng

▣ Quế chi:

- Vị cay, tính ôn; có tác dụng tán hàn, thông kinh chỉ thống
- Điều trị các bệnh cảm lạnh không ra mồ hôi, tê thấp, chân tay đau buốt

▣ TD quế:

- Sát khuẩn
- Kích thích tiêu hóa
- Kích thích thần kinh: làm dễ thở và lưu thông tuần hoàn
- Kích thích nhu động ruột
- Chống chứng huyết khối
- Chống viêm, chống dị ứng