


Teoria dos Conjuntos

Douglas Santos
douglass@ufrj.br



Conteúdo

Teoria Axiomática [Conjuntos]	2
Teoria ZF	2
Linguagem	2
Axiomas	3
Axioma da extensão (ou da unicidade)	3
Axioma do vazio	4
Axioma do Par	5
Axioma da União	5
Axioma das Partes	5
Axioma da Separação	6
Axioma da regularidade	7
Conjuntos	7
Pertinência e Inclusão	7
União e Interseção	8
Conjunto universal	8
Fundamentos das relações	9
Par não ordenado	9
Par ordenado	9
Produto Cartesiano	10
Relações	11
Domínio, Contradomínio e Imagem	11
Função	12
Relação de equivalência	13
Classes de equivalência	14
Partição	15
Conjunto Quociente	16
Relação de ordem total (ou ordem linear)	16
Relação de complementaridade [Adicional]	17
Família Indexada	17
Matriz lógica	17
Referências	19

Teoria Axiomática [Conjuntos]

Teoria ZF

Condições estabelecidas da teoria:

1. Todos os objetos da teoria são conjuntos. Dizemos que *todos os elementos de conjuntos serão conjuntos*, e assim sucessivamente, mas paramos ao chegarmos no conjunto vazio.
2. Os objetos da teoria não comportarão átomos e nem conjuntos de todos os conjuntos (conjuntos universais), isto é, não comportarão *urelementos*.

A estrutura do método axiomático se estabelece da seguinte forma:

1. Linguagem
2. Axiomas
3. Teorema - consequência dos axiomas
4. Regras de inferência da *lógica clássica*

Linguagem

A linguagem é dividida em 3 segmentos

Variáveis Símbolos Fórmulas

a) Variáveis: Utilizado tanto letras minúsculas quanto maiúsculas para denotar conjuntos.

b) Símbolos:

$\forall x$: para todo conjunto x ...

$\exists x$: existe um conjunto x ...

\neg : negação de...

$\&$: e

\vee : ou (acomete uma disjunção)

\rightarrow : se... então (condicional)

\leftrightarrow : se e somente se (bicondicional)

c) Fórmulas: Sequências de símbolos que satisfazem os seguintes itens

Se x e y são variáveis, então $x \in y$ e $x = y$ são fórmulas. *Fórmulas atômicas*;

Se A e B são fórmulas, então $\neg(A)$, $(A) \rightarrow (B)$, $(A) \& (B)$, $(A) \vee (B)$ e $(A) \leftrightarrow (B)$ também são;

Se A é uma fórmula e x uma variável, então $\forall x(A)$ e $\exists x(A)$ também são fórmulas;

Todas as fórmulas tem uma das formas descritas acima.

Exemplo 1. A análise da composição de fórmulas de

$$\exists B(\forall x(\neg(x \in B)))$$

se da por

- I. Existência da fórmula atômica $[(x \in B)]$.
- II. Uma outra fórmula está sendo a negação da fórmula atômica $[(\neg(x \in B))]$
- III. Fórmula quantificando a variável x em relação a negação da fórmula atômica $[\forall x()]$

Portanto, temos 3 fórmulas que são

$$\neg(x \in B), \quad \forall x(\neg(x \in B)) \quad \text{e} \quad \exists B(\forall x(\neg(x \in B))).$$

"Existe um objeto B tal que para todo objeto x, não é verdade que x pertence a B."

Observação (Fórmulas lógicas)

- **Ocorrência de variável:** cada aparecimento de uma variável. Sendo

$$x \in y \ \& \ \exists x(y = x)$$

temos duas ocorrências da variável y e duas^a ocorrências da variável x.

- **Escopo de uma variável:** uma variável y está no escopo de uma variável x se y aparece em uma fórmula do tipo $\forall x(\)$ ou $\exists x(\)$. Sendo

$$x \in y \ \& \ \exists x(y = x)$$

y está no escopo de x e x está no escopo de si mesmo.

- **Variável livre:** uma variável é livre se não está no escopo dela mesma. Sendo

$$x \in y \ \& \ \exists x(y = x)$$

x e y que estão fora da subfórmula são variáveis livres. y que está dentro da subfórmula é uma variável livre, mas, dentro da subfórmula, x não é uma variável livre por está dentro do próprio escopo.

^a Alguns autores colocam o x, em $\exists x$, como uma ocorrência.

Axiomas

- Axiomas que garantem a existência de certos conjuntos específicos

Axioma do vazio

Axioma do infinito

- Axiomas que nos permitem construir novos conjuntos

Axioma do par

Axioma da união

Axioma das partes

Axioma da escolha

Axioma da separação

Axioma da substituição

- Axiomas que dizem respeito ao "comportamento" dos conjuntos

Axioma da regularidade

Axioma da extensão

Axioma da extensão (ou da unicidade)

Proposição 1. Se dois conjuntos x e y possuem exatamente os mesmos elementos, então eles são iguais.

$$\forall x \forall y (\forall z (z \in x \leftrightarrow z \in y) \rightarrow x = y)$$

Exemplo 2. Se $x = \{1, 2, 3\}$, $y = \{3, 1, 2\}$ e $z = \{1, 1, 2, 3, 3, 3\}$, então $x = y = z$.

Axioma do vazio

Proposição 2. Existe um conjunto sem elemento algum.ⁱ

$$\exists x \forall y \neg (y \in x)$$

Utiliza-se \emptyset para denotar este conjunto do Axioma do vazio. Para isto, devemos assegurar que

- Existe um conjunto com tal propriedade;
- Esse conjunto é único (não pode-se atribuir o mesmo símbolo para duas coisas distintas).

Definição 1 (Relação de inclusão). Dizemos que x está contido em y e escrevemos $x \subseteq y$ se todo elemento de x é um elemento de y .

$$x \subseteq y \leftrightarrow \forall z (z \in x \rightarrow z \in y)$$

Com essa definição podemos reescrever o **Axioma da extensão**:

$$(A \subseteq B) \ \& \ (B \subseteq A) \rightarrow A = B$$

Ainda, temos $x \subset y$ para dizer que $x \subseteq y$ & $x \neq y$.

Teorema 1. O conjunto vazio está contido em qualquer conjunto.

$$\forall x (\emptyset \subseteq x)$$

Demonstração. Por contradição vamos supor que exista um conjunto x tal que o conjunto vazio não esteja contido em x e que existe y tal que y pertence ao conjunto vazio mas não a x . Com efeito:

$$\exists x (\emptyset \not\subseteq x) \ \& \ \exists y (y \in \emptyset \ \& \ y \notin x).$$

Temos uma contradição à própria definição de conjunto vazio. ■

Teorema 2. Existe um único conjunto vazio.

Demonstração. A existência é garantida pelo Axioma do vazio. Com efeito, supondo que existam conjuntos vazios x e y , com $x \neq y$. Pelo axioma da extensão deve então existir um elemento z tal que

$$\begin{aligned} z \in x \quad \text{mas} \quad z \notin y \quad \text{ou} \\ z \in y \quad \text{mas} \quad z \notin x. \end{aligned}$$

Em qualquer caso temos uma contradição com o fato de que x e y são vazios. ■

Observação (Relação de inclusão vs. Relação de pertinência)

- Todos os objetos da nossa teoria são conjuntos. Portanto, nas expressões $x \in y$ e $x \subseteq y$, tanto x quanto y são conjuntos;
 - Podem existir conjuntos cujos elementos são conjuntos.
- Supondo que exista o conjunto $\{\emptyset\}$, ou seja, um conjunto cujo único elemento é \emptyset .
- $\emptyset \in \{\emptyset\}$, isto é, \emptyset é elemento do conjunto $\{\emptyset\}$
 - $\emptyset \subseteq \{\emptyset\}$, de acordo com o Teorema 1.

ⁱPosteriormente, surgirá a necessidade de verificar a dispensabilidade desse axioma.

Axioma do Par

Proposição 3. Sejam x e y conjuntos quaisquer. Então existe um conjunto z tal que $x \in z$ e $y \in z$.

$$\forall x, y \exists z (x \in z \ \& \ y \in z)$$

Aqui, dizemos que z é um par não ordenado, pois, pelo axioma da extensão, os conjuntos $\{x, y\}$ e $\{y, x\}$ são iguais.

Exemplo 3. No caso em que $x = y$ temos $\{x, x\} = \{x\}$, pelo axioma da extensão.

Axioma da União

Proposição 4. Para todo conjunto A , existe um conjunto B cujos elementos são exatamente os elementos dos elementos de A .

B será denotado por $\bigcup_{x \in A} x$

- todo x , que é elemento de A , é subconjunto de B
- todo y , que é elemento de B , é elemento de algum elemento de A

Neste axioma temos também que

- Caso A seja um vazio, B será o conjunto vazio
- Caso A seja finito, B será uma união finita
- Caso A seja infinito, B será uma união infinita.

Definição 2. A união generalizada de um conjunto A é o conjunto formado pelos elementos dos elementos de A .

$$\forall A \exists B \forall x (x \in B \leftrightarrow \exists c (c \in A \ \& \ x \in c))$$

Exemplo 4. Seja um conjunto $A = \{\{1, 2\}, \{3, 4\}, \{5, 6\}\}$.

Então, a união generalizada se realiza como $\bigcup A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$.

O conjunto A possui 3 elementos que são conjuntos que possuem elementos que estão em A .

Axioma das Partes

Proposição 5. Para todo conjunto x , existe o conjunto y dos subconjuntos de x .

$$\forall x \exists y \forall z [z \in y \leftrightarrow z \subseteq x]$$

O conjunto definido pelo axioma também é único. Sendo assim, podemos definir o seguinte:

Definição 3. Definimos o *conjunto das partes* (*power set*), como o conjunto de todos os subconjuntos de x , e o denotamos por $\mathcal{P}(x)$.

Exemplo 5. Seja um conjunto $A = \{1, 2\}$.

Pelo axioma das partes,

$$(z \in \mathcal{P}(A) \leftrightarrow z \subseteq A)$$

$$\emptyset \subseteq A$$

$$\{1\} \subseteq A$$

$$\{2\} \subseteq A$$

$$\{1, 2\} \subseteq A.$$

Logo, $\mathcal{P}(A) = \{\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{1, 2\}\}$

Axioma da Separação

Queremos ser capazes de definir um conjunto através de uma fórmula lógica. Para evitar paradoxos, como o paradoxo de Russel, temos que especificar o conjunto sobre qual nossa fórmula será elaborada.

Proposição 6. Para cada fórmula $P(x)$, para todo conjunto y , existe o conjunto daqueles elementos que pertencem a y e satisfazem a fórmula P .

Exemplo 6. Seja um conjunto $y = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$.

$P(x) : x$ é par.

$Z = \{x : x \in y \text{ \& } P(x)\} = \{2, 4, 6, 8\}$

Definição 4. Para cada fórmula P tal que z não ocorre livre, a seguinte fórmula é um axioma:

$$\forall y \exists z \forall x [x \in z \leftrightarrow x \in y \text{ \& } P(x)]$$

"para todo y existe z tal que para todo x , x pertence a z sss x pertence a y e vale a fórmula $P(x)$."

O conjunto z será denotado

$$z = \{x : x \in y \text{ \& } P(x)\}$$

ou

$$z = \{x \in y : P(x)\}.$$

Por que z não pode ocorrer livre em P na fórmula

$$\forall y \exists z \forall x [x \in z \leftrightarrow x \in y \text{ \& } P(x)]?$$

Se permitirmos que a variável que define o conjunto ocorra livre em P , poderíamos tomar

$P(x) = x \notin z$:

$$\forall y \exists z \forall x [x \in z \leftrightarrow x \in y \text{ \& } x \notin z].$$

Tomando $y = \{\emptyset\}$ e $x = \emptyset$, temos que $x \in y$ é verdadeiro. Assim,

$$(x \in z \leftrightarrow x \notin z)$$

é uma contradição.

Interseção

Podemos utilizar o axioma da separação para definir a interseção de dois conjuntos.

Sejam A e B dois conjuntos. Então, pelo axioma da separação existe

$$z = \{x : x \in A \text{ \& } P(x)\}.$$

Tomando $P(x) = x \in B$, temos

$$z = \{x : x \in A \text{ \& } x \in B\} = A \cap B.$$

Diferença e conjuntos vazios

Da mesma forma, podemos definir a diferença entre dois conjuntos.

Sejam A e B dois conjuntos. Então, pelo axioma da separação existe

$$z = \{x : x \in A \text{ \& } P(x)\}.$$

Tomando $P(x) = x \notin B$, temos

$$z = \{x : x \in A \text{ \& } x \notin B\} = A - B.$$

Se tomarmos $P(x) = x \neq x$, obtemos o conjunto vazio.

Interseção arbitrária de conjuntos

Teorema 3. Dado um conjunto não vazio x , existe o conjunto $y = \bigcap x$, formado por todos os elementos que pertencem simultaneamente a todos os elementos de x .

$$\bigcap x = \{v : v \text{ pertence a todos os elementos de } x\}.$$

Exemplo 7. Seja um conjunto $x = \{\{1, 2, 3\}, \{2, 3, 4\}, \{2, 3, 4, 5\}\}$.

Existe o conjunto interseção: $\bigcap x = \{2, 3\}$. Formalmente, temos

$$y = \{v : v \in z \ \& \ \forall w(w \in x \rightarrow v \in w)\}.$$

Axioma da regularidade

Proposição 7. Para todo conjunto x não vazio existe $y \in x$ tal que $x \cap y = \emptyset$.

$$\forall x[x \neq \emptyset \rightarrow \exists y(y \in x \ \& \ x \cap y = \emptyset)].$$

Ou seja, esse axioma garante que não exista uma sequência infinita decrescente na relação de pertinência. Não há como ficar preso numa sequência infinita decrescente, pois certa hora irá encontrar o conjunto vazio.

Teorema 4. Não existem conjuntos x e y tais que $x \in y$ e $y \in x$.

Demonstração. Sejam x e y conjuntos quaisquer. Vamos demonstrar que ou $x \notin y$ ou $y \notin x$.

Pelo **axioma do par**, existe $B = \{x, y\}$ não vazio.

Pelo **axioma da regularidade**, $B \neq \emptyset \rightarrow \exists z(z \in B \ \& \ z \cap B = \emptyset)$.

Mas $z \in B$ implica que $z = x$ ou $z = y$.

Se $z = x$, então $z \cap B = x \cap B = \emptyset$, logo, $y \notin x$,

(pois caso contrário, o resultado da interseção conteria o y).

Se $z = y$, então $z \cap B = y \cap B = \emptyset$, logo, $x \notin y$. ■

Nota

A formulação dada por von Neumann (1925) em lógica de primeira ordem é seguida por

$$\forall A(\exists B(B \in A) \rightarrow \exists B(B \in A \wedge \neg \exists C(C \in A \wedge C \in B)))$$

Todo conjunto diferente do conjunto vazio possui um elemento que é totalmente disjunto dele. Sem esse axioma o comportamento possível de infundados conjuntos surgem. São denominados **hiperconjuntos**. Um comportamento típico seria $y \in y$, então y é um hiperconjunto. Em particular, não é adequado ter a violação desse axioma, apenas para versões da teoria dos conjuntos que possam se beneficiar disso.

Conjuntos

Pertinência e Inclusão

Quando um objeto (elemento) x pertence a um conjunto A :

$$x \in A$$

Dois conjuntos iguais, onde possuem exatamente os mesmos elementos (um dado conjunto está totalmente contido no outro) e dois conjuntos que possuem parcialmente os objetos do outro (um dado conjunto está parcialmente contido no outro):

$$A \subseteq B \iff A = B \quad (1)$$

$$A \subset B \iff A \neq B \quad (2)$$

(1) $\forall x; x \in A \ \& \ x \in B$.

(2) $x, y; ((x \in A) \ \& \ (x, y \in B)) \vee ((y \in A) \ \& \ (x, y \in B))$.

União e Interseção

A união $x \cup y$ dos conjuntos x e y é definida sendo o conjunto de todos os elementos de x e y .

Logo, $(x \cup x = x)$, $(x \cup y = y \cup x)$ e $((x \cup y) \cup z = x \cup (y \cup z))$. De modo geral, dados n conjuntos A_1, A_2, \dots, A_n a sua união é

$$\bigcup_{i=1}^n A_i = \{x \in U \mid x \in A_1 \text{ ou } x \in A_2 \text{ ou } \dots \text{ ou } x \in A_n.\}$$

A interseção $x \cap y$ é o conjunto dos objetos que x e y possuem em comum.

Logo, $x \cap x = x$, $x \cap y = y \cap x$ e $(x \cap y) \cap z = x \cap (y \cap z)$. De modo geral, a interseção dos conjuntos A_1, A_2, \dots, A_n é

$$\bigcap_{i=1}^n A_i = \{x \in U \mid x \in A_1, x \in A_2, \dots, x \in A_n.\}$$

Proposição 8 (Propriedade Associativa). $(x \cup y) \cup z = x \cup (y \cup z)$.

Demonstração. Tomemos os conjuntos A, B e C . Provemos que $(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$. $(A \cup B) \cup C = \{x \mid (P(x) \vee Q(x)) \vee R(x)\} = \{x \mid P(x) \vee (Q(x) \vee R(x))\} = A \cup (B \cup C)$. ■

Proposição 9 (Propriedade Comutativa). $x \cup y = y \cup x$.

Demonstração. Tomemos os conjuntos A e B .

Provemos que $A \cup B = B \cup A$.

$A \cup B = \{x \mid x \in A \vee x \in B\} = B \cup A$. ■

Proposição 10 (Propriedade Distributiva). $x \cup (y \cap z) = (x \cup y) \cap (x \cup z)$ ou $x \cap (y \cup z) = (x \cap y) \cup (x \cap z)$.

Demonstração. Tomemos os conjuntos A, B e C .

Provemos que $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$.

$$\begin{aligned} A \cup (B \cap C) &= \{x \mid P(x) \vee (Q(x) \wedge R(x))\} \\ &= \{x \mid (P(x) \vee Q(x)) \wedge (P(x) \vee R(x))\} \\ &= \{x \mid (P(x) \vee Q(x)) \cap (P(x) \vee R(x))\} \\ &= (A \cup B) \cap (A \cup C). \end{aligned}$$

■

Conjunto universal

Proposição 11. Não existe o conjunto universal na Teoria Zermelo-Fraenkel

Teorema 5. Não existe o conjunto universal.

Demonstração. Suponha por absurdo que V , um conjunto universal, exista. Isto é,

$$\exists V \forall x (x \in V).$$

Pelo **axioma da separação** definimos A :

$$A = \{x : x \in V \ \& \ x \notin x\}$$

Note que:

- Se $A \in A$, então $A \in V \ \& \ A \notin A$. (contradição)
- Se $A \notin A$, então $A \notin V$ ou $A \in A$. Mas não podemos ter $A \in A$.

Portanto, $A \notin V$, contrariando o fato de V ser universal. ■

Fundamentos das relações

Par não ordenado

Dados dois conjuntos x e y , vimos que o **axioma do par** nos garante a existência do conjunto

$$\{x, y\}.$$

Pelo **axioma da extensão**, temos

$$\{x, y\} = \{y, x\}.$$

Ou seja, a ordem dos objetos não é considerada.

Queremos definir agora um par ordenado, de tal modo que a ordem dos objetos seja levada em consideração, isto é, queremos que o par (a, b) seja diferente do par (b, a) .

Par ordenado

Definição 5. Dados dois conjuntos a e b , definimos o par ordenado (a, b) como o conjunto

$$\{\{a\}, \{a, b\}\}.$$

Observações

Quando $a = b$:

$$\{\{a\}, \{a, b\}\} = \{\{a\}, \{a, a\}\} = \{\{a\}, \{a\}\} = \{\{a\}\}.$$

A **existência do par ordenado** é garantida da seguinte forma: Dados dois conjuntos a, b :

- Pelo **axioma do par**, existe $\{a, a\}$, que é igual a $\{a\}$ pelo **axioma da extensão**.
- Pelo **axioma do par**, existe $\{a, b\}$.
- Pelo **axioma do par** novamente, existe $\{\{a\}, \{a, b\}\}$.

Teorema 6. $(u, v) = (x, y)$ se, e somente se, $u = x$ e $v = y$.

Demonstração. Da direita para a esquerda é trivial, ou seja, se substituir u pelo x e v pelo y , teremos a mesma ordenação.

Agora, supomos que $(u, v) = (x, y)$ ou $\{\{u\}, \{u, v\}\} = \{\{x\}, \{x, y\}\}$.

Pelo **axioma da extensão**, $\{u\} \in \{\{x\}, \{x, y\}\}$ e $\{u, v\} \in \{\{x\}, \{x, y\}\}$.

Temos quatro possibilidades:

- (a) $\{u\} = \{x\}$
- (b) $\{u\} = \{x, y\}$
- (c) $\{u, v\} = \{x\}$
- (d) $\{u, v\} = \{x, y\}$

i Se vale o caso (b), então $u = x = y$. Assim, observando (d), $v = y = x = u$ e (d) e (c) são equivalentes, e o teorema está desmonstrado.

ii Se vale (c), temos o mesmo caso.

iii Se vale (a), temos $u = x$.

Assim, observando (d), temos que

$$\{u, v\} = \{u, y\}.$$

Assim, pelo **axioma da extensão**, $y = u$ ou $y = v$.

No primeiro caso, caímos no (b), que é válido.

No segundo caso, temos o resultado solicitado $y = v$. ■

Observação

O teorema nos permite dizer que x é a primeira coordenada e y é a segunda coordenada do par ordenado (x, y) .

Produto Cartesiano

Definição 6. Suponha que temos dois conjuntos A e B e que formamos pares ordenados (x, y) em que x é um elemento de A e y é um elemento de B . O conjunto de todos os pares ordenados desse tipo é chamado de *produto cartesiano* de A e B :

$$A \times B = \{(x, y) : x \in A \text{ \& } y \in B\}$$

Temos que descobrir se esta definição é consistente na teoria ZF, isto é, se A e B são conjuntos, então o produto cartesiano $A \times B$ é um conjunto. A redação de sua validade requer uma estratégia, que será

1. Demonstrar que os pares ordenados pertencem a um conjunto maior cuja existência já está garantida e
2. pelo **axioma da separação**, extraímos estes elementos deste conjunto maior.

Lema 7. Se $x \in A$ e $y \in B$ então $(x, y) \in \mathcal{PP}(A \cup B)$.

Demonstração. Se $x \in A$ e $y \in B$, então $\{x\} \subset A \cup B$ e $\{x, y\} \subset A \cup B$.

O insight sobre o **axioma das partes**: $\forall x \exists y \forall z (z \in y \leftrightarrow z \subset x)$, nos leva aos seguintes argumentos

$$\{x\} \in \mathcal{P}(A \cup B) \quad \text{e} \quad \{x, y\} \in \mathcal{P}(A \cup B).$$

Assim,

$$\{\{x\}, \{x, y\}\} \subset \mathcal{P}(A \cup B).$$

Pelo **axioma das partes** novamente, temos que $\{\{x\}, \{x, y\}\} \in \mathcal{PP}(A \cup B)$. ■

Corolário 7.1. Para quaisquer conjuntos A e B , existe o conjunto cujos elementos são exatamente os pares ordenados (x, y) em que $x \in A$ e $y \in B$.

Demonstração. Pelo **axioma do par**, **axioma da união** e o **axioma da separação**, existe o conjunto

$$A \times B = \{w \in \mathcal{PP}(A \cup B) : \exists x \exists y (x \in A) \text{ \& } y \in B \text{ \& } w = (x, y)\}$$

De fato, $A \times B$ satisfaz o teorema, pois todo par ordenado (x, y) que atende às especificações pertence a $\mathcal{PP}(A \cup B)$, conforme o Lema anterior. ■

Relações

Definição 7. Uma relação é um conjunto de pares ordenados.

Definição 8. Dizemos que R é uma *relação binária* entre A e B se R é um subconjunto.

$$(A \times B)^{ii}$$

Exemplo 8. Uma relação de ordem $<$ (menor) no conjunto $A = \{1, 2, 3\}$. Queremos dizer que $<$ relaciona cada número aos números maiores:

$$1 < 2$$

$$1 < 3$$

$$2 < 3$$

Assim,

$$< = \{(1, 2), (1, 3), (2, 3)\}$$

$$A \times A = \{(1, 1), (1, 2), (1, 3), (2, 1), (2, 2), (2, 3), (3, 1), (3, 2), (3, 3)\}$$

Domínio, Contradomínio e Imagem

Definição 9. Seja R uma relação.

Definimos o *domínio* de R como \mathcal{D}_R , a *imagem* de R como Img_R e o *contradomínio* de R como CD_R de tal modo que:

$$x \in \mathcal{D}_R \leftrightarrow \exists y((x, y) \in R)$$

$$y \in \text{Img}_R \leftrightarrow \exists x((x, y) \in R)$$

$$CD_R = \mathcal{D}_R \cup \text{Img}_R$$

Para justificar a definição, temos que garantir que dada uma relação R ,

- existe o conjunto formado pelas primeiras coordenadas dos elementos de R (lembrando que R é um conjunto de pares ordenados) e
- existe o conjunto das segundas coordenadas dos elementos de R .

Para a justificação da definição precisaremos de uma estratégia que consiste em

1. Mostrar que as coordenadas de um par ordenado pertencem a um conjunto maior cuja existência é garantida e
2. Usar o **axioma da separação** para destacar os elementos desejados.

Lema 8. Se $(x, y) \in A$, então x e y pertencem a $\bigcup \bigcup A$.

Demonstração. Declarar $(x, y) \in A$ é, equivalentemente, declarar que $\{\{x\}, \{x, y\}\} \in A$.

Com efeito, pelo **axioma da união**:

$$x \in \bigcup A \leftrightarrow \exists c (c \in A \ \& \ x \in c),$$

temos $\{x, y\} \in \bigcup A$ (é um elemento de um elemento de A).

Pelo axioma da união, novamente, segue então que

$$x \in \bigcup \bigcup A$$

ⁱⁱNotação utilizada: (x, y) ou xRy . No caso de $A = B$ e R um subconjunto de $A \times A$, então dizemos simplesmente que R é uma relação sobre A .

e também

$$y \in \bigcup \bigcup A,$$

pois são elementos de elementos de $\bigcup A$. ■

Assim, podemos estabelecer os conjuntos domínio e imagem de uma relação R :

$$\begin{aligned}\mathcal{D}_R &= \{x \in \bigcup \bigcup R : \exists y((x, y) \in R)\} \\ \text{Img}_R &= \{y \in \bigcup \bigcup R : \exists x((x, y) \in R)\}\end{aligned}$$

Função

Uma função F é um conjunto de pares ordenados, isto é, uma relação, com uma propriedade em particular.

Proposição 12. Para cada $x \in \mathcal{D}_F$ existe um único y tal que $(x, y) \in F$.

Definição 10. Dizemos que uma relação F entre A e B é uma função de A em B se para todo $x \in A$ existe um único $y \in B$ tal que $(x, y) \in F$.

Observação

Quando nem todos os elementos de A participam da função, dizemos que a função é uma *função parcial* de A em B . Caso contrário, dizemos que F é uma *função total* ou simplesmente uma função.

As definições de domínio e imagem para relações seguem o mesmo esquema para funções.

$$\begin{aligned}\mathcal{D}_F &= \{x \in \bigcup \bigcup F : \exists y((x, y) \in F)\} \\ \text{Img}_F &= \{y \in \bigcup \bigcup F : \exists x((x, y) \in F)\}\end{aligned}$$

Dada uma função, podemos "recuperar o domínio e a imagem". Dessa forma, se F é uma (total) de A em B , então:

- O conjunto A é o domínio de F
- O conjunto $\{y \in B : \exists x \in A(xFy)\}$ é a imagem de F .

Definição 11 (Contradomínio). Se F é uma função de A em B , é declarado que B é o *contradomínio* da função F .

Todavia, devemos notar que esse conjunto não pode ser "recuperado" a partir da função:

Exemplo 9.


$$F = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : y = x^2\}$$

Aqui, F pode ser uma função tanto \mathbb{R} em \mathbb{R} , quanto de \mathbb{R} em \mathbb{R}_+ (reais não negativos).

Em resumo, o domínio deve sempre ser *suficientemente pequeno para garantir que a regra da função irá funcionar em cada elemento do domínio*. Por outro lado, o contradomínio deve sempre ser grande o suficiente para conter todos os valores da função que ocorrem.

Definição 12 (Composta). Se F e G são funções, com $\text{Img}_G \subset \mathcal{D}_F$ então definimos a função composta de F e G da seguinte maneira:

$$F \circ G = \{(x, y) \in \mathcal{D}_G \times \text{Img}_F : \exists z(xGz \ \& \ zFy)\}.$$



Definição 13 (Natureza). Uma função $F : A \longrightarrow B$ é

- Injetora: se para todos $x, y \in A$ temos que se $x \neq y$, então $F(x) \neq F(y)$
- Sobrejetora em relação a B: se para todo $y \in B$ existe $x \in A$ tal que $y = F(x)$
- Bijetora: se ela é injetora e sobrejetora em relação a B

Definição 14 (Inversa). Dada uma relação R, definimos a inversa de R, denotada por R^{-1} , o conjunto:

$$R^{-1} = \{(x, y) : (y, x) \in R\}.$$

Para toda relação R, existe sua inversa. No entanto, quando F é uma função, então F^{-1} também é uma função sss F é Injetora.

Relação de equivalência

Definição 15. Uma *relação de equivalência* R em algum conjunto A é uma relação binária sobre A que satisfaz três propriedades, para todos x, y e $z \in A$:

- Propriedade Reflexiva - (xRx) : $(x, x) \in R$
- Propriedade Simétrica - $(xRy \leftrightarrow yRx)$: $(x, y) \in R \leftrightarrow (y, x) \in R$
- Propriedade Transitiva - $(xRy \ \& \ yRz \rightarrow xRz)$: $(x, y) \in R \ \& \ (y, z) \in R \rightarrow (x, z) \in R$

Exemplo 10. Consideremos o conjunto $A = \{1, 2, 3, 4, \dots, 12\}$. Vamos dividi-lo em três subconjuntos:

$$\begin{aligned} A_1 &= \{1, 2, 3, 4\}, \\ A_2 &= \{5, 6, 7, 8\}, \\ A_3 &= \{9, 10, 11, 12\}. \end{aligned}$$

Digamos agora que dois elementos estão numa relação R se eles são elementos do mesmo subconjunto: $xRy \leftrightarrow x$ e y pertencem ao mesmo subconjunto, então

$$R = \{(1, 1), (1, 2), \dots, (5, 5), (5, 6), \dots, (9, 12), (12, 9)\}.$$

Observe que a relação R é uma relação de equivalência:

$$A_1 = \{1, 2, 3, 4\}, A_2 = \{5, 6, 7, 8\}, A_3 = \{9, 10, 11, 12\}$$

- Reflexividade: um elemento está no mesmo subconjunto de si mesmo
- Simetria: x está no mesmo subconjunto que y , então y está no mesmo subconjunto de x
- Transitividade: Se x está no mesmo subconjunto de y e y , por sua vez, está no mesmo subconjunto que z , então x e z estão no mesmo subconjunto.

Classes de equivalência

Vamos considerar novamente

$$\begin{aligned}A &= \{1, 2, 3, 4, \dots, 12\}, \\A_1 &= \{1, 2, 3, 4\}, \\A_2 &= \{5, 6, 7, 8\}, \\A_3 &= \{9, 10, 11, 12\}.\end{aligned}$$

Tomando um elemento $x \in A$, digamos, o 2. Queremos listar todos os elementos que estão na relação com $x = 2$ com respeito a R :

$$xRy \leftrightarrow x \text{ e } y \text{ pertencem ao mesmo conjunto.}$$

Esses elementos são: $\{1, 2, 3, 4\}$. Mas note que este conjunto é exatamente o subconjunto A_1 .

Definição 16. A classe de equivalência de x módulo R é

$$[x]_R = \{t : xRt\}.$$

Ou seja, é o conjunto de todos os elementos t que estão na relação R com x ou de forma equivalente, todos os elementos t tais que $(x, t) \in R$. Quando dois elementos pertencem à mesma classe de equivalência, diremos que eles são equivalentes.

O conjunto $[x]_R$ está garantido pelo **axioma da separação**, pois $[x]_R \subseteq \text{Im}g_R$.

Exemplo 11. $xRy \leftrightarrow x$ e y pertencem ao mesmo subconjunto.

$$\begin{aligned}A &= \{1, 2, 3, 4, \dots, 12\}, \\A_1 &= \{1, 2, 3, 4\}, \\A_2 &= \{5, 6, 7, 8\}, \\A_3 &= \{9, 10, 11, 12\}.\end{aligned}$$

Então

$$\begin{aligned}[1]_R &= \{t : 1Rt\} = \{1, 2, 3, 4\} = A_1, \\[4]_R &= \{1, 2, 3, 4\} = A_1, \\[5]_R &= \{5, 6, 7, 8\} = A_2, \\[12]_R &= \{9, 10, 11, 12\} = [9]_R = A_3.\end{aligned}$$

Teorema 9. Assuma que R seja uma relação de equivalência sobre A e x e y sejam elementos de A . Então,

$$[x]_R = [y]_R \text{ iff } xRy.$$

Demonstração. Suponha que $[x]_R = [y]_R$. Sabemos que $y \in [y]_R$, pela propriedade reflexiva. Pela suposição de igualdade, $y \in [x]_R$, portanto, pela definição, xRy . Suponha que xRy . Veja que se $t \in [y]_R$, então yRt . Pela transitividade, xRy & $yRt \rightarrow xRt$. Tendo que $[x]_R = \{t : xRt\}$ (definição), se xRt , então $t \in [x]_R$. Ou seja, mostramos que $[y]_R \subseteq [x]_R$. Pela simetria, temos yRx e em um processo análogo, podemos mostrar que $[x]_R \subseteq [y]_R$.

Portanto, $[x]_R = [y]_R$. ■

Nota

R é igual a A cartesiano A que vale as propriedades Reflexiva, Simétrica e Transitiva. Uma classe de equivalência, por exemplo, a classe de equivalência de x módulo R é o conjunto de elementos t tais que x está na relação R com t . Todos os elementos t tais que $(x, t) \in R$.

No exemplo acima temos $A = \bigcup \{[1], [5], [9]\}$.

Partição

Definição 17. Uma partição Π de um conjunto A é um conjunto formado por subconjuntos não vazios de A que são *disjuntos* e *exaustivos*, isto é:

- Não existem dois conjuntos em Π que possuam elementos em comum (são dois a dois disjuntos);
- Cada elemento de A pertence a algum conjunto Π (a união dos conjuntos da partição é igual ao próprio conjunto A).

Teorema 10. Seja Π uma partição de um conjunto A . Define-se uma relação R sobre A da seguinte forma:

$$xRy \leftrightarrow \exists B \in \Pi (x \in B \ \& \ y \in B).$$

Então, R é uma relação de equivalência sobre A .

A relação R diz que dois objetos estão na relação xRy se eles pertencem ao mesmo subconjunto. O teorema diz que uma partição induz uma relação de equivalência sobre um conjunto. Então, definindo uma partição de um conjunto e estabelecendo uma relação nesse conjunto que vai validar a pertinência de dois elementos dentro de um subconjunto dessa partição, temos uma relação de equivalência. A demonstração segue diretamente das propriedades lógicas (Reflexiva, Simétrica e Transitiva).

Exemplo 12. Consideremos o conjunto $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$.

Seja $\Pi = \{\{1, 2, 3, 4\}, \{5, 6, 7, 8\}\}$.

Note que não existem dois conjuntos de Π com elementos iguais e todo elemento de A pertence a algum conjunto de Π . Portanto, Π é uma partição de A .

$$A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}. \quad \therefore \Pi_A = \{\{1, 2, 3, 4\}, \{5, 6, 7, 8\}\}.$$

Definimos uma relação R sobre A da seguinte forma:

$$xRy \leftrightarrow \exists B \in \Pi (x \in B \ \& \ y \in B).$$

Neste caso:

$$R = \{(1, 1), (1, 2), \dots, (4, 3), (4, 4), \dots, (5, 5), (5, 6), (8, 7), (8, 8)\}$$

- $\forall x \in A ((x, x) \in R)$
- $(x, y) \in R \leftrightarrow (y, x) \in R$
- $(x, y) \in R \ \& \ (y, z) \in R \rightarrow (x, z) \in R$
- Portanto, R é uma **relação de equivalência**.

Teorema 11. Seja R uma relação de equivalência sobre A . Então, o conjunto

$$H = \{[x]_R : x \in A\}$$

de todas as **classes de equivalência**, é uma partição desse conjunto A .

Demonstração. Para ser partição, H deve satisfazer:

- Os conjuntos em H são subconjuntos de A , não vazios e são dois a dois disjuntos.
- Cada elemento pertencentes A pertence a algum conjunto em H .

Seja $x \in A$ qualquer. Então, $x \in [x]_R$, logo, as classes em H são não vazias e mostramos que vale (i.). Como R é uma relação binária em A , segue que as classes são subconjuntos de A .

Suponha que z pertença a duas classes diferentes, digamos, $[x]_R$ e $[y]_R$. Então, xRz e yRz (ou zRy , pela simetria). Pela transitividade teríamos xRy , e pelo Teorema.0.9, teríamos $[x]_R = [y]_R$, contrariando a suposição de que essas classes sejam diferentes. ■

I.E

O Teorema 10 diz que uma partição induz uma relação de equivalência sobre um conjunto.

Já o Teorema 11 temos o inverso do Teorema 10, isto é, a relação de equivalência particiona o conjunto de certa forma que respeita a definição de partição.

Conjunto Quociente

Se R é uma relação de equivalência sobre um conjunto A , o conjunto $H = \{[x]_R : x \in A\}$ do teorema anterior passa a ser chamado de Conjunto Quociente:

$$A/R = \{[x]_R : x \in A\}$$

Definição 18. Defini-se como conjunto quociente um conjunto de classes de equivalência onde cada classe de equivalência é um conjunto formado pelas segundas coordenadas de todos os pares ordenados em que o elemento x é a primeira coordenada.

Então, como é garantido pelas propriedades de relação de equivalência que as classes de equivalência formam uma partição de um dado conjunto A , essa partição (ou conjunto das classes de equivalência) é o **Conjunto Quociente**, também chamado de **Espaço Quociente** de A por R .

Observação

A existência desse conjunto é garantida pelo **axioma da separação**, pois ele é subconjunto de $\mathcal{P}(\text{Im}g_R)$.

Quando A tem alguma estrutura definida (como uma operação de grupo ou uma topologia) e a relação de equivalência R é compatível com esta estrutura, o conjunto quociente frequentemente herda uma estrutura semelhante de seu "conjunto pai".

Relação de ordem total (ou ordem linear)

Definição 19. Seja A um conjunto qualquer. Uma ordem total sobre A é uma relação binária R sobre A , isto é, $R \subseteq A \times A$, que satisfaz as seguintes propriedades

- a. R é uma relação transitiva

$$\forall x, \forall y, \forall z \in A (xRy \ \& \ yRz \rightarrow xRz);$$

- b. R satisfaz a tricotomia sobre A , isto é, para dois elementos de A , ocorre uma das três opções

$$xRy, x = y, yRx$$

Exemplo 13. Uma ordem usual $R (<)$ em $A = \{1, 2, 3\}$:

$1R2, 1R3$ e $2R3$. Então, temos

$$R = \{(1, 2), (1, 3), (2, 3)\}.$$

Teorema 12 (Não Reflexividade). Seja R uma relação de ordem total sobre A .

- a. Não existe x tal que xRx (não reflexiva);

- b. Se $x \neq y$, então xRy ou yRx .

Demonstração. Através da tricotomia temos que vale apenas uma das três: $xRy, x = y, yRx$.

Se $x = y$, então pela tricotomia:

$$xRx, x = x, xRx.$$

Como sempre vale $x = x$, não deve valer xRx . Logo, R é não reflexiva.

Se $x \neq y$, então xRy ou yRx . ■

Relação de complementaridade [Adicional]

Definição 20. Seja R uma relação binária e tida como subconjunto de $A \times B$. A *relação complementar* \bar{R} é o conjunto complemento de R em $A \times B$.

$$\bar{R} = (A \times B) \setminus R.$$

Existe uma conexão entre uma *matriz lógica* (ou *matriz Booleana*) com a relação de complementaridade. A visualização da complementaridade em uma relação binária R se torna mais didática com o desenvolvimento da Matriz Lógica.

Família Indexada

São coleções de objetos que prosseguem de uma associação a um índice de algum conjunto de índices. Uma *família* de números reais, *indexados* pelo conjunto de inteiros é uma coleção de números reais, onde uma determinada função seleciona, para cada inteiro, um número real.

Família indexada é uma função que possui um certo domínio I e imagem X . Os elementos do conjunto X são referidos como a *família*. O conjunto I é referido como o *índice* da família, sendo assim, X é o *conjunto indexado*.

Definição 21. Considere I e X conjuntos e x uma função sobrejetivaⁱⁱⁱ tal que

$$\begin{aligned} x : I &\longrightarrow X \\ i &\mapsto x_i = x(i) \end{aligned}$$

estabelece uma *família de elementos* em X , indexado por I , que é denotado por $(x_i)_{i \in I}$ ou simplesmente (x_i) , caso o conjunto de índices seja conhecido.

Nota

Uma família indexada pode ser *transformada* em um conjunto, quase que de forma natural. Para qqr família $(F_i)_{i \in I}$ existe o conjunto de **todos** os elementos $\{F_i \mid i \in I\}$, todavia isso não carrega uma "restrição" sobre a contenção múltipla ou a estrutura dada pelo I . Logo, utilizando conjunto em vez de família, certas etapas necessária podem ser perdidas e haver uma má interpretação. Considerando o conjunto $X = \{x_i : i \in I\}$, ou seja, a imagem de I sob x . Lembrando que o mapeamento x não precisa ser *injetivo*, pode haver $i, j \in I$ com $i \neq j$ de tal modo que $x_i = x_j$. Portanto, $|X| \leq |I|$

Matriz lógica

Definição 22 (Domínio Booleano). Domínio booleano é um conjunto que possui apenas dois elementos cujos valores representam *falso* e *verdadeiro*.

$$\mathbb{B} = \{0, 1\}$$

Matriz Booleana

Também chamada de *matriz binária* é uma matriz em que os termos a_{ij} assumem valores do **domínio Booleano**.

Essa matriz pode ser usada na representação de uma relação binária entre um par de conjuntos finitos.

Definição 23. Se R é uma **relação binária** entre os *conjuntos indexados* finitos X e Y , i.e, $R \subseteq X \times Y$, então R pode ser representado pela matriz lógica M cujos índices de linha e coluna indexam os elementos de X e Y , respectivamente, de modo que as entradas de M são definidas por

ⁱⁱⁱUma família contém qualquer elemento exatamente uma vez, se e somente se a função correspondente for injetiva.

$$M_{ij} = \begin{cases} 1 & (x_i, y_j) \in R \\ 0 & (x_i, y_j) \notin R \end{cases}$$

Os conjuntos X e Y são indexados com os números inteiros positivos de forma a designar os números de linha e coluna da matriz. Temos i variando de 1 a cardinalidade de X e j variando de 1 a cardinalidade de Y .

Exemplo 14. A relação binária R no conjunto $\{1, 2, 3, 4\}$ é definida de forma que xRy se mantenha se, e somente se $y \mid x$. Segue o conjunto de pares para os quais a relação R é válida. $\{(1, 1), (1, 2), (1, 3), (1, 4), (2, 2), (2, 4), (3, 3), (4, 4)\}$ A representação como uma matriz lógica

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

onde o valor do par ordenado representa um termo, que seu valor tem como o domínio Booleano, onde valida ou não a divisibilidade.

Na **relação de complementaridade** ($\bar{R} = (A \times B) \setminus R$) vista como uma matriz lógica, já que linhas representam elementos de X e colunas elementos de Y , primeiro criamos a relação binária e depois mudamos todos os 1s da matriz para 0s, e 0s para 1s. Assim teremos a relação complementar.

Referências

- [1] Thomas J. Jech. *Set Theory*. ACADEMIC PRESS, 1978. ISBN: 0-12-381950-4.
- [2] Kazimierz Kuratowski. *Introduction to Set Theory and Topology*. PERGAMON PRESS, 1961. ISBN: 59-14873.