Лабораторная работа N2

Ссылки, таблицы и формулы в несколько строк $10~{\rm мартa}~2022~{\rm г}.$

1 Первое задание

2 Второе задание. Малые таблицы. 1

	Число частей при делении		
Число делящихся	пространства	плоскости	прямой
элементов	плоскостями	прямыми	точками
0	1	1	1
1	2	2	2
2	4	4	3
3	8	7	4
4	15		5
$\mid n \mid$			n+1

3 Третье задание

4 Четвертое задание. Нумерация и системы. 1

5. Семи неравенствам

$$2x_1 + 3x_2 \leqslant 6, (1)$$

$$x_1 + x_2 \leqslant 2,\tag{2}$$

$$-x_1 - 3x_2 \leqslant 3,\tag{3}$$

$$2x_1 \leqslant 3,\tag{4}$$

$$-x_1 \leqslant 3,\tag{5}$$

$$-3x_1 + 7x_2 \leqslant 21,\tag{6}$$

$$x_1 - 3x_2 \leqslant 3 \tag{7}$$

5 Пятое задание. Нумерация и системы. 2

75. 1) Пусть f — непрерывная на X функция, $a,b \in R, a < b$. Доказать, что функция

$$f(a;b;x) = \begin{cases} f\left(x\right), & \text{если } a \leqslant f\left(x\right) \leqslant b, \\ a, & \text{если } f\left(x\right) < a, \\ b, & \text{если } f\left(x\right) > b, \end{cases}$$

также непрерывна на X.

6 Шестое задание. Стандартные длинные формулы

С другой стороны известно, что монотонно возрастающая ограниченная последовательность чисел имеет конечный предел. Следовательно, если мы докажем, что последовательность чисел x_n ограничена, то будет доказана и содимость ряда (26). Положим

$$y_{2n} = 1 - \frac{1}{2^{\alpha}} + \frac{1}{3^{\alpha}} - \frac{1}{4^{\alpha}} + \frac{1}{5^{\alpha}} - \frac{1}{6^{\alpha}} + \dots$$

$$\dots \frac{1}{(2n-1)^{\alpha}} - \frac{1}{(2n)^{\alpha}}.$$

Так как

$$y_{2n} = 1 - \left(\frac{1}{2^{\alpha}} - \frac{1}{3^{\alpha}}\right) - \left(\frac{1}{4^{\alpha}} - \frac{1}{5^{\alpha}}\right) - \dots - \left(\frac{1}{(2n-2)^{\alpha}} - \frac{1}{(2n-1)^{\alpha}}\right) - \frac{1}{(2n)^{\alpha}}.$$

то (числа в каждой скобке положительны)

$$y_{2n} < 1$$
.

С другой стороны,

$$y_{2n} = 1 - \frac{1}{2^{\alpha}} + \frac{1}{3^{\alpha}} - \frac{1}{4^{\alpha}} + \frac{1}{5^{\alpha}} - \frac{1}{6^{\alpha}} + \dots + \frac{1}{(2n-1)^{\alpha}} - \frac{1}{(2n)^{\alpha}} = \left(1 + \frac{1}{2^{\alpha}} + \frac{1}{3^{\alpha}} + \frac{1}{4^{\alpha}} + \frac{1}{5^{\alpha}} + \frac{1}{6^{\alpha}} + \dots + \frac{1}{(2n-1)^{\alpha}} + \frac{1}{(2n)^{\alpha}}\right) - \frac{1}{(2n)^{\alpha}} - 2\left(\frac{1}{2^{\alpha}} + \frac{1}{4^{\alpha}} + \frac{1}{6^{\alpha}} + \dots + \frac{1}{(2n)^{\alpha}}\right) = \frac{1}{(2n-1)^{\alpha}} + \frac{1}{3^{\alpha}} + \frac{1}{4^{\alpha}} + \frac{1}{5^{\alpha}} + \frac{1}{6^{\alpha}} + \dots + \frac{1}{(2n-1)^{\alpha}} + \frac{1}{(2n)^{\alpha}}\right) - \frac{2}{2^{\alpha}}\left(1 + \frac{1}{2^{\alpha}} + \frac{1}{3^{\alpha}} + \dots + \frac{1}{n^{\alpha}}\right).$$

Так как $x_n = 1 + \frac{1}{2^{\alpha}} + \frac{1}{3^{\alpha}} + \dots + \frac{1}{n^{\alpha}}$, то

$$y_{2n} = x_{2n} - \frac{2}{2^{\alpha}}x_n.$$

```
\left(\frac{tabular}{c|p{2cm}@{\$\pm$}} }r|\right)
      \textbf{ИЛИ} & Истина & Ложь \\[2mm]
      \cline{2-3}
      Истина & Истина & Истина \\
      \left(1-1\right)\left(1-3\right)
      Ложь & <u>Истина</u> & <u>Ложь</u>\\ \cline{2-2}
\end{tabular}
                        Рис. 1:
\begin{tabular}{|p{4cm}cp{10cm}|}
   \hline
   Это очень-очень длинное предложение из многих слов & $6 \times
   2$ & Это очень-очень длинное предложение из многих слов \\
   \hline
   21 & $\dfrac{1}{2}$ & 23 \\[4mm]
   \hline
   31 & 32 & 33 \\
   \hline
\end{tabular}
```

Рис. 2:

7 Вопросы.

- 1. Как отформатировать date, чтобы в заголовке была нужная мне дата?
 - 2. Задание 4:
- 1) Нужно ли добавлять номер страницы, как на скриншоте справа снизу?
- 2) Нужно ли делать отступ с фразой "5. Семи неравенствам как на скриншоте. И если нужно, то как?
- 3) У меня получились большие отступы между неравенствами. Большой ли это недочет и как его исправить?
- 3. Как сделать так, чтобы этот текст не слипался в абзацы? Как сделать так, чтобы самое первое предложение начиналось с абзаца? Это касается и заданий 6, 5 4. Задание 6: 1) Нет 100-процентного совпадения с оригиналом.