

Лабораторная работа №2

Ссылки, таблицы и формулы в несколько строк

11 марта 2022 г.

1 Первое задание

Когда вы убедитесь, что теорема верна, вы начинаете ее доказывать. – Традиционный профессор математики

1. Разложения. Сталкиваясь с разного рода задачами, мы нуждаемся в определенном типе индуктивных рассуждений. В различных областях математики встречаются некоторые задачи, требующие индуктивных рассуждений типичного характера. Настоящая глава несколькими примерами иллюстрирует этот тезис. Мы начинаем с относительно простого примера.

Разложить по степеням x функцию $1/(1 - x + x^2)$.

Эта задача может быть решена многими способами. Нижеследующее решение несколько громоздко, но оно основано на правильном принципе и может естественно прийти в голову умному начинающему, который знает немного, но все же по крайней мере знает сумму геометрической прогрессии:

$$1 + r + r^2 + r^3 + \dots = \frac{1}{1 - r}$$

В нашей задаче есть возможность воспользоваться этой формулой:

$$\begin{aligned} \frac{1}{1 - x + x^2} &= \frac{1}{1 - x(1 - x)} = \\ &= 1 + x(1 - x) + x^2(1 - x)^2 + x^3(1 - x)^3 + \dots = \\ &= 1 + x - x^2 + \\ &\quad + x^2 - 2x^3 + x^4 + \\ &\quad + x^3 - 3x^4 + 3x^5 - x^6 + \\ &\quad + x^4 - 4x^5 + 6x^6 - 4x^7 + x^8 + \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&+x^5 - 5x^6 + 10x^7 - 10x^8 + \dots \\
&\quad +x^6 - 6x^7 + 15x^8 + \dots \\
&\quad \quad +x^7 - 7x^8 + \dots \\
&\quad \quad \quad +x^8 - \dots \\
&\quad \quad \quad \quad \dots
\end{aligned}$$

$$1 + x \qquad -x^3 - x^4 \qquad x^6 + x^7 \qquad \dots$$

2 Второе задание. Малые таблицы. 1

| Число делящихся элементов | Число частей при делении | | |
|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------|
| | пространства плоскостями | плоскости прямыми | прямой точками |
| 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 2 | 2 | 2 |
| 2 | 4 | 4 | 3 |
| 3 | 8 | 7 | 4 |
| 4 | 15 | | 5 |
| ... | ... | ... | ... |
| n | | | $n + 1$ |

3 Третье задание

Таблица VI

Общее число совпадений, наблюдаемых и теоретических (Гипотеза II)

| | Совпадения | | Отклонения | |
|--------------------------|-------------|-----------|-------------|-------------|
| | Наблюдаемые | Ожидаемые | Фактические | Стандартные |
| 10 языков | 171 | 42,66 | 128,34 | 7,60 |
| 9 языков с венг. | 8 | 8,53 | −0,53 | 2,78 |

4 Четвертое задание. Нумерация и системы.

1

5. Семи неравенствам

$$2x_1 + 3x_2 \leq 6, \quad (1)$$

$$x_1 + x_2 \leq 2, \quad (2)$$

$$-x_1 - 3x_2 \leq 3, \quad (3)$$

$$2x_1 \leq 3, \quad (4)$$

$$-x_1 \leq 3, \quad (5)$$

$$-3x_1 + 7x_2 \leq 21, \quad (6)$$

$$x_1 - 3x_2 \leq 3 \quad (7)$$

5 Пятое задание. Нумерация и системы. 2

75. 1) Пусть f — непрерывная на X функция, $a, b \in R, a < b$. Доказать, что функция

$$f(a; b; x) = \begin{cases} f(x), & \text{если } a \leq f(x) \leq b, \\ a, & \text{если } f(x) < a, \\ b, & \text{если } f(x) > b, \end{cases}$$

также непрерывна на X .

6 Шестое задание. Стандартные длинные формулы

С другой стороны известно, что монотонно возрастающая ограниченная последовательность чисел имеет конечный предел. Следовательно, если мы докажем, что последовательность чисел x_n ограничена, то будет доказана и содимость ряда (26). Положим

$$y_{2n} = 1 - \frac{1}{2^\alpha} + \frac{1}{3^\alpha} - \frac{1}{4^\alpha} + \frac{1}{5^\alpha} - \frac{1}{6^\alpha} + \dots$$

$$\dots - \frac{1}{(2n-1)^\alpha} + \frac{1}{(2n)^\alpha}.$$

Так как

$$y_{2n} = 1 - \left(\frac{1}{2^\alpha} - \frac{1}{3^\alpha} \right) - \left(\frac{1}{4^\alpha} - \frac{1}{5^\alpha} \right) - \dots -$$

$$- \left(\frac{1}{(2n-2)^\alpha} - \frac{1}{(2n-1)^\alpha} \right) - \frac{1}{(2n)^\alpha}.$$

то (числа в каждой скобке положительны)

$$y_{2n} < 1.$$

С другой стороны,

$$y_{2n} = 1 - \frac{1}{2^\alpha} + \frac{1}{3^\alpha} - \frac{1}{4^\alpha} + \frac{1}{5^\alpha} - \frac{1}{6^\alpha} + \dots +$$

$$+ \frac{1}{(2n-1)^\alpha} - \frac{1}{(2n)^\alpha} = \left(1 + \frac{1}{2^\alpha} + \frac{1}{3^\alpha} + \frac{1}{4^\alpha} + \frac{1}{5^\alpha} + \right.$$

$$\left. + \frac{1}{6^\alpha} + \dots + \frac{1}{(2n-1)^\alpha} + \frac{1}{(2n)^\alpha} \right) -$$

$$- 2 \left(\frac{1}{2^\alpha} + \frac{1}{4^\alpha} + \frac{1}{6^\alpha} + \dots + \frac{1}{(2n)^\alpha} \right) =$$

$$= \left(1 + \frac{1}{2^\alpha} + \frac{1}{3^\alpha} + \frac{1}{4^\alpha} + \frac{1}{5^\alpha} + \frac{1}{6^\alpha} + \dots + \right.$$

$$\left. + \frac{1}{(2n-1)^\alpha} + \frac{1}{(2n)^\alpha} \right) - \frac{2}{2^\alpha} \left(1 + \frac{1}{2^\alpha} + \frac{1}{3^\alpha} + \dots + \frac{1}{n^\alpha} \right).$$

Так как $x_n = 1 + \frac{1}{2^\alpha} + \frac{1}{3^\alpha} + \dots + \frac{1}{n^\alpha}$, то

$$y_{2n} = x_{2n} - \frac{2}{2^\alpha} x_n.$$

```

\begin{tabular}{c|p{2cm}@{${\pm}$}\r{}}
\textbf{ИЛИ} & Истина & Ложь \\ \hline
Истина & Истина & Истина \\ \hline
Ложь & Истина & Ложь \\ \hline
\end{tabular}

```

Рис. 1:

```

\begin{tabular}{|p{4cm}cp{10cm}|}
\hline
Это очень-очень длинное предложение из многих слов & $6 \times 2$ & Это очень-очень длинное предложение из многих слов \\ \hline
21 & $\frac{1}{2}$ & 23 \\ \hline
31 & 32 & 33 \\ \hline
\end{tabular}

```

Рис. 2:

7 Вопросы.

1. Как отформатировать date, чтобы в заголовке была нужная мне дата?
2. Задание 4:
 - 1) Нужно ли добавлять номер страницы, как на скриншоте справа снизу?
 - 2) Нужно ли делать отступ с фразой "5. Семи неравенствам как на скриншоте. И если нужно, то как?
 - 3) У меня получились большие отступы между неравенствами. Большой ли это недочет и как его исправить?
3. Как сделать так, чтобы этот текст не слипался в абзацы? Как сделать так, чтобы самое первое предложение начиналось с абзаца? Это касается и заданий 6, 5 4. Задание 6: 5. Во втором задании не получается как в оригинале в левой верхней ячейке. 6. Задание 3. Неполное совпадение с оригиналом. 1) Нет 100-процентного совпадения с оригиналом.