



গ্রামীণ কৃষি মৌসম সেবা
ভারত আবহাওয়া বিজ্ঞান বিভাগ
কল্যাণ। গ্রাম-বনগোবাড়ি বিবেকানন্দ নগর
পুরুলিয়া



কৃষি আবহাওয়া উপদেষ্টা বুলেটিন

তারিখ : 01-02-2022

পুরুলিয়া(পশ্চিম বঙ্গ) আবহাওয়ার পূর্বাভাস - প্রকাশনার তারিখ :2022-02-01 (পরের ৫ দিন সকাল ০৮:৩০ পর্যন্ত বৈধ)

পরিমাপক	2022-02-02	2022-02-03	2022-02-04	2022-02-05	2022-02-06
বৃষ্টিপাত (মি:মি:)	0	0	10	62	3
সর্বোচ্চ তাপমাত্রা (°C)	27.0	26.9	26.2	27.2	20.6
সর্বনিম্ন তাপমাত্রা (°C)	11.1	11.0	12.5	10.1	9.0
সকালের আপেক্ষিক আর্দ্রতা	46	57	87	93	90
বিকেলের আপেক্ষিক আর্দ্রতা	21	21	36	62	59
বাতাসের গতিবেগ (কি:মি:/ঘন্টা)	7.4	8.2	11.5	14.1	9.4
বাতাসের দিকনির্দেশ (ডিগ্রি)	287	56	117	90	330
মেঘের অবস্থা (ওকটা)	1	0	1	7	2

আবহাওয়ার সংক্ষিপ্তসার/সতর্কবার্তা::

আগামী পাঁচদিন জেলায় আংশিক মেঘলা আকাশ এবং পশ্চিমী ঝঞ্ঝার প্রভাবে ৪ ও ৫ তারিখে বিক্ষিপ্তভাবে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা যথাক্রমে ২০-২৭ এবং ৯-১২ ডিগ্রি সেলসিয়াসের কাছাকাছি থাকার সম্ভাবনা আছে। বাতাস প্রধানত উত্তর- পশ্চিম দিক থেকে ১২ কিমি প্রতি ঘন্টা বেগে বইতে পারে।

সাধারণ পরামর্শাবলী::

এইসময় সর্বের জমিতে জাব পোকের আক্রমণ বাড়তে পারে। আক্রমণ নিয়ন্ত্রণ করতে একটি পরিষ্কার দিনে থায়োমিথোক্সাম ২৫% ডব্লু.জি ০.৩ গ্রাম প্রতি লিটার জলের সাথে মিশিয়ে স্প্রে করুন। মধ্যমমাত্রার আবহাওয়ার পূর্বাভাস ও আবহাওয়াভিত্তিক কৃষি পরামর্শের জন্য কৃষকভাইয়েরা মেঘদূত এপ্সের ব্যবহার করতে পারেন।

বার্তামূলক পরামর্শ:

বৃষ্টির পূর্বাভাস থাকায় আগামী চারদিন ফসলে সেচ দেওয়া, কীটনাশক স্প্রে এবং সারের প্রয়োগ বন্ধ রাখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

উদ্যানপালন বিশেষ পরামর্শাবলী::

উদ্যানপালন	উদ্যানপালন বিশেষ পরামর্শাবলী:
------------	-------------------------------

উদ্যানপালন	উদ্যানপালন বিশেষ পরামর্শাবলী:
টমেটো	এই আবহাওয়াতে টমেটোতে নাবি ধ্বসা রোগ দেখা যেতে পারে। এই রোগে গাছের তলার পাতা গুলি পচে যায় এবং গাছগুলি শুকিয়ে যায়। রোগের লক্ষণ দেখা দিলে আজোক্সিস্ট্রোবিন ২৩% এস.সি @ ১ মিলি প্রতি লিটার জলে + ক্লোরোথ্যালোনিল ৭৫% ডব্লু.পি. ২ গ্রাম/লিটার জলে অথবা থায়োফেনেট মিথাইল ২ মিলি প্রতিলিটার জলে এবং আজোক্সিস্ট্রোবিন ১১% এস.সি + টেবুকোনাজোল ১৮.৩% এস.সি @ ১.৫ মিলি/লিটার + ক্লোরোথ্যালোনিল ৭৫% ডব্লু.পি. অথবা ম্যানকোজেব ৭৫% ডব্লু.পি. ২ গ্রাম/লিটার জলে ৩ বার ৭ দিন অন্তর স্প্রে করুন। টমেটোতে এইসময় পাতায় ছোট ছোট ছোপ দেখা যেতে পারে। এই রোগ নিয়ন্ত্রণের জন্য থায়োফেনেট মিথাইল ৭০% ডব্লু.পি. @ ১গ্রাম + ক্লোরোথ্যালোনিল ৭৫% ডব্লু.পি. @ ২ গ্রাম /লিটার জলে চারদিন অন্তর ২ বার স্প্রে করুন। এই আবহাওয়াতে টমেটোতে ফলছিদ্রকারী পোকের আক্রমণ দেখা যেতে পারে। আক্রমণ প্রতিহত করতে স্পাইনোসড ৪৫% এসসি ১ মিলি প্রতি লিটার জলের সাথে স্প্রে করতে পারেন।
আলু	এই আবহাওয়াতে আলুতে নাবি ধ্বসা রোগের লক্ষণ দেখা যেতে পারে। রোগনিয়ন্ত্রণের জন্য একটি পরিষ্কার দিনে আজোক্সিস্ট্রোবিন ১৮.২%+ ডাইফেনোকোনাজোল ১১.৪% এস.সি ১ মিলি প্রতি লিটার জলের সাথে স্প্রে করতে পারেন।

পশুসম্পত্তি বিশেষ পরামর্শাবলী::

পশুসম্পত্তি	পশুসম্পত্তি বিশেষ পরামর্শাবলী:
গরু	গবাদি পশুদের ব্ল্যাককোয়ার্টার, হেমারেজিক সেপ্টিসেমিয়ার রোগের প্রতিষেধক ভ্যাকসিন বা টিকাকরণ কোনো সরকারি কেন্দ্রে বা প্রাণী চিকিৎসকের কাছে অবশ্যই করানো উচিত।