

STUDY NOTES

गणित नोट्स – जूनियर स्तर

SUPER TET · कक्षा 6-8

03 September 2026

21 अध्याय

 Instagram

 YouTube

 Telegram

 Website

विषय-सूची / Contents

SUPER TET गणित — उन्नत नोट्स (Advanced Notes)

अध्याय 1 — संख्या पद्धति (उन्नत): घातांक व करणी

अध्याय 2 — बीजगणित की नींव (Foundation of Algebra)

अध्याय 3 — बीजगणितीय सर्वसमिकाएँ (Identities) ★

अध्याय 4 — गुणनखंडन (Factorisation)

अध्याय 5 — रैखिक समीकरण (Linear Equations)

अध्याय 6 — द्विघात समीकरण (Quadratic Equations)

अध्याय 7 — उन्नत प्रतिशत, लाभ-हानि व मिश्रण

अध्याय 8 — चक्रवृद्धि ब्याज (Compound Interest) ★

अध्याय 9 — साझेदारी (Partnership)

अध्याय 10 — उन्नत समय-कार्य व पाइप

अध्याय 11 — उन्नत चाल-समय-दूरी

अध्याय 12 — उन्नत ज्यामिति

अध्याय 13 — वृत्त व स्पर्श रेखा

अध्याय 14 — निर्देशांक ज्यामिति (Coordinate Geometry)

अध्याय 15 — क्षेत्रमिति (Mensuration) — विस्तार

अध्याय 16 — सांख्यिकी व प्रायिकता

अध्याय 17 — डेटा व्याख्या (Data Interpretation)

अध्याय 18 — ज्यामितीय रचनाएँ व चतुर्भुज (Constructions & Quadrilaterals)

अध्याय 19 — त्रिकोणमिति का परिचय (Basic Trigonometry)

अध्याय 20 — Junior स्तर की गणित शिक्षण-शास्त्र

अध्याय 21 — मास्टर सूत्र-पत्र (One-Page Revision)

📌 अंतिम चेकलिस्ट (परीक्षा से 1 सप्ताह पहले)

StudyHub
Point

SET 2 — JUNIOR / UPPER PRIMARY LEVEL

(कक्षा 6-8)

SUPER TET गणित — उन्नत नोट्स (Advanced Notes)

⚠ **पहले Set 1 पूरा करें।** यह सेट उसी की नींव पर बना है — यहाँ केवल **आगे का हिस्सा** और **कठिन variants** हैं।

अध्याय सूची

1. संख्या पद्धति (उन्नत) — घातांक व करणी
2. बीजगणित की नींव
3. बीजगणितीय सर्वसमिकाएँ (Identities)
4. गुणनखंडन (Factorisation)
5. रैखिक समीकरण (एक व दो चर)
6. द्विघात समीकरण (Quadratic Equations)
7. उन्नत प्रतिशत, लाभ-हानि व मिश्रण
8. चक्रवृद्धि ब्याज (Compound Interest)
9. साझेदारी (Partnership)
10. उन्नत समय-कार्य व पाइप
11. उन्नत चाल-समय-दूरी (नाव व धारा, रेलगाड़ी)
12. उन्नत ज्यामिति — रेखाएँ, त्रिभुज की सर्वांगसमता
13. वृत्त व स्पर्श रेखा
14. निर्देशांक ज्यामिति (Coordinate Geometry)
15. क्षेत्रमिति — 2D व 3D विस्तार
16. सांख्यिकी व प्रायिकता (Statistics & Probability)
17. डेटा व्याख्या (Data Interpretation)
18. ज्यामितीय रचनाएँ व चतुर्भुज (Constructions & Quadrilaterals) — नया
19. त्रिकोणमिति का परिचय (Basic Trigonometry) — नया
20. Junior स्तर की गणित शिक्षण-शास्त्र
21. मास्टर सूत्र-पत्र

अध्याय 1 – संख्या पद्धति (उन्नत): घातांक व करणी

1.0 (पुनरावृत्ति) Set 1 की बुनियाद – Junior सिलेबस के पहले topics

★ आधिकारिक Junior गणित-सिलेबस प्राकृतिक/पूर्ण/परिमेय संख्याएँ, पूर्णांक, कोष्ठक, LCM-HCF, वर्गमूल-घनमूल से शुरू होता है। ये सब Set 1 में विस्तार से हैं – यहाँ सिर्फ एक-पंक्ति recap है (विस्तार के लिए Set 1 ch 1, 2, 4, 7 देखें):

Set 1 अध्याय	कवर topics
Set 1 ch 1	प्राकृतिक, पूर्ण, पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय, स्थानीय मान
Set 1 ch 2	कोष्ठक / BODMAS (सरलीकरण)
Set 1 ch 4	LCM (लघुत्तम समापवर्त्य) व HCF (महत्तम समापवर्तक)
Set 1 ch 7	वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल

- **प्राकृतिक:** 1, 2, 3, ... | **पूर्ण:** 0, 1, 2, ... | **पूर्णांक:** ... -2, -1, 0, 1, 2 ...
- **परिमेय (Rational):** p/q ($q \neq 0$) में लिखी जा सकने वाली — जैसे $3/4$, 0.25 , -5 | **अपरिमेय:** $\sqrt{2}$, π , $0.101001...$
- **LCM:** सबसे छोटा सार्व गुणज | **HCF:** सबसे बड़ा सार्व गुणनखंड | दो संख्याओं के लिए: $LCM \times HCF =$ संख्याओं का गुणनफल।

1.1 घातांक के नियम (Laws of Exponents)

नियम	सूत्र
गुणा	$a^m \times a^n = a^{(m+n)}$
भाग	$a^m \div a^n = a^{(m-n)}$
घात की घात	$(a^m)^n = a^{(mn)}$
शून्य घात	$a^0 = 1$ ($a \neq 0$)
ऋणात्मक घात	$a^{-n} = 1/a^n$
भिन्नात्मक घात	$a^{(1/n)} = \sqrt[n]{a}$
गुणनफल	$(ab)^m = a^m b^m$

हल किया उदाहरण 1: $2^5 \times 2^3 \div 2^6 = ?$

$$\rightarrow 2^{(5+3-6)} = 2^2 = 4$$

हल किया उदाहरण 2: यदि $3^x = 81$ हो तो $x = ?$

$$\rightarrow 81 = 3^4 \rightarrow x = 4$$

हल किया उदाहरण 3: $(16)^{(3/4)} = ?$

$$\rightarrow 16 = 2^4 \rightarrow (2^4)^{(3/4)} = 2^3 = 8$$

1.2 करणी (Surds)

- $\sqrt{a} \times \sqrt{b} = \sqrt{ab}$, $\sqrt{a} \div \sqrt{b} = \sqrt{a/b}$
- हरात्मकरण (Rationalisation):** $1/(\sqrt{3} + 1) \rightarrow$ ऊपर-नीचे $(\sqrt{3} - 1)$ से गुणा $\rightarrow (\sqrt{3} - 1)/2$

अनुमानित मान (याद रखें): $\sqrt{2} \approx 1.414$ • $\sqrt{3} \approx 1.732$ • $\sqrt{5} \approx 2.236$ • $\sqrt{7} \approx 2.646$

अध्याय 2 — बीजगणित की नींव (Foundation of Algebra)

2.1 शब्दावली

शब्द	अर्थ	उदाहरण
चर (Variable)	बदलने वाली राशि	x, y, a
अचर (Constant)	निश्चित मान	$5, -7$
पद (Term)	+ या - से अलग हिस्सा	$3x^2, -5y$
गुणांक (Coefficient)	चर के साथ की संख्या	$3x^2$ में 3
समान पद (Like terms)	चर व घात समान	$4x$ और $7x$
असमान पद	चर/घात अलग	$4x$ और $4x^2$

पदों की संख्या के आधार पर:

- एकपदी (Monomial) — $5x$
- द्विपदी (Binomial) — $x + y$
- त्रिपदी (Trinomial) — $x^2 + 2x + 1$
- बहुपद (Polynomial) — कई पद

घात (Degree): सबसे बड़ी घात। जैसे $3x^3 + 2x - 5 \rightarrow$ घात = 3

- घात 1 = रैखिक (Linear), घात 2 = द्विघात (Quadratic), घात 3 = घन (Cubic)

2.2 संक्रियाएँ

- **जोड़/घटाव:** केवल **समान पद** ही जुड़ते हैं। $4x + 3x = 7x$, पर $4x + 3y = 4x + 3y$ (जुड़ेंगे नहीं)
- **गुणा:** गुणांक $\times$ गुणांक, घात **जोड़ें**। $3x^2 \times 4x^3 = 12x^5$
- **भाग:** गुणांक $\div$ गुणांक, घात **घटाएँ**। $12x^5 \div 4x^2 = 3x^3$

अध्याय 3 — बीजगणितीय सर्वसमिकाएँ (Identities) ★

यह अध्याय Junior level का सबसे ज्यादा scoring भाग है। सर्वसमिकाएँ रट लें।

3.1 आधारभूत सर्वसमिकाएँ

1. $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$
2. $(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$
3. $a^2 - b^2 = (a + b)(a - b)$
4. $(x + a)(x + b) = x^2 + (a + b)x + ab$
5. $(a + b)^3 = a^3 + b^3 + 3ab(a + b)$
6. $(a - b)^3 = a^3 - b^3 - 3ab(a - b)$
7. $a^3 + b^3 = (a + b)(a^2 - ab + b^2)$
8. $a^3 - b^3 = (a - b)(a^2 + ab + b^2)$
9. $(a + b + c)^2 = a^2 + b^2 + c^2 + 2(ab + bc + ca)$
10. $a^3 + b^3 + c^3 - 3abc = (a+b+c)(a^2+b^2+c^2-ab-bc-ca)$

3.2 व्युत्पन्न (Derived) — परीक्षा में सीधे काम आते हैं

$$\begin{aligned}a^2 + b^2 &= (a + b)^2 - 2ab = (a - b)^2 + 2ab \\(a + b)^2 &= (a - b)^2 + 4ab \\(a - b)^2 &= (a + b)^2 - 4ab \\ \text{यदि } a + b + c &= 0 \rightarrow a^3 + b^3 + c^3 = 3abc \\x^2 + 1/x^2 &= (x + 1/x)^2 - 2 = (x - 1/x)^2 + 2 \\x^3 + 1/x^3 &= (x + 1/x)^3 - 3(x + 1/x) \\x^4 + 1/x^4 &= (x^2 + 1/x^2)^2 - 2\end{aligned}$$

3.3 हल किए उदाहरण

उदाहरण 1: यदि $a + b = 7$ और $ab = 12$, तो $a^2 + b^2 = ?$
 $\rightarrow (a+b)^2 - 2ab = 49 - 24 = 25$

उदाहरण 2: यदि $x + 1/x = 3$, तो $x^2 + 1/x^2 = ?$

$$\rightarrow 3^2 - 2 = 7$$

$$\rightarrow \text{आगे: } x^3 + 1/x^3 = 27 - 9 = 18$$

उदाहरण 3: $(102)^2$ की गणना करें।

$$\rightarrow (100 + 2)^2 = 10000 + 400 + 4 = 10404$$

उदाहरण 4: $97 \times 103 = ?$

$$\rightarrow (100 - 3)(100 + 3) = 10000 - 9 = 9991$$

उदाहरण 5: यदि $a - b = 5$ और $ab = 14$, तो $a + b = ?$

$$\rightarrow (a+b)^2 = (a-b)^2 + 4ab = 25 + 56 = 81 \rightarrow a + b = 9$$

उदाहरण 6: यदि $a + b + c = 0$, तो $a^3 + b^3 + c^3 = ?$

$$\rightarrow 3abc$$

अध्याय 4 — गुणनखंडन (Factorisation)

4.1 चार मुख्य विधियाँ

(i) उभयनिष्ठ गुणनखंड निकालना

$$\rightarrow 6x^2 + 9x = 3x(2x + 3)$$

(ii) पदों का समूहन (Grouping)

$$\rightarrow ax + ay + bx + by = a(x+y) + b(x+y) = (a+b)(x+y)$$

(iii) सर्वसमिका का प्रयोग

$$\rightarrow x^2 - 16 = (x + 4)(x - 4)$$

$$\rightarrow x^2 + 6x + 9 = (x + 3)^2$$

(iv) मध्य पद का विभाजन (Splitting the middle term) — सबसे जरूरी

$$\rightarrow x^2 + 7x + 12$$

ऐसे दो अंक खोजें जिनका गुणनफल = 12 और योग = 7 $\rightarrow 3$ और 4

$$\rightarrow x^2 + 3x + 4x + 12 = x(x+3) + 4(x+3) = (x+3)(x+4)$$

उदाहरण: $x^2 - 5x + 6$

$$\rightarrow \text{गुणनफल } 6, \text{ योग } -5 \rightarrow -2 \text{ और } -3 \rightarrow (x-2)(x-3)$$

उदाहरण: $x^2 - x - 6$

$$\rightarrow \text{गुणनफल } -6, \text{ योग } -1 \rightarrow -3 \text{ और } +2 \rightarrow (x-3)(x+2)$$

💡 **संकेत:** अचर पद धनात्मक हो $\rightarrow$ दोनों गुणनखंडों के चिह्न समान (मध्य पद जैसा)। अचर पद ऋणात्मक हो $\rightarrow$ चिह्न विपरीत।

अध्याय 5 — रैखिक समीकरण (Linear Equations)

5.1 एक चर वाला

नियम: जो पक्ष बदले, चिह्न बदले। चर एक ओर, संख्याएँ दूसरी ओर।

उदाहरण: $3x + 5 = 20 \rightarrow 3x = 15 \rightarrow x = 5$

उदाहरण (भिन्न सहित): $(x/2) + (x/3) = 10$

$\rightarrow$ LCM 6 से गुणा: $3x + 2x = 60 \rightarrow 5x = 60 \rightarrow x = 12$

5.2 दो चर वाले युगपत समीकरण (Simultaneous Equations)

विधि 1 — विलोपन (Elimination):

$$2x + 3y = 13 \quad \dots(i)$$

$$3x - y = 3 \quad \dots(ii)$$

$\rightarrow$ (ii) को 3 से गुणा: $9x - 3y = 9$

$\rightarrow$ (i) में जोड़ें: $11x = 22 \rightarrow x = 2$

$\rightarrow$ (ii) में रखें: $6 - y = 3 \rightarrow y = 3$

विधि 2 — प्रतिस्थापन (Substitution): एक समीकरण से x का मान निकालकर दूसरे में रखें।

5.3 हलों की प्रकृति (Nature of Solutions)

$a_1x + b_1y + c_1 = 0$, $a_2x + b_2y + c_2 = 0$ के लिए:

शर्त	हल	ग्राफ
$a_1/a_2 \neq b_1/b_2$	अद्वितीय हल (Unique)	प्रतिच्छेदी रेखाएँ
$a_1/a_2 = b_1/b_2 \neq c_1/c_2$	कोई हल नहीं	समांतर रेखाएँ
$a_1/a_2 = b_1/b_2 = c_1/c_2$	अनंत हल	संपाती रेखाएँ

5.4 शब्द-समस्या

उदाहरण: दो संख्याओं का योग 45 और अंतर 9 है। संख्याएँ?

$\rightarrow x + y = 45$, $x - y = 9 \rightarrow$ जोड़ें: $2x = 54 \rightarrow x = 27$, $y = 18$

$\rightarrow$ **27 और 18**

अध्याय 6 — द्विघात समीकरण (Quadratic Equations)

मानक रूप: $ax^2 + bx + c = 0$ ($a \neq 0$)

6.1 श्रीधराचार्य सूत्र (Quadratic Formula)

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

6.2 विविक्तकर (Discriminant) $D = b^2 - 4ac$

D का मान	मूलों की प्रकृति
$D > 0$	दो भिन्न वास्तविक मूल
$D = 0$	दो बराबर वास्तविक मूल
$D < 0$	कोई वास्तविक मूल नहीं (काल्पनिक)

6.3 मूलों के संबंध

मूलों का योग ($\alpha + \beta$) = $-b/a$

मूलों का गुणनफल ($\alpha\beta$) = c/a

समीकरण बनाना: $x^2 - (\text{योग})x + (\text{गुणनफल}) = 0$

हल किया उदाहरण 1: $x^2 - 5x + 6 = 0$ हल करें।

→ गुणनखंड: $(x-2)(x-3) = 0 \rightarrow x = 2 \text{ या } 3$

हल किया उदाहरण 2: $x^2 - 7x + 10 = 0$ के मूलों का योग व गुणनफल?

→ योग = 7, गुणनफल = 10

हल किया उदाहरण 3: यदि मूल 3 और -5 हों, तो समीकरण?

→ योग = -2, गुणनफल = -15

→ $x^2 - (-2)x + (-15) = x^2 + 2x - 15 = 0$

हल किया उदाहरण 4: k के किस मान के लिए $x^2 + kx + 9 = 0$ के मूल बराबर हैं?

→ $D = 0 \rightarrow k^2 - 36 = 0 \rightarrow k = \pm 6$

अध्याय 7 — उन्नत प्रतिशत, लाभ-हानि व मिश्रण

7.1 उन्नत लाभ-हानि प्रश्न

बेईमान दुकानदार (False Weight):

$$\text{लाभ \%} = [\text{त्रुटि} / (\text{सही भार} - \text{त्रुटि})] \times 100$$

उदाहरण: एक दुकानदार 1 kg के बदले 900 g देता है। लाभ %?

$$\rightarrow \text{त्रुटि} = 100 \rightarrow [100 / (1000 - 100)] \times 100 = 100 / 900 \times 100 = 11\frac{1}{9}\%$$

अंकित मूल्य + छूट का संयुक्त प्रश्न:

उदाहरण: एक वस्तु का MP, CP से 40% अधिक है। 25% छूट देने पर लाभ %?

$$\rightarrow \text{CP} = 100 \rightarrow \text{MP} = 140 \rightarrow \text{SP} = 140 \times 0.75 = 105$$

$$\rightarrow \text{लाभ} = 5\%$$

बराबर SP पर एक लाभ एक हानि:

$$\text{हानि \%} = (x^2) / 100, \text{ जहाँ } x = \text{समान प्रतिशत}$$

7.2 मिश्रण व अनुपात (Alligation)

सस्ते की मात्रा : महँगे की मात्रा = (महँगा - औसत) : (औसत - सस्ता)

उदाहरण: ₹30/kg और ₹40/kg की चाय को किस अनुपात में मिलाएँ कि मिश्रण ₹34/kg का हो?

$$\rightarrow (40 - 34) : (34 - 30) = 6 : 4 = 3 : 2$$

दूध-पानी का क्लासिक प्रश्न:

उदाहरण: 60 लीटर मिश्रण में दूध व पानी 2 : 1 में हैं। कितना पानी मिलाएँ कि अनुपात 1 : 2 हो जाए?

$$\rightarrow \text{दूध} = 40 \text{ L}, \text{ पानी} = 20 \text{ L}$$

$$\rightarrow \text{दूध स्थिर (40 L) रहेगा। नया अनुपात 1:2} \rightarrow \text{पानी} = 80 \text{ L}$$

$$\rightarrow \text{मिलाना होगा} = 80 - 20 = 60 \text{ लीटर}$$

अध्याय 8 — चक्रवृद्धि ब्याज (Compound Interest) ★

8.1 सूत्र

$$A = P(1 + R/100)^T$$

$$CI = A - P$$

अलग-अलग स्थितियाँ:

स्थिति	सूत्र
वार्षिक संयोजन	$A = P(1 + R/100)^T$
अर्धवार्षिक (Half-yearly)	$A = P(1 + R/200)^{2T}$
त्रैमासिक (Quarterly)	$A = P(1 + R/400)^{4T}$
भिन्न-भिन्न दर	$A = P(1+R_1/100)(1+R_2/100)...$

8.2 SI बनाम CI — महत्वपूर्ण अंतर

- 1 वर्ष के लिए $SI = CI$ (हमेशा)
- 2 वर्ष: $CI - SI = P(R/100)^2$
- 3 वर्ष: $CI - SI = P(R/100)^2 \times (300 + R)/100$

हल किया उदाहरण 1: ₹8000 पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज?

$$\rightarrow A = 8000 \times (1.1)^2 = 8000 \times 1.21 = ₹9680$$

$$\rightarrow CI = ₹1680$$

$$(तुलना: SI = 1600, \text{ अंतर} = 80 = 8000 \times (10/100)^2 \checkmark)$$

हल किया उदाहरण 2: किसी धन पर 2 वर्ष में SI ₹400 और CI ₹420 है। दर?

$$\rightarrow 1 \text{ वर्ष का } SI = 200$$

$$\rightarrow \text{अंतर } 20 = 200 \text{ पर 1 वर्ष का ब्याज} \rightarrow R = (20/200) \times 100 = 10\%$$

$$(जाँच: P = 2000 \rightarrow SI = 400 \checkmark, CI = 2000 \times 1.1^2 - 2000 = 420 \checkmark)$$

हल किया उदाहरण 3: कोई धन CI पर 2 वर्ष में दुगुना हो जाता है, तो 4 वर्ष में कितना गुना?

$$\rightarrow 2 \text{ वर्ष} = 2 \text{ गुना} \rightarrow 4 \text{ वर्ष} = 2 \times 2 = 4 \text{ गुना}$$

★ **नियम:** CI पर n वर्ष में x गुना $\rightarrow mn$ वर्ष में x^m गुना

8.3 जनसंख्या व मूल्यहास

- वृद्धि: $P(1 + R/100)^T$
- हास (Depreciation): $P(1 - R/100)^T$

अध्याय 9 — साझेदारी (Partnership)

सरल साझेदारी (समान समय): लाभ का बँटवारा पूँजी के अनुपात में

$$\rightarrow A : B = \text{पूँजी}_1 : \text{पूँजी}_2$$

चक्रवृद्धि साझेदारी (अलग समय): लाभ का अनुपात = (पूँजी × समय) के अनुपात में

हल किया उदाहरण: A ने ₹5000 12 महीने के लिए, B ने ₹6000 8 महीने के लिए लगाए। ₹2100 लाभ का बँटवारा?

$$\rightarrow \text{अनुपात} = (5000 \times 12) : (6000 \times 8) = 60000 : 48000 = 5 : 4$$

$$\rightarrow A = 2100 \times 5/9 = \text{₹1166.67}, B = \text{₹933.33}$$

अध्याय 10 — उन्नत समय-कार्य व पाइप

10.1 दक्षता (Efficiency) संबंध

यदि A, B से n गुना तेज़ है $\rightarrow$ समय का अनुपात $A : B = 1 : n$

उदाहरण: A, B से दुगुना तेज़ है। दोनों मिलकर 12 दिन में काम करते हैं। A अकेला कितने दिन में?

$$\rightarrow \text{दक्षता } A : B = 2 : 1, \text{ कुल} = 3$$

$$\rightarrow A \text{ अकेला} = 12 \times 3/2 = 18 \text{ दिन}$$

10.2 तीन व्यक्ति साथ

$$\text{सूत्र: } 1/T = 1/a + 1/b + 1/c$$

उदाहरण: A 10, B 15, C 30 दिन में। तीनों साथ?

$$\rightarrow \text{LCM} = 30 \text{ इकाई} \rightarrow \text{क्षमताएँ } 3, 2, 1 = 6/\text{दिन} \rightarrow 5 \text{ दिन}$$

10.3 बीच में छोड़कर जाना

उदाहरण: A और B साथ 8 दिन में काम करते हैं। दोनों 4 दिन साथ काम करके A चला जाता है। B अकेला 20 दिन में पूरा काम करता है। शेष काम B कितने दिन में करेगा?

$$\rightarrow 4 \text{ दिन में काम हुआ} = 4/8 = 1/2$$

$$\rightarrow \text{शेष } 1/2 \text{ काम B करेगा} = 20 \times 1/2 = 10 \text{ दिन}$$

10.4 पाइप व टंकी (Pipes & Cistern)

- भरने वाला पाइप = +, खाली करने वाला = -
- **उदाहरण:** A 12 घंटे में भरता, B 15 घंटे में भरता, C 20 घंटे में खाली करता। तीनों साथ?
→ LCM = 60 → $5 + 4 - 3 = 6/\text{घंटा}$ → **10 घंटे**

अध्याय 11 — उन्नत चाल-समय-दूरी

11.1 रेलगाड़ी संबंधी

स्थिति	दूरी
खंभा/व्यक्ति (स्थिर) पार करना	रेलगाड़ी की लंबाई
प्लेटफॉर्म/पुल पार करना	रेलगाड़ी + प्लेटफॉर्म
दो रेलगाड़ियाँ पार करना	दोनों की लंबाइयों का योग

सापेक्ष चाल (Relative Speed):

- विपरीत दिशा → चालें **जोड़ें** ($a + b$)
- एक ही दिशा → चालें **घटाएँ** ($a - b$)

हल किया उदाहरण: 120 m और 180 m लंबी दो रेलगाड़ियाँ 40 km/h व 50 km/h से विपरीत दिशा में आ रही हैं। एक-दूसरे को पार करने में समय?

→ कुल दूरी = 300 m

→ सापेक्ष चाल = 90 km/h = $90 \times \frac{5}{18} = 25 \text{ m/s}$

→ समय = $300/25 = 12 \text{ सेकंड}$

11.2 नाव व धारा (Boat & Stream)

धारा के अनुकूल (Downstream) = $u + v$

धारा के प्रतिकूल (Upstream) = $u - v$

नाव की चाल $u = (D + U)/2$

धारा की चाल $v = (D - U)/2$

हल किया उदाहरण: एक नाव धारा के अनुकूल 16 km/h और प्रतिकूल 10 km/h चलती है। नाव व धारा की चाल?

→ नाव = $(16+10)/2 = 13 \text{ km/h}$


→ धारा = $(16-10)/2 = 3 \text{ km/h}$

अध्याय 12 – उन्नत ज्यामिति

12.1 रेखाएँ व कोण (Lines & Angles)

जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा (transversal) काटती है:


कोण युग्म	संबंध
संगत कोण (Corresponding)	बराबर
एकांतर अंतःकोण (Alternate interior)	बराबर
एकांतर बाह्य कोण	बराबर
अंतःकोण एक ही ओर (Co-interior)	योग = 180°
शीर्षाभिमुख कोण (Vertically opposite)	बराबर



चित्र 12.1 — समांतर रेखाएँ व तिर्यक रेखा — संगत तथा एकांतर कोण बराबर, एक ही ओर के अंतःकोणों का योग 180°


12.2 त्रिभुज की सर्वांगसमता (Congruence)

नियम	अर्थ
SSS	तीनों भुजाएँ बराबर
SAS	दो भुजा + बीच का कोण
ASA	दो कोण + बीच की भुजा
AAS	दो कोण + एक भुजा
RHS	समकोण + कर्ण + एक भुजा



SSS — three sides equal

चित्र 12.2 — SSS — तीनों भुजाएँ बराबर हों तो त्रिभुज सर्वांगसम




RHS — right angle + hypotenuse + side

चित्र 12.3 — RHS — समकोण, कर्ण तथा एक भुजा बराबर (केवल समकोण त्रिभुज पर लागू)

⊗ **AAA सर्वांगसमता नहीं है** — यह केवल **समरूपता (Similarity)** देता है। यह परीक्षा में बार-बार पूछा जाता है।

12.3 समरूप त्रिभुज (Similar Triangles)

- नियम: **AAA, SSS (अनुपात में), SAS (अनुपात में)**
- समरूप त्रिभुजों के **क्षेत्रफलों का अनुपात = संगत भुजाओं के अनुपात का वर्ग**
→ यदि भुजाएँ 2:3 → क्षेत्रफल 4:9




similar — same shape, sides in proportion


चित्र 12.4 — समरूप त्रिभुज — आकार समान, भुजाएँ अनुपात में; क्षेत्रफल अनुपात = भुजा अनुपात का वर्ग

12.4 त्रिभुज के केंद्र (Centres) — याद रखें

केंद्र	बनता है	विशेष
केन्द्रक (Centroid)	तीनों माध्यिकाओं से	2 : 1 के अनुपात में बाँटता है
लंबकेन्द्र (Orthocentre)	तीनों शीर्षलंबों से	समकोण त्रिभुज में समकोण शीर्ष पर
परिकेन्द्र (Circumcentre)	भुजाओं के लंब समद्विभाजकों से	सभी शीर्षों से समान दूरी
अंतःकेन्द्र (Incentre)	कोण समद्विभाजकों से	सभी भुजाओं से समान दूरी



चित्र 12.5 — केन्द्रक (Centroid) — तीनों माध्यिकाओं का प्रतिच्छेद, माध्यिका को 2 : 1 में बाँटता है




चित्र 12.6 — अंतःकेन्द्र (Incentre) — कोण समद्विभाजकों का प्रतिच्छेद, सभी भुजाओं से समान दूरी

समबाहु त्रिभुज में चारों केंद्र एक ही बिंदु पर होते हैं।

अध्याय 13 — वृत्त व स्पर्श रेखा


महत्वपूर्ण प्रमेय:

1. केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को **समद्विभाजित** करता है।
2. समान जीवाएँ केंद्र से **समान दूरी** पर होती हैं।
3. **स्पर्श रेखा** स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या के **लंबवत (90°)** होती है।
4. बाह्य बिंदु से खींची गई दोनों **स्पर्श रेखाएँ बराबर** होती हैं।
5. अर्धवृत्त में बना कोण = **90°**
6. एक ही चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण = शेष वृत्त पर बने कोण का **दुगुना**
7. **चक्रीय चतुर्भुज** के सम्मुख कोणों का योग = **180°**




angle in a semicircle = 90°

चित्र 13.1 — अर्धवृत्त में बना कोण सदैव 90° होता है




angle at centre = $2 \times$ angle at circumference

चित्र 13.2 — केंद्र पर बना कोण = परिधि पर बने कोण का दुगुना




$x + y = 180$ (opposite angles)

चित्र 13.3 — चक्रीय चतुर्भुज — सम्मुख कोणों का योग 180°



$PA = PB$ (tangents from an external point)

चित्र 13.4 — बाह्य बिंदु से खींची गई दोनों स्पर्श रेखाएँ बराबर होती हैं



perpendicular from O bisects the chord ($AM = MB$)

चित्र 13.5 — केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है

हल किया उदाहरण: एक वृत्त की त्रिज्या 5 cm है और केंद्र से जीवा की दूरी 3 cm है। जीवा की लंबाई?


→ आधी जीवा = $\sqrt{(25 - 9)} = 4$ → पूरी जीवा = **8 cm**

अध्याय 14 — निर्देशांक ज्यामिति (Coordinate Geometry)

14.1 चतुर्थांश (Quadrants)

चतुर्थांश	चिह्न
I	(+, +)
II	(-, +)
III	(-, -)
IV	(+, -)

- x-अक्ष पर बिंदु: (x, 0) • y-अक्ष पर: (0, y) • मूल बिंदु: (0, 0)



चित्र 14.1 — कार्तीय तल — चारों चतुर्थांश में चिह्न: I(+,+), II(-,+), III(-,-), IV(+,-)

14.2 सूत्र

दूरी सूत्र: $d = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$

मध्य-बिंदु: $((x_1 + x_2)/2, (y_1 + y_2)/2)$

विभाजन सूत्र (m:n): $((mx_2 + nx_1)/(m+n), (my_2 + ny_1)/(m+n))$


त्रिभुज का क्षेत्रफल: $\frac{1}{2} |x_1(y_2 - y_3) + x_2(y_3 - y_1) + x_3(y_1 - y_2)|$

मूल बिंदु से दूरी: $\sqrt{x^2 + y^2}$

हल किया उदाहरण 1: (3, 4) और (7, 1) के बीच की दूरी?

$$\rightarrow \sqrt{(16 + 9)} = \sqrt{25} = 5$$

a point is written as (x, y): move x, then y



horizontal coordinate x; vertical coordinate y

चित्र 14.2 — दूरी सूत्र — $d = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$; यहाँ त्रिक (3, 4, 5) बनता है

हल किया उदाहरण 2: (2, 3) और (6, 7) का मध्य-बिंदु?

$$\rightarrow ((2+6)/2, (3+7)/2) = (4, 5)$$

अध्याय 15 — क्षेत्रमिति (Mensuration) — विस्तार


15.1 2D — अतिरिक्त सूत्र

आकृति	सूत्र
त्रिभुज (हीरोन का सूत्र)	$\sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}$, जहाँ $s = (a+b+c)/2$
समबाहु त्रिभुज	क्षेत्रफल = $(\sqrt{3}/4)a^2$, ऊँचाई = $(\sqrt{3}/2)a$
वृत्त का त्रिज्यखंड (Sector)	$(\theta/360) \times \pi r^2$
चाप की लंबाई	$(\theta/360) \times 2\pi r$
वृत्ताकार वलय (Ring)	$\pi(R^2 - r^2)$


हल किया उदाहरण (हीरोन): भुजाएँ 13, 14, 15 वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल?

$$\rightarrow s = 21$$

$$\rightarrow \sqrt{[21 \times 8 \times 7 \times 6]} = \sqrt{7056} = 84 \text{ वर्ग इकाई}$$




चित्र 15.1 — त्रिज्यखंड (Sector) — क्षेत्रफल = $(\theta/360) \times \pi r^2$,
चाप = $(\theta/360) \times 2\pi r$



चित्र 15.2 — वृत्ताकार वलय (Ring) — क्षेत्रफल = $\pi(R^2 - r^2)$

15.2 3D — अतिरिक्त सूत्र

ठोस	वक्र पृष्ठीय (CSA)	कुल पृष्ठीय (TSA)	आयतन
घन	$4a^2$	$6a^2$	a^3
घनाभ	$2h(l+b)$	$2(lb+bh+hl)$	lbh
बेलन	$2\pi rh$	$2\pi r(r+h)$	$\pi r^2 h$
शंकु	πrl	$\pi r(r+l)$	$\frac{1}{3}\pi r^2 h$
गोला	$4\pi r^2$	$4\pi r^2$	$(\frac{4}{3})\pi r^3$
अर्धगोला	$2\pi r^2$	$3\pi r^2$	$(\frac{2}{3})\pi r^3$



चित्र 15.3 — अर्धगोला — आयतन $(\frac{2}{3})\pi r^3$, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल $3\pi r^2$ ($2\pi r^2$ नहीं)

- शंकु की तिर्यक ऊँचाई: $l = \sqrt{r^2 + h^2}$

हल किया उदाहरण: एक बेलन की त्रिज्या 7 cm और ऊँचाई 10 cm है। आयतन?

→ $\frac{22}{7} \times 49 \times 10 = 1540 \text{ cm}^3$

हल किया उदाहरण (अनुपात प्रश्न): एक गोले की त्रिज्या दुगुनी कर दी जाए तो आयतन कितना गुना?
 $\rightarrow$ आयतन $\propto r^3 \rightarrow 8$ गुना

★ **सामान्य नियम:** लंबाई n गुना $\rightarrow$ क्षेत्रफल n^2 गुना $\rightarrow$ आयतन n^3 गुना

अध्याय 16 — सांख्यिकी व प्रायिकता

16.1 वर्गीकृत आँकड़ों का माध्य

प्रत्यक्ष विधि: माध्य = $\Sigma fx / \Sigma f$

उदाहरण:

| x | 10 | 20 | 30 |

| --- | --- | --- | --- |

| f | 2 | 3 | 5 |

$\rightarrow \Sigma fx = 20 + 60 + 150 = 230, \Sigma f = 10$


$\rightarrow$ माध्य = 23

16.2 माध्यिका व बहुलक (वर्गीकृत)

- माध्यिका वर्ग = जहाँ संचयी बारंबारता पहली बार $N/2$ को पार करे
- बहुलक = $3 \times$ माध्यिका - $2 \times$ माध्य (अनुभवजन्य संबंध)

16.3 परिक्षेपण

- परिसर (Range) = अधिकतम - न्यूनतम
- माध्य विचलन, मानक विचलन (σ) — Junior स्तर पर केवल परिभाषा पर्याप्त



(1)

(2)

चित्र 16.1 — पासे की दो स्थितियाँ — दोनों में 1 ऊपर; पार्श्व चक्र $2 \rightarrow 3 \rightarrow 5$ से 2 का विपरीत 5

16.4 प्रायिकता (Probability)

$P(E)$ = अनुकूल परिणाम / कुल परिणाम

$$0 \leq P(E) \leq 1 \cdot P(\text{निश्चित घटना}) = 1 \cdot P(\text{असंभव घटना}) = 0$$

$$P(E) + P(\text{न } E) = 1$$

आधार तथ्य:

- एक सिक्का: 2 परिणाम • दो सिक्के: 4 • तीन सिक्के: 8 (2^n)
- एक पासा: 6 परिणाम • दो पासे: 36
- ताश की गड्डी: **52 पत्ते** = 4 सूट $\times$ 13; 26 लाल + 26 काले; **12 तस्वीर वाले (face cards)**; 4 इक्के

हल किया उदाहरण 1: एक पासे पर सम संख्या आने की प्रायिकता?

$$\rightarrow \{2, 4, 6\} \rightarrow 3/6 = 1/2$$

हल किया उदाहरण 2: ताश की गड्डी से एक पत्ता निकालने पर वह बादशाह (King) हो — प्रायिकता?

$$\rightarrow 4/52 = 1/13$$

हल किया उदाहरण 3: दो सिक्के उछालने पर कम से कम एक चित आने की प्रायिकता?

$$\rightarrow \text{कुल} = 4, \text{प्रतिकूल (दोनों पट)} = 1 \rightarrow 1 - 1/4 = 3/4$$

16.5 आँकड़ों का चित्रित निरूपण (Pictograph, Bar & Pie Chart) — नया

★ आधिकारिक Junior सिलेबस: "पिक्टोग्राफ... पाई एवं दण्ड चार्ट, अवर्गीकृत आँकड़ों का चित्र • ग्राफ, दण्ड आरेख तथा मिश्रित दण्ड आरेख" — Set 1 ch 20.2 में एक-पंक्ति परिचय था; परीक्षा-स्तर के नियम यहाँ:

- **पिक्टोग्राफ (Pictograph):** एक चित्र/प्रतीक = निश्चित संख्या। जैसे 🍎 = 5 विद्यार्थी $\rightarrow$ 3 🍎 = 15।
- **दण्ड आरेख (Bar Graph):** दण्ड की **ऊँचाई = मान**; आधार समान। दो/अधिक श्रेणियों के लिए **मिश्रित दण्ड आरेख** (side-by-side bars)।
- **पाई चार्ट (Pie Chart):** पूरा वृत्त = $360^\circ = 100\% \rightarrow 1\% = 3.6^\circ$ । किसी भाग का कोण = $(\text{भाग/कुल}) \times 360^\circ$ ।
- **रेखा ग्राफ (Line Graph):** समय के साथ बदलाव (trend) दिखाने के लिए।


हल किया उदाहरण: 720 छात्रों के सर्वेक्षण में विज्ञान 180, गणित 240, अन्य 300 — पाई चार्ट में गणित का कोण?

$$\rightarrow (240/720) \times 360^\circ = 120^\circ \mid \text{विज्ञान} = 90^\circ, \text{अन्य} = 150^\circ \text{ (कुल } 360^\circ \text{)} \checkmark$$

⚡ **ट्रिक:** पाई चार्ट के प्रश्न में "कोण दिया हो, मान निकालना हो" $\rightarrow$ भाग = $(\text{कोण}/360^\circ) \times \text{कुल}$ । "मान दिया, कोण चाहिए" $\rightarrow$ कोण = $(\text{मान/कुल}) \times 360^\circ$ ।

अध्याय 17 — डेटा व्याख्या (Data Interpretation)

पाई चार्ट: पूरा वृत्त = $360^\circ = 100\% \rightarrow 1\% = 3.6^\circ, 1^\circ = 5/18\%$



1% = 3.6 degrees

चित्र 17.1 — मासिक बजट का पाई चार्ट — भोजन 120° अर्थात् कुल का एक-तिहाई भाग

हल किया उदाहरण: किसी परिवार के मासिक खर्च ₹36,000 के पाई चार्ट में "भोजन" का क्षेत्र 120° है। भोजन पर खर्च?

$$\rightarrow 120/360 = 1/3 \rightarrow 36000 \times 1/3 = \text{₹}12,000$$

दंड आलेख / रेखा ग्राफ हल करने के 3 कदम:

1. पहले **शीर्षक व इकाई** पढ़ें (हजार में? लाख में?)
2. जो पूछा है **वही** मान उठाएँ — पूरा ग्राफ मत पढ़ें
3. % परिवर्तन = $(\text{नया} - \text{पुराना}) / \text{पुराना} \times 100$ — हर में हमेशा **पुराना** मान

अध्याय 18 — ज्यामितीय रचनाएँ व चतुर्भुज (Constructions & Quadrilaterals)

★ **नया अध्याय (UPSSC Junior सिलेबस 2026):** "समान्तर रेखाएँ, चतुर्भुज की रचनाएँ, त्रिभुज" — रचना-आधारित प्रश्न MCQ में steps के क्रम/उपकरण के रूप में आते हैं।

20.1 रचना के उपकरण व नियम

- रचना (Construction) = केवल **रूलर (unmarked)** + **परकार** से सटीक चित्र बनाना; चाँदे/मापनी नहीं (परख में steps-क्रम पूछा जाता है)।
- आवश्यक रचनाएँ: कोण 60° व 90° , कोण-समद्विभाजक, लम्ब-समद्विभाजक, $30^\circ/45^\circ$ (60° या 90° के आधे से)।

रचना	पहला कदम	कुंजी
कोण 60°	किरण पर परकार से चाप; वही त्रिज्या दूसरी बार	समबाहु त्रिभुज का कोण
कोण-समद्विभाजक	कोण के शीर्ष से चाप → दोनों भुजाओं पर बिंदु	दोनों बिंदुओं से समान चाप
लम्ब-समद्विभाजक	रेखा के दोनों सिरों से आधे से अधिक त्रिज्या के चाप	ऊपर-नीचे प्रतिच्छेद
त्रिभुज (3 भुजाएँ)	सबसे लंबी भुजा आधार; सिरों से अन्य दो त्रिज्याओं के चाप	SSS

⚡ **TET का पसंदीदा प्रश्न:** " 60° बनाने के लिए परकार की त्रिज्या कितनी रखें?" → कोई भी सुविधाजनक (same radius दो चाप)। "कोण-समद्विभाजक में कितने चाप?" → शीर्ष से 1 + प्रत्येक भुजा-बिंदु से 1 (कुल 3 चाप)।

20.2 चतुर्भुज (Quadrilateral) — जरूरी तथ्य

- चतुर्भुज के चारों कोणों का योग = 360° ।
- समान्तर चतुर्भुज (Parallelogram):** सम्मुख भुजाएँ समान्तर व बराबर; सम्मुख कोण बराबर; विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं।
- आयत (Rectangle):** समान्तर चतुर्भुज + सभी कोण 90° ; विकर्ण बराबर।
- समचतुर्भुज (Rhombus):** सभी भुजाएँ बराबर; विकर्ण 90° पर काटते हैं (पर बराबर नहीं)।
- वर्ग (Square):** आयत + समचतुर्भुज — सब कुछ बराबर, विकर्ण 90° पर व बराबर।
- समलम्ब (Trapezium):** केवल एक जोड़ी भुजाएँ समान्तर।
- पतंग (Kite):** आसन्न भुजाओं के दो जोड़े बराबर; विकर्ण 90° पर।

💡 **तुलना:** वर्ग $\subset$ आयत $\subset$ समान्तर चतुर्भुज; वर्ग $\subset$ समचतुर्भुज $\subset$ समान्तर चतुर्भुज। ("वर्ग सबका बेटा" 😊)

रचना-उदाहरण (समान्तर चतुर्भुज): दो आसन्न भुजाएँ व अन्तर्गत कोण दिए हों → आधार भुजा बनाओ → दिए कोण पर दूसरी भुजा → दोनों सिरों से समान्तर रेखाएँ।

20.3 अभ्यास प्रश्न

- चतुर्भुज के कोण 90° , 80° , 110° हैं — चौथा कोण? → $360 - 280 = 80^\circ$
- समचतुर्भुज के विकर्ण किस कोण पर काटते हैं? → 90°
- जिस चतुर्भुज में केवल एक जोड़ी भुजाएँ समान्तर हों? → **समलम्ब**
- आयत के विकर्ण बराबर होते हैं — सही/गलत? → **सही**

अध्याय 19 — त्रिकोणमिति का परिचय (Basic Trigonometry)

★ **नया अध्याय (UPSSC Junior सिलेबस 2026):** आधिकारिक list में "...घातांक, त्रिकोणमिति" — बुनियादी अनुपात व कोण-तालिका यहाँ।

19.1 त्रिकोणमितीय अनुपात (समकोण त्रिभुज में)

समकोण त्रिभुज ABC ($C = 90^\circ$, कर्ण = AB) में कोण A के लिए:

- $\sin A = \text{लम्ब/कर्ण} = BC/AB$
- $\cos A = \text{आधार/कर्ण} = AC/AB$
- $\tan A = \text{लम्ब/आधार} = BC/AC$

⚡ **ट्रिक: PAP/BAH/POA** — $\sin = P/H$, $\cos = B/H$, $\tan = P/B$ ("Pandit Badri Prasad / Har Har Bole" जैसा ढंग से अपना तरीका बनाएँ)।

$\tan A = \sin A / \cos A$; $\sin^2 A + \cos^2 A = 1$; $\sin(90^\circ - A) = \cos A$

19.2 कोण-तालिका (रटें) — $0^\circ, 30^\circ, 45^\circ, 60^\circ, 90^\circ$

अनुपात	0°	30°	45°	60°	90°
sin	0	$1/2$	$1/\sqrt{2}$	$\sqrt{3}/2$	1
cos	1	$\sqrt{3}/2$	$1/\sqrt{2}$	$1/2$	0
tan	0	$1/\sqrt{3}$	1	$\sqrt{3}$	∞ (अपरिभाषित)

⚡ **याद-ट्रिक (sin के लिए):** $\sqrt{0}/2, \sqrt{1}/2, \sqrt{2}/2, \sqrt{3}/2, \sqrt{4}/2 = 0, 1/2, 1/\sqrt{2}, \sqrt{3}/2, 1$ — और cos उल्टा क्रम।

कुछ मान याद रखें: $\sin 30^\circ = 1/2 \cdot \cos 60^\circ = 1/2 \cdot \tan 45^\circ = 1 \cdot \sin 90^\circ = 1 \cdot \cos 0^\circ = 1$

19.3 हल किए उदाहरण

उदा 1: $\sin 30^\circ + \cos 60^\circ = ? \rightarrow 1/2 + 1/2 = 1$

उदा 2: $\tan 45^\circ \times \sin 90^\circ = ? \rightarrow 1 \times 1 = 1$

उदा 3: $\sin^2 30^\circ + \cos^2 30^\circ = ? \rightarrow (1/2)^2 + (\sqrt{3}/2)^2 = 1/4 + 3/4 = 1$ (सर्वसमिका ✓)

19.4 अभ्यास प्रश्न

1. $\sin 60^\circ$ का मान? $\rightarrow \sqrt{3}/2$

2. $\cos 0^\circ + \sin 90^\circ = ? \rightarrow 2$
3. $\tan 60^\circ \times \cos 30^\circ = ? \rightarrow \sqrt{3} \times \sqrt{3}/2 = 3/2$
4. यदि $\sin A = 1/2$ तो $A = ? \rightarrow 30^\circ$
5. $\sin 30^\circ \times \cos 60^\circ + \sin 60^\circ \times \cos 30^\circ = ? \rightarrow (1/2 \times 1/2) + (\sqrt{3}/2 \times \sqrt{3}/2) = 1/4 + 3/4 = 1$

अध्याय 20 — Junior स्तर की गणित शिक्षण-शास्त्र

20.1 पियाजे के अनुसार गणितीय चिंतन

अवस्था	आयु	गणित शिक्षण का निहितार्थ
संवेदी-गामक	0-2	वस्तु स्थायित्व
पूर्व-संक्रियात्मक	2-7	मूर्त वस्तुओं से गिनती; संरक्षण (conservation) नहीं
मूर्त संक्रियात्मक	7-11	वर्गीकरण, क्रमबद्धता, संरक्षण आ जाता है — प्राथमिक गणित यहीं
औपचारिक संक्रियात्मक	11+	अमूर्त चिंतन, बीजगणित, परिकल्पना — Junior स्तर यहीं

★ इसीलिए कक्षा 6-8 में बीजगणित पढ़ाया जाता है — बच्चा अमूर्त प्रतीकों (x, y) को समझने योग्य हो चुका होता है।

20.2 आकलन (Assessment)

- रचनात्मक आकलन (Formative) — सतत, सीखने के दौरान, सुधार हेतु
- योगात्मक आकलन (Summative) — अंत में, ग्रेड हेतु
- CCE — सतत एवं व्यापक मूल्यांकन

20.3 गणितीय अवधारणाओं की कठिनाइयाँ

- गणित-भय (Maths Anxiety) — कारण: रटने पर जोर, अपमान, गति का दबाव। उपाय: खेल, समूह-कार्य, त्रुटि की स्वीकृति।
- सामान्य त्रुटियाँ: शून्य से भाग की भ्रान्ति, ऋण चिह्न की उपेक्षा, भिन्न में हर जोड़ देना ($1/2 + 1/3 = 2/5$ ❌)।

20.4 शिक्षण सहायक सामग्री (TLM)

अबेकस, गिनतारा, डायनेस ब्लॉक, ज्यामिति बॉक्स, ग्राफ पेपर, तांग्राम, भिन्न-चक्र (fraction disc), जियोबोर्ड।

अध्याय 21 — मास्टर सूत्र-पत्र (One-Page Revision)

— बीजगणित —

$$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

$$(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$$

$$a^2 - b^2 = (a+b)(a-b)$$

$$a^3 \pm b^3 = (a \pm b)(a^2 \mp ab + b^2)$$

$$a+b+c = 0 \rightarrow a^3+b^3+c^3 = 3abc$$

$$x + 1/x = k \rightarrow x^2 + 1/x^2 = k^2 - 2$$

$$\text{द्विघात: } x = [-b \pm \sqrt{b^2-4ac}]/2a$$

$$\text{मूलों का योग} = -b/a, \text{ गुणनफल} = c/a$$

— वाणिज्य गणित —

$$\text{लाभ\%} = (\text{लाभ}/\text{CP}) \times 100 \quad \text{छूट\%} = (\text{छूट}/\text{MP}) \times 100$$

$$\text{SI} = \text{PRT}/100$$

$$A = P(1 + R/100)^T \quad \text{CI} = A - P$$

$$\text{CI-SI (2 वर्ष)} = P(R/100)^2$$

$$\text{मिश्रण: (महँगा-औसत) : (औसत-सस्ता)}$$

$$\text{साझेदारी: पूँजी} \times \text{समय के अनुपात में}$$

$$\text{क्रमिक \% : } a + b + ab/100$$

— समय-कार्य-चाल —

$$2 \text{ व्यक्ति} = ab/(a+b)$$

$$\text{LCM विधि: कुल कार्य} = \text{LCM}, \text{ क्षमता} = \text{कुल/दिन}$$

$$\text{औसत चाल} = 2xy/(x+y)$$

$$\text{km/h} \rightarrow \text{m/s} = \times 5/18$$

$$\text{नाव: } u = (D+U)/2, v = (D-U)/2$$

$$\text{रेलगाड़ी: प्लेटफॉर्म} = \text{ट्रेन} + \text{प्लेटफॉर्म की लंबाई}$$

— ज्यामिति —

$$\text{त्रिभुज कोण योग} = 180^\circ, \text{ चतुर्भुज} = 360^\circ$$

$$\text{बहुभुज अंतःकोण योग} = (n-2) \times 180^\circ, \text{ बहिष्कोण} = 360^\circ$$

$$\text{पाइथागोरस: कर्ण}^2 = \text{आधार}^2 + \text{लंब}^2$$

$$\text{समरूप: क्षेत्रफल अनुपात} = \text{भुजा अनुपात}^2$$

$$\text{केन्द्रक माधिका को 2:1 में बाँटता है}$$

$$\text{अर्धवृत्त का कोण} = 90^\circ$$

$$\text{चक्रीय चतुर्भुज: सम्मुख कोण योग} = 180^\circ$$

— निर्देशांक —

$$\text{दूरी} = \sqrt{(x_2-x_1)^2 + (y_2-y_1)^2}$$

$$\text{मध्य-बिंदु} = ((x_1+x_2)/2, (y_1+y_2)/2)$$

— क्षेत्रमिति —

वर्ग a^2 , आयत lb , त्रिभुज $\frac{1}{2}bh$, वृत्त πr^2

समबाहु त्रिभुज $= (\sqrt{3}/4)a^2$

हीरोन $= \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}$

घन a^3 | घनाभ lbh | बेलन $\pi r^2 h$

शंकु $\frac{1}{3}\pi r^2 h$ | गोला $(4/3)\pi r^3$

शंकु: $l = \sqrt{r^2 + h^2}$

लंबाई n गुना $\rightarrow$ क्षेत्रफल n^2 , आयतन n^3

$1 \text{ m}^3 = 1000 \text{ लीटर}$

— सांख्यिकी —

माध्य $= \Sigma fx / \Sigma f$

बहुलक $= 3 \text{ माधिका} - 2 \text{ माध्य}$

$P(E) = \text{अनुकूल/कुल}$, $P(E) + P(E') = 1$

पाई चार्ट: $1\% = 3.6^\circ$

📌 अंतिम चेकलिस्ट (परीक्षा से 1 सप्ताह पहले)

- ☐ सर्वसमिकाएँ 1-10 बिना देखे लिख सकता हूँ
- ☐ वर्ग 1-30, घन 1-15, पहाड़े 1-25 मुँहजबानी
- ☐ प्रतिशत ↔ भिन्न तालिका याद
- ☐ CI, SI, लाभ-हानि के सूत्र में CP/MP का भ्रम नहीं
- ☐ सर्वांगसमता नियम (SSS, SAS, ASA, AAS, RHS) — और यह कि **AAA नहीं होता**
- ☐ क्षेत्रमिति के 12 सूत्र
- ☐ 5 पूर्ण Mock Test, हर बार गणित 18 मिनट में
- ☐ Error Notebook का अंतिम पाठ

शुभकामनाएँ! 🌟 रोज़ 20 प्रश्न, बिना कैलकुलेटर, घड़ी लगाकर — यही 20/20 का रास्ता है।

StudyHub Point

आपकी सफलता, हमारा संकल्प · Best Wishes for Your Exam Preparation!

हमारे साथ जुड़ें / Connect with Us



Instagram

@studyhub.point



YouTube

@studyhub.points



Telegram

studyhub_point



Website

studyhubpoint

 Study Notes & Question Banks •  PYQ Based Exam Preparation