. (255.	HOSPI	ITAL ONCOLÓGICO SOLÓN ESPI	NOSA AYA	ALA	
	APELLIDOS	NOMBRES	SEXO (M-F)	EDAD	N° HISTORIA CLÍNICA
NÚCLEO DE QUITO	ALMEIDA MIRANDA	JOSE RAFAEL	н		290.755
DIAGNÓSTICO:	INH DOGB IVE	(Hueso) Linforna dituso	ALERGIAS:		

							7.0								
1 MEDICAMENTO	2 A	DMI	NISTR	ACIÓN	İ				:				INI= INICIALE:		
	FUN= ABREVIATURA DE LA FUNCIÓN DIA - MES - AÑO														
PRESENTACIÓN, VÍA, DOSIS	01/	01/08/2023 02/08/2023 03/08/2023										2023	05/	08/2	023
UNITARIA, FRECUENCIA	HORA	INI	FUN	HORA	INI	FUN	HORA	INI	FUN	HORA	INI	FUN	HORA	INI	FUN
Cooked de alicemes				06:00	1-	<b>~</b>									
Control de glicemua capilar		_		<del> </del>	├	<u> </u>			-	ļ	_		ļ		
1															
6 am				├──	<del> </del>	<del>                                     </del>				<b> </b>	<u> </u>		<del>                                     </del>		<u> </u>
Clorus de Sodio v.91.	ده:8[	55	27												
1000 cc											-		<del>                                     </del>		<u></u>
				<del> </del>											
1V 60 cc/h															
Omepiard amp				2012	1	CV									
40 mg															
0.5			<u> </u>	├	<del>                                     </del>			$\vdash$			$\vdash\vdash$				i
13, QD				104:3:		(6)									
Enoxapanna amp.				06:00	1	8									
60 mg	18:00		Cal	<del></del>											
Sc c/12h.	10.00	ردد	E 21/												
	823)	125	Cor	<u> </u>	<u> </u>			<del>  </del>							
Sulfato de maynesio															
2 gr	[ <b> </b>		<del> </del>	<del> </del>		<del> </del> -	<b> </b>	- 1		ļ	<b> </b> -		<b> </b>	$\vdash$	
14 (20									₹ ÿ						
		-	<u></u>	08.00	┢	<u> </u>	<u></u>		1 7 C		₩		<u> </u>		L
0 3 3 4 7 7 7									<b></b>						
300 mg	20:0 <sub>0</sub>	FT	C						4				<u> </u>		
VO gan				├			<u> </u>	10		<b> </b>	-		<del> </del>		
Paracetamol Tab.															
1 91		<del>                                     </del>	<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>	<del>                                     </del>	<del> </del>	$\vdash$		-	$\vdash$		<b></b>		<b></b>
į											$\sqsubseteq$				
VO PRN				<u> </u>									<u> </u>		
Amlodipina Tab.															
<u> </u>															
1 112	<b>20:</b> 0€	~	~	<del> </del>	<del>                                     </del>			<del> </del>		-	$\vdash$		<del></del>	$\vdash$	
०६ ४०					上		<u> </u>				匚		二		
Carvedidol 3.125 Tab	<b> </b>	<u> </u>	<u> </u>	08:00	<del>                                     </del>		1	<del>                                     </del>		<del> </del>	$\vdash$	<del> </del>	<del> </del>	$\vdash\vdash$	
18.				二				匚			二				
VO An		├─-		╂	$\vdash$		<b>├</b> ─	$\vdash$	<del> </del>	├	$\vdash$	<del> </del>	<del> </del>	├	
							4								

60 mg					•	,
	APELLIDOS	NOMBRES	SEXO (M-F)	EDAD	Nº HISTORIA CLÍNICA	_
AUGU EO DE OUITO	ALMEIDA MIRANDA	JOSE RAFAEL			290.755	
DIAGNÓSTICO:			ALERGIAS:			

1 MEDICAMENTO	2 ADMINISTRACIÓN  INI= INICIALES DEL RESPONSABL  FUN= ABREVIATURA DE LA FUNCIÓN														
DDECENTACIÓN VÍA DOCIC	DIA - MES - AÑO														
PRESENTACIÓN, VÍA, DOSIS	01-0	) & ·	2023	02-	08-	2,023							,		
UNITARIA, FRECUENCIA	HORA	INI	FUN	HORA	INI	FUN	HORA	INI	FUN	HORA	INI	FUN	HORA	iNI	FUN
Levotionina Tab				06.00	Ŧ	کمح									
-															
7s ugr	I <del> </del>										_				
s and					-						-				
0V (&D															
Doxazocida Tab															
4 mg				10:00				_		<u> </u>					
ŭ					_										
VO GD															
	<b> </b>							_					<u> </u>		
Mirtazapina Tab.															
			-							<del> </del>					
	20:00	14	3												
ν.Ο QD	II			ļ											
	<b>{ </b>			<u> </u>					<u> </u>	<u> </u>					
Trime tropin				<del>                                     </del>					<del></del> -						
Sulfametoxazol	_	_			-										
800 /160 mg															
Woes-Miercolen, Viernes				<b></b>	_				ļ						
	<b>  </b>			0820	7	۲۷		_	<u> </u>	<del>                                     </del>					
Undanselvon amp															
8 mg															
diloido Soce CENA Perfusión	18.12	<u> </u>	Eat	ļ						<b> </b>					
diloido Soce CLNA perfusion Valas 4,8 posterior y c/121	1 22	,-,	<u> </u>	<del>                                     </del>	-					<del>                                     </del>	$\vdash$				
Losatadina Tab															
lo mg															
30 min. previo rituximab	18:00	<u> </u>	81							<u> </u>	_				
VO										<del></del>			1		
												;	1		
Paracetamol foo												10			
1 giamo	18:00	٠.	61									() g	<u> </u>		
Jo nun antes de rituximan	W. 00	33	<u> </u>									JC EC			
17												Z	9		
												S			
Rituximab 638 mg IV	صد:۱۹	4	~	<b> </b>								50			
diluido en soo co de CLNA			·	<b>-</b>							$\vdash$				
o.91. perfundir durante los											$\vdash$				
primeros 60 min. a soceth luego o 100 ceth. hasta Linatza y soglintoleranca DI															
	┨╞──┤														
Gemutabing 1700 mg IV				02: <b>S</b> S	~	3		$\vdash$			Н				
diluido en soo es de CLNA 0.91. Infosión en 30 nún.											-			-	
D1															
;	<b> </b>														

HABITACIÓN:

ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS (2)

forc.	HOSPITAL ONCOLÓGICO SOLÓN ESPINOSA AYALA													
	APELLIDOS		NOMBRES	5	SEXO (M-F)	EDAD	N° HISTORIA CLÍNICA							
NUCLEO DE QUITO	Almerda	Miranda	Soso	Rafael	n		290755							
DIAGNÓSTICO:					ALERGIAS:		·							

1 MEDICAMENTO	2 ADMINISTRACIÓN  INI= INICIALES DEL RESPONSAB  FUN= ABREVIATURA DE LA FUNCIÓ														
PRESENTACIÓN, VÍA, DOSIS	DIA - MES - AÑO														
UNITARIA, FRECUENCIA	O1 - C HORA	8-7	202] FUN	OZ-	C&	·203	HORA	INI	FUN	HORA	iNi	FUN	HORA	INI	FUN
Carbo platino 230 ing IV diluido en 150 cc de CLNa 0.91 portusión duran- te 90 min + lavado devena b1				O): 00	F-7	1			7						
Dexametatona amp 40 ma pasai pievio a infusion rituximab 10 Di, Dz. Dz. Dy. QD	18:0p	Şς	€~/					SOLFAINGE	ecgr.						