



NÚCLEO DE QUITO

HOSPITAL ONCOLÓGICO SOLÓN ESPINOSA AYALA

APELLIDOS

NOMBRES

SEXO (M-F)

EDAD

N° HISTORIA CLÍNICA

Navarro Peñalé

Martha Violeta

F

79a

01734

DIAGNÓSTICO:

Cáncer de Pecho estudio clínico IV

ALERGIAS: PO

1 MEDICAMENTO

PRESENTACIÓN, VÍA, DOSIS
UNITARIA, FRECUENCIAEnjuagues Bucales con CINA
+ Bicarbonato de Sodio
cada 6 horas (Respetar
hora sueño)Cloruro de Sodio 0.9%
1000cc

40c/h

Levotiroxina

880UG

06AM

VO

00

Losartem

50mg

7AM

VO

00

Carvedilol

6.25mg

VO

00

Droclon Emg IV diluido
50cc de CINA, perfusión
15min, 15min antes de la
QT, repetir a las 4 y 8 horas
de la primera dosis, luego
cada 12 horas

Metoclopramida 10mg

previo cada
comida

IV

Loratadina 10mg.

previo 30min
a cetuximab

VO

2 ADMINISTRACIÓN

INI= INICIALES DEL RESPONSABLE

FUN= ABBREVIATURA DE LA FUNCIÓN

DIA - MES - AÑO

02/08/2023			03/8/2023			04/08/2023			05/08/2023					
HORA	INI	FUN	HORA	INI	FUN	HORA	INI	FUN	HORA	INI	FUN	HORA	INI	FUN
			04:00	JP	Ent	04:00			05:00	JP	Ent			
			10:00	SS	Ent	10:00	SS	Ent	10:00					
			16:00	SS	Ent	16:00	SS	Ent	16:00					
			22:00			22:00			22:00					
			18:00	JP	Ent	18:00	JP	Ent						
			06:00	JP	g	06:00	JP	g	06:00	JP	Ent			
			07:00	JP	Ent	07:00	SS	Ent	07:00	JP	Ent			
			08:00	SS	Ent	08:00	SS	Ent	08:00					
			09:00	JP	Ent	09:00	JP	Ent	09:00					
			14:00	JP	Ent	14:00	SS	Ent	14:00					
			07:00	JP	Ent	07:00	JP	Ent	07:00	JP	Ent			
			12:00	SS	Ent	12:00	SS	Ent	12:00					
			17:00	SS	Ent	17:00	SS	Ent	17:00					
			18:00	JP	Ent									

DESCONTINUADO

DESCONTINUADO

DESCONTINUADO

DESCONTINUADO

ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS (1)

HABITACIÓN: 305 B



APELLIDOS

NOMBRES

SEXO (M-F)

EDAD

Nº HISTORIA CLÍNICA

Wangereke Peinifiel Hawthorn Violet

I

796

9/7 34

DIAGNÓSTICO:

Cáncer de recto estudio clínico IV

ALERGIAS: NO

2 ADMINISTRACIÓN

INI= INICIALES DEL RESPONSABLE

FUN= ABREVIATURA DE LA FUNCIÓN

DIA - MES - AÑO

Dexametazona 8mg
porfusión 15min, 15min previo
a cetuximab y posterior aca
IV 12 horas

Cetuximab 650 mg IV
diluido en 250cc de ClNa 0.9%
perfus. en 1 hora + lavado de
vena (0.1) posterior esperar
1 hora al término

del Cetuximab para
continuar con el resto de
la Quimioterapia.

Leucovorina 41mg IV
diluido en 250cc de ClNa
perfusión 2 horas + lavado de
vena ϕ

5 Fluorouracilo 416mg IV
diluido en 100cc de CNa
perfusión 15min + lavado de
vena de

5 Fluorocel 2496mg
IV diluido en 500cc de
CINCO perfusión de 46 horas
+ protección de luz + lavado

Gabapentina 300mg

VO EAST
8PJ7

Distinction gotero

enjoyables

Vo C/8h.

Enjuague bucales con
10cc de nistatina y tragar
cada 8h. alternar con
enjuague.

c/8h

[illegible]

DESCONTINUADO

~~SECRET~~

DESCONTINUADO

ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS (2)

HABITACIÓN: 305B