

PLAN DE EGRESO PACIENTES PALIATIVOS



ÁREA | ÉDICA SERVICIO CUIDAD TERAPIA DEL DOLOR

1. NOMBRES Y APELLIDOS DEL PACIENTE: LECHON SANDOVAL ELSA EDEUNA	DOS DEL PACIENTE:	LECHON SANDO	VAL ELSA EDE	UNA			EDAD:	43	43 ANOS	HCL Nº:	275377
MEDICO TRATANTE:	DRA ESPEJO		TELÉFONO		pg	PRÓXIMA CITA	05/10/2023	CONSULTA N°	24	HORA:	
MEDICO RESIDENTE:			TELÉFONO							TELÉFONO	
FECHA DE INGRESO	15/08/2023	***************************************	FECHA DE EGRESO:	GRESO:	22/08/2023	/2023				***************************************	
EGRESA EN :	SIL	SILLA DE RUEDAS	×	CAMILLA:			CAMINANDO:		OTROS:		
2. MEDICACIÓN Y PRESENTACIÓN	VÍA DE ADMINISTRACIÓN	¿PARA QUE ES?	ANTES DEL DESAYUNO	ESAYUNO	DESPUÉS DEL DESAYUNO	ANTES DEL ALMIJERZO	ALMUERZO	DESPUÉS DEL ALMUERZO	ANTES DE LA MERIENDA	MERIENDA	ANTES DE ACOSTARSE
BUPRENORFINA PARCHE TOMCG	TRANSDERMICO	DOLOR	COLOCAR UN PA	SCHE EN TORAX AN	TERIOR O POSTE	RIOR HOY MARTE	COLOCAR UN PARCHE EN TORAX ANTERIOR O POSTERIOR HOY MARTES Y CAMBIAR PROXIMO MARTES DE CADA SEMANA	MO MARTES DE CAU	DA SENJANA		
METOCLOPRAMIDA 10MG	BOCA	NAISEA	1 TABLETA						1 TABLETA		
LACTULOSA FRASCO	BOCA	ESTREMINIENTO									ZOML
MORFINA 10MG	SUBCUTANEO	80100	0100	COLOCAR MEDIA AMPOL	ULA O O, SML EN (en caso de dolor intenso	NTENSO				
LEVETIRACITAM SOOMS	BOCA	CONVULSIONES		2 TABLETAS						2 TABLETAS	
3. OBSERVACIONES							1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			99098998999999999999999999999	
	RECONFIR	RECONFIRMO QUE LAS INDICACIONES Y CUIDADOS PARA EL DOMICILIO FUERON ENTENDIDAS POR EL FAMILIAR Y/O PACIENTE	SICACIONES Y	CUIDADOS PAI	RA EL DOMICI	UD FUERON E	NTENDIDAS PO	R EL FAMILIAR Y	O PACIENTE	***************************************	
4.PACIENTE O FAMILIAR QUE RECIBE LA INFORMACIÓN	JAR QUE RECIBE LA	A INFORMACIÓ	~	ຶ່ນຕໍ່	ENFERMERA QUE ELABORA	QUE ELABO	RA		ENFERMERA QUE ENTREGA	QUE ENTREGA	**********
NOMBRE:				NOMBRE		Series		NOMBRE			Wigoco aud
FIRMA:				FIRMA Y SELLO	ő	SALCA MIELEO DE QUIYO Lent. Glada Visin Z Bresagela cupação asserto	t Quiro sim 2 sixerto	FIRMA Y SELLO		SELECT COT ATH AND OLD TOOK OF THE AND OLD TOOK ON OLD TOOK OF THE AND OLD TOOK ON OLD TOOK OF THE AND OLD TOOK OF THE AND OLD TOOK OF THE AND OLD	
ნ. NOTA: Se entrega guía de Benado de infusión eleastomerico con morfina al domícilio.	Henado de infusión eleas	tomerico con morfina	a al domícilia.								000000000000000000000000000000000000000

Si presenta boca seca limpiar y atomizar: Preparar % litro de agua de manzanilla + el zumo de un limón + 25 cc de aceite de glicerina cada 4 horas y cada vez que lo necesite • Coloque dentro de un recipiente de plástico rígido con tapa: Jeringuillas con agujas, ampollas, frascos de medicamentos y entregar en Consulta Externa, Hospitalización o Tomar en cuenta que para la administración de medicación se debe realizar con la jeringuilla SIN AGUIA embonando en el bionector previa desinfección. Realizar cambios de posturas cada 2 a 3 horas, colocar almohadas, cojines entre las rodillas debajo de los tobillos, dejar lo más cómoda posible. Mantener la boca húmeda: Colocar manteca de cacao, si es posible darle líquidos como jugos cítricos con cuchara, gotero o atomizador. Realizar movimientos suaves de flexión y extensión pasíva en brazos y piemas (siempre que paciente pueda motívelo a caminar « Si se presenta lengua pastosa aftas blancas, limpiar con el jugo de piña (sin cernir y sín azúcar) dos veces al día y por dos días Lavarse las manos con agua y jabón, antes y después de realizar cualquier procedimiento y de administrar el medicamento. Detectar posible: Enrojecimiento, endurecimiento, salida de líquido o sangre, dolor y dificultad para pasar la medicación. Colocar el equipo en un lugar seguro y firme NO ENCENDER FÓSFOROS, VELAS CIGARRILLOS DENTRO DE LA HABITACIÓN No convierta la hora de la comída en una batalla, proporcione un ambiente agradable y tranquilo (no obligue a comer) Si observa los signos de alarma antes mencionados retirar el catéter subcutáneo y colocar un nuevo en otro sitio PUEDE COMER LO QUE EL PACIENTE DESEE. Servir los alimentos en porciones pequeñas bien presentados. Para administrar el medicamento, tomar líquidos, comer los alimentos mantenerlo en posición sentado. Lubricar la piel de todo el cuerpo con cualquier tipo de crema hidratante dando masajes circulares. Realizar baño o aseo diario si es posible en la ducha o en la cama, mantener la piel siempre seca. Si la cantidad de aire no es suficiente abrir las ventanas, brindar ventilación directa la cara. Si se está administrando dexametasona el cambio de sitio del catéter-será a los 10 días * Lavar o limpiar la boca 3 veces al día, después de las comidas y antes de dormir Recuerde que estos desechos son considerados INFECCIOSOS — PELIGROSOS Observar frecuentemente el sitio de colocación del catéter subcutáneo. Asegurarse que coma siempre acompañado sea en la cama o el comedor Cambiar el agua del humidificador todos los días (agua hervida fría) Revisar siempre la hoja antes de administrar el medicamento. Mantener las sábanas y cobijas limpias y bien extendidas. MANEJO DE DESECHOS SANITARIOS EN DOMICILIO No limpiar el tanque el tanque con aceite o grasas **CUIDADOS DEL CATÉTER SUBCUTÁNEO CUIDADOS DEL OXIGENO CUIDADOS GENERALES CUIDADOS DE LA BOCA CUIDADOS DE LA PIEL** 9. OBSERVACIONES