

REPORTE DE EPICRISIS
"SOLCA" NUCLEO DE QUITO

CONFIDENCIAL

Fecha: 29-AUG-2023 13:56:07

Página: de 1

No. INTERNACION 140767 No. HISTORIA CLINICA 188955 Cédula 1703651834

Apellido Paterno	Apellido Materno	Primer Nombre	Segundo Nombre
X	ENRIQUEZ	ENITH	MERY DE LOS ANGELES

Edad: 70 años

DX. DE INGRESO C50.9 CA MAMA IZQUIERDA

DX. DEFINITIVO ONCOLOGICO C50.9 CA MAMA IZQUIERDA

>

PARTES OPERATORIOS ASOCIADOS

* NUMERO: 59643 FECHA OPERACION: 21-AUG-2023

OPERACIONES

Código	Procedimiento Quirúrgico	Descripción Adicional
C086	MASTECTOMIA RADICAL MODIFICADA	
V879	RECONSTRUCCION MAMARIA	

HISTORIA BREVE Y EXAMEN FISICO

PACIENTE CON CA DE MAMA BILATERAL, MAMA IZQUIERDA FUNGADA CON LESION TUMORAL 15CM DE DIAMETRO CON INFILTRACIÓN A PIEL POR LO QUE SE PLANIFICA CON DR. LANDAZURI MASTECTOMIA IZQUIERDA, SE REALIZARA CIRUGIA EN EL MISMO TIEMPO QUTURGICO, RECONTRUCCION DE MAMA IZQUIERDA CON COLGAJO DORSAL ANCHO CON CIRUGIA PLASTICA.

EF:

CUELLO NO ADENOPATIAS NO SOPLOS

TORAX SIMETRICO EXPANSIBILIDAD CONSERVADA, MAMA IZQUIERDA LESION TUMORAL DE 15CM DE DIAMETRO CON INFILTRACIÓN A PIEL QUE ALTERA LA TOTALIDAD DE LA ANATOMIA MAMARIA, LESION CUBIERTA CON COSTRA AMARILLENTA DE 10X 5CM DE DIAMETRO CON PRODUCCIÓN DE SECRECIÓN DE ASPECTO TUMORAL/PURULENTA POR LOS BORDES, RODEDA POR ERITEMA QUE COMPROMETE DESDE REGIÓN PARAESTERNAL IZQUIERDA.HASTA LINEA MAMARIA ANTERIOR, EN AXILA IZQUIERDA PALPABLE ADENOPATÍAS LA DE MAYOR TAMAÑO DE 5CM DE DIÁMETRO CORAZON RITMICO, NORMOFONETICO, NO SOPLOS AUSCULTABLES. PULMONES CON MURMULLO VESICULAR CONSERVADO, DISMUIIDO EN BASES, ABDOMEN; RHA PRESENTES NO DOLOROSO, EXTREMIDADES NO EDEMAS

HALLAZGOS RX. LABORATORIOS

EVOLUCION Favorable

PACIENTE CURSA POSQUIRURGICO MEDIATO DE MASTECTOMÍA RADICAL MODIFICADA IZQUIERDA + MASTECTOMÍA RADICAL MODIFICADA IZQUIERDA (CIRUGIA ONCOLOGICA) + RECONSTRUCCION MAMARIA CON COLGAJO DORSAL ANCHO + COLGAJO FASCIO CUTANEO DELTOPECTORAL (21/08/23). CON BUENA EVOLUCION, TOLERA DIETA, BUEN MANEJO DEL DOLOR. HERIDA CON COLGAJO PERFUNDIDO SIN SIGNOS DE INFECCION, NO COLECCIONES O HEMATOMAS. DRENAJES CON PRODUCCION DE LIQUIDO SEROSO SIN EMBARGO SE MANTIENEN DRENAJES HASTA PROXIMA VALORACION POR CLINICA DE HERIDAS. SE INDICA EL ALTA CON INDICACIONES Y SEGUIMIENTO POR CONSULTA EXTERNA.
SE PASA VISITA CON MEDICOS TRATANTES DR LANDAZURI Y DR MORENO QUIENES INDICAN ALTA + INDICACIONES.

COMPLICACIONES HOSPITALARIAS

NINGUNA

COMPLICACIONES OPERATORIAS

FORM.006

SOLCA NÚCLEO DE QUITO
Dr. Lauro Landazuri
CIRUJANO ONCOLOGO
C.I.: 0400799235

REPORTE DE EPICRISIS
"SOLCA" NUCLEO DE QUITO

CONFIDENCIAL

Fecha: 29-AUG-2023 13:56:07

Página 2 de 3

Operación 59643: NINGUNA

CONDICION Estable

TRATAMIENTO DE MASTECTOMÍA RADICAL MODIFICADA IZQUIERDA + MASTECTOMÍA RADICAL MODIFICADA IZQUIERDA (CIRUGIA ONCOLOGICA) + RECONSTRUCCION MAMARIA CON COLGAJO DORSAL ANCHO + COLGAJO FASCIO CUTANEO DELTOPECTORAL (21/08/23).

A: SALA GENERAL / DR. ONTANEDA / DR. LANDAZURI

D: CA DE MAMA + PROGRESION LOCAL Y PULMONAR

C: DE CUIDADO

A: NO REFIERE

V: CONTROL DE SIGNOS VITALES CADA 8 HORAS

A: DEAMBULACION ESTRICTA SEGUN TOLERANCIA

N: CUIDADOS DE ENFERMERIA

CONTROL DE INGESTA Y EXCRETA

OXIGENO POR CANULA NASAL PARA SATURACION MAYOR A 90%

D: DIETA BLANDA INTESTINAL + LIQUIDOS A DEMANDA

PARACETAMOL 1 GRAMO CADA 8 HORAS IV

MORFINA 5 MG IV CADA 12 HORAS SUSPENDER!!

OMEPRAZOL 40 MG IV QD

ONDANSETRON 8 MG CADA 8 HORAS IV

CEFAZOLINA 1 GR IV CADA 8 HORAS (DIA 2)

LEVOTIROXINA 50UG VIA ORAL CADA DIA

MORFINA 10 MG LIQUIDO PARENTERAL, COLOCAR MEDIA AMPOLLA EN CASO DE DOLOR

GABAPENTINA 300 MG SOLIDO ORAL, TOMAR 1 TABLETA A LAS 7AM YA LAS 7PM

LACTULOSA 65% LIQUIDO PARENTERAL, TOMAR 20 CC EN LA HORA DE SUEÑO ; SUSPENDER SI HAY DIARREA

ENOXAPARINA 60 MG SUBCUTANEO CADA DIA

RECETA (PARACETAMOL COMPRIMIDO 500 MG) TOMAR 1 TABLETA VIA ORAL CADA 8 HORAS HASTA CITA CON TERAPIA DEL DOLOR

(CEFUROXIMA TABLETA RECUBIERTA 500 MG) TOMAR 1 TABLETA CADA 12 HORAS POR 6 DIAS

(ENOXAPARINA SOLUCIÓN INYECTABLE 6 000 UI (60 MG) JERINGA PRELLENADA) COLOCAR SUBCUTANEO CADA DIA

MEDICACION TERAPIA DEL DOLOR (PACIENTE TIENE)

MORFINA 10 MG LIQUIDO PARENTERAL, COLOCAR MEDIA AMPOLLA EN CASO DE DOLOR

GABAPENTINA 300 MG SOLIDO ORAL, TOMAR 1 TABLETA A LAS 7AM YA LAS 7PM

LACTULOSA 65% LIQUIDO PARENTERAL, TOMAR 20 CC EN LA HORA DE SUEÑO ; SUSPENDER SI HAY DIARREA

MEDICACION HABITUAL (TIENE PACIENTE)

LEVOTIROXINA 50UG VIA ORAL CADA DIA

DIETA GENERAL

SENTAR EN SILLA Y DEMABULACION A TOLERANCIA

BAÑO DIARIO Y LAVADO DE HERIDAS CON AGUA Y JABON. LIMPIAR HERIDAS CON ALCOHOL TODOS LOS DIAS.

CUIDADO Y CUANTIFICACION DE DRENAJES

OXIGENO POR CANULA NASAL 0.5 L/MIN 24 HORAS PARA SATURACION MAYOR A 87%

INCENTIVOMETRO POR 10 MINUTOS CADA 2 HORAS

AGENDAR TURNO CON DRA JIMBA MEDICINA INTERNA CON PRIORIDAD PARA VALORACION DE OXIGENO SUPLEMENTARIO

AGENDAR TURNO CON CLINICA DE HERIDAS 28/08/2023

AGENDAR TURNO CON DR LANDAZURI EN 15 DIAS

AGENDAR TURNO CON DR ONTANEDA 06/09/2023

SIGNOS DE ALARMA (DOLOR QUE NO CEDE CON MEDICACION, CAMBIOS EN COLOCARACION DE COLGAJO, AUMENTO DE SECRECION O CAMBIOS EN CARACTERISTICAS DE DRENAJES, FIEBRE) ACUDIR POR EMERGENCIA

COND.PACT.HOSPITALIZADO

FECHA EPICRISIS 25-AUG-2023

FECHA INGRESO: 20-AUG-2023

FECHA ALTA: 25-AUG-2023

DIAS DE HOSPITALIZACION: 5

REPORTE DE EPICRISIS
"SOLCA" NUCLEO DE QUITO

CONFIDENCIAL

Fecha: 29-AUG-2023 13:56:07

Página 1 de 1


MEDICO TRATANTE

MD71 LANDAZURI MELO LAURO ARMANDO
ESPECIALISTA EN CIRUGIA ONCOLOGICA - CC: 0400799235

REALIZADA POR

MED0 MONCAYO REYES JOSSELYN PAULINA

FIRMA: _____



SOLCA NÚCLEO DE QUITO
Dr. Lauro Landazuri
CIRUJANO ONCOLOGO
C.I.: 0400799235