Página 1 de 3 Fecha: 1-AUGUST-2023

H. C. : 310790 Cédula : 1754536538

CA. Clasificación :

Paciente

COBOS ARMAS ISABELLA ANAHI

Fecha: 01/08/2023 00:00

Para : Consulta Externa

Médico : LEMA HUALPA GABRIELA ALEXANDRA

Enfermera :

Prescripción

Cantidad Registro de cumplimiento

(INDICACIONES PROCEDIMENTO) (QUIMIOTERAPIA SEMANA 7 DE CONSOLIDACION HDMTX (POLA)) **AUTORIZADA** (PESO: 49.9 KG)

> /(TALLA: 150 CM) /(SC: 1.44)

/(ADMISION) PEDIATRIA ONCOLOGICA:

SALA GENERAL

(DIAGNOSTICO) LEUCEMIA

LINFOBLÁSTICA AGUDA B COMÚN BAJO RIESGO + SNC 1 + QT SEMANA 7 DE

CONSOLIDACION HDMTX

(CONDICION) ESTABLE

(ALERGIAS) NO CONOCIDAS

(CONTROL DE SIGNOS VITALES) CADA

∕6 HORAS

20

30

35

40

45

(ACTITUD) SEMIFOWLER

12 (CUIDADOS DE ENFERMERIA) CONTROL DE INGESTA EXCRETA

1/3 PROTOCOLO DE PREVENCION DE CAIDAS

14 PESO DIARIO Y REPORTAR

15 PROTOCOLO DE PREVENCION DE

CAIDAS

1/6 Iniciar quimioterapia con

/DIURESIS MAYOR A 3CC/KG/HORA Y MANTENER

17 INICIAR QUIMIOTERAPIA CON PH CURINARIO MAYOR A 7 Y MANTENER

18 PRÉHIDRATAR POR DOS HORAS

49 COMUNICAR EN CASO QUE DIURESIS SEA MENOR A 590 CC EN 4 HORAS

(DIETA) DIETA PARA PACIENTE MAS *D*IETA PARA FAMILAIR POR SER

MENOR DE 18 AÑOS

/1 /infusiones:)

(DEXTROSA EN AGUA AL 5% 1000 ML

+ 34MEQ DE CLORURO DE SODIO +

20MEQ DE CLORURO DE POTASIO +

40MEQ DE BICARBONATO DE SODIO) ADMINISTRAR 288 CC/HORA POR DOS

HORAS (200ML/M2) Y LUEGO A 180

CC/HORA (3000ML/M2)

23/(MEDICAMENTOS:)

(ENJUAGUE CON BICARBONATO DE

SOLCA NUCLES DE OUTO Lic. Viviana Baria. ENFENDER CUOLEO DIRECTO ENFENDER CUOLEO DIRECTO ENFEDER SE Faio 127 9 300

SODIO) CADA 6 HORAS



BOLCA NUCLES DE QUITO Lie. Paulina Carvajai ? HET RISERS CO-DADO DIRECTO

FORM.005

Pecha: 1-AUGUST-2023

H. C.: 310790

Cédula: 1754536538

Clasificación: CA.

Paciente

COBOS ARMAS ISABELLA ANAHI

Fecha: 01/08/2023 00:00

Para: Consulta Externa

Médico : LEMA HUALPA GABRIELA ALEXANDRA

Enfermera :

Prescripción

Cantidad Registro de cumplimiento

BICARBONATO DE SODIO LIQUIDO
PARENTERAL 1 MEQ/ML (8,4%)
10ML) ADMINISTRAR 20 MEQ
DILUIDOS EN 50 CC DE DEXTROSA EN
AGUA AL 5% PASAR IV EN PERFUSION
DE 30 MINUTOS DURANTE
PREHIDRATACION

26 (BICARBONATO DE SODIO LIQUIDO PARENTERAL 1 MEQ/ML (8,4%) 10ML) ADMINISTRAR 35 MEQ IV SI PH URINARIO ES MENOR A 6

27 (BICARBONATO DE SODIO LIQUIDO PARENTERAL 1 MEQ/ML (8,4%) 10ML) ADMINISTRAR 20 MEQ IV SI /PH URINARIO ES MENOR A 7

ONDANSETRON LIQUIDO PARENTERAL 2MG/ML (4ML)) ADMINISTRAR 7 MG IV PREVIO A QUIMIOTERAPIA Y A LAS 4 Y 8 HORAS DESPUES

DEXAMETASONA LIQUIDO PARENTERAL AMG/ML (2ML)) ADMINISTRAR 14 MG IV PREVIO A QUIMIOTERAPIA Y LUEGO

30 (DEXAMETASONA LIQUIDO PARENTERAL 4MG/ML (2ML)) ADMINISTRAR 7 MG IV C/8 HORAS

(METOTREXATO SOLIDO PARENTERAL 500MG) ADMINISTRAR 3600 MG DILUIDOS EN 400CC DE SS AL 0.9% IV PERFUSION DE 24 HORAS HOY (DIA 1)

22 (POLINATO CALCICO (LEUCOVORINA)
LIQUIDO PARENTERAL 10MG/ML
(S0MG)) ADMINISTRAR 20 MG IV A
LAS 42 HORAS DE INICIADA
PERFUSION DE METOTREXATE Y LUEGO
CADA 6 HORAS POR 6 DOSIS EN
TOTAL


3) (MERCAPTOPURINA SÓLIDO ORAL 50 MG) ADMINISTRAR 75 MG (1 TABLETA Y MEDIA) VIA ORAL DOS HORAS LUEGO DE MERIENDA SIN LACTEOS (DIA 1) A DIA 6

MERCAPTOPURINA SÓLIDO ORAL 50 MG) ADMINISTRAR 50 MG (1 TABLETA) VIA ORAL DOS HORAS LUEGO DE MERIENDA SIN LACTEOS DIA 7

38 (ESPECIALES:) PENDIENTE
RESULTADO DE LCR (CITOQUÍMICO Y
CITOLOGICO)



SOLCA NUCLEO DE QUITO Dra. Gabriola Loma PEDIATRA C.I.: 1003377650



Fecha: 1-AUGUST-2023 Página 3 de 3

H. C.: 310790

Cédula : 1754536538

Clasificación: CA.

Paciente

COBOS ARMAS ISABELLA ANAHI

Fecha: 01/08/2023 00:00

Para: Consulta Externa

Médico : LEMA HUALPA GABRIELA ALEXANDRA

Enfermera :

Prescripción

Cantidad Registro de cumplimiento

(LABORATORIO:) QUIMICA SANGUINEA + NIVELES DE METOTREXATE A LAS 24, 48 HORAS DE INICIADA SU PERFUSION Y PREVIO A RESCATE CON LEUCOVORINAS 37 BACTRIM SUSPENDIDO HASTA EL ALTA

3/8, ⋌XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

YO KOUIMIOTERAPIA INTRATECAL VOLUMEN 12 ML HOY)

40 (METOTREXATO 12 MG)

1 (HIDROCORTISONA 24 MG)

47 (CITARABINA 36 MG)

Uder to the time t

PCARRYA VELE CATONIO 2 CALA MULLEO DE CUNTO 2 CALA MULLEO CATONIA POR 2 CALA MULLEO CATONIO POR 1 MERCANIO POR CATONIO POR PORTO 1 MERCANIO PORTO PORTO

SOLCA MUCLED DE OUT.



Fecha: 2-AUGUST-2023 Página 1 de :

CA. H. C. : 310790 Clasificación : Cédula : 1754536538 Paciente ... COBOS ARMAS ISABELLA ANAHI . . 73 Hospitalización 02/08/2023 00:00 Para : Fecha: Médico : d CEVALLOS VERA JAVIER FERNANDO Enfermera : Prescripción Cantidad Registro de cumplimiento (INDICACIONES DE PEDIATRIA ONCOLOGICA) (QUIMIÔTERAPIA SEMANA 7 DE CONSOLIDACION HDMTX (POLA)) **AUTORÍZÁDA** /FESO: 49.9 KG) (PALLA: 150 CM) 15 (Se: 1.44) (ADMISION) PEDIATRIA ONCOLOGICA: Sala General (DÍAGNOSTICO) LEUCEMIA ⁄Linfoelāstica aguda b común bajo RIESGO * SNC 1 + QT SEMANA 7 DE 20 CONSOLIDACION HDMTX *CONDICTON) ESTABLE MIERGIASI NO CONOCIDAS 10 (CONTROLEDE SIGNOS VITALES) CADA 6 HORAS (CONTROLES) CADA 14 (ACTITUDA) SEMIFOWLER 25 1/2 /CUIDADOS DE ENFERMERIA) CONTROL DE INGESTA EXCRETA PROTOCOLO DE PREVENCION DE CAJDAS NO. PÉSO DĽÁŘIO Y REPORTAR PROTOCOLO DE PREVENCION DE 30 CAIDAS 😿 ∠ONTROL DE PH EN CADA MICCIO. MANTENER PH URINARIO MAYOR A 7. COMUNICAR EN CASO QUE DIURESIS SEA MENOR A 590 CC EN 4 HORAS (DIETA) DIETA PARA PACIENTE MAS DIETA PARA FAMILAIR POR SER 35 MENOR DE 18 ANOS MNPUSTONES: 22 (DEXTROSA EN AGUA AL 5% 1000 ML 34MEQ DE CLORURO DE SODIO + 20MEQ DE CLORURO DE POTASIO + 40 40MEQ DE BICARBONATO DE SODIO) ADMINISTRAR A 180 CC/HORA (300QML/M2) 23/UNEDICAMENTOS:) SOUCA NUCLED DE QUITI OTA LISEN VALANCIA À MADICO PEDIATRA C.I. 19034057 17 (ENOUAGUE CON BICARBONATO DE ≲ODIO⊁ CADA 6 HORAS ABICARBONATO DE SODIO LIQUIDO PARENTERAL 1 MEQ/ML (8,4%) 10ML) ADMINISTRAR 35 MEQ IV SI

FORM.005

WED :

PH URINARIO ES MENOR A 6

Fecha: 2-AUGUST-2023 Página 2 de :

H. C. : 310790

Cédula : 1754536538

Clasificación: CA.

Paciente, ggg.

COBOS ARMAS ISABELLA ANAHI

Section 2

E-26 }

: Eki

Fecha: ::02/08/2023 00:00

Para : Hospitalización

Médico : CEVALLOS VERA JAVIER FERNANDO

Enfermera :

Prescripción

Cantidad Registro de cumplimiento

27 (BICARBONATO DE SODIO LIQUIDO PARENTERAL 1 MEQ/ML (8,4%) 10ML) ADMINISTRAR 20 MEQ IV SI PH URINARIO ES MENOR A 7

28 (ONDANSETRON LIQUIDO PARENTERAL 2MG/ML (4ML)) ADMINISTRAR 7 MG IV CADA-8 HORAS.

30 (DEXAMETASONA LIQUIDO PARENTERAL 4MG/ML-p(2ML)) ADMINISTRAR 7 MG IV C/8 HORAS

31 (METOTREKATO SOLIDO PARENTERAL 500MG) ATERMINAR DE ADMINISTRAR Y DESCONTINUAS.

2 (FOLINATOTCALCICO (LEUCOVORINA)
LIQUIDO PARENTERAL 10MG/ML
(50MG)) ADMINISTRAR 20 MG IV A
LAS 42 HORAS DE INICIADA
PERFUSION DE METOTREXATE Y LUEGO
CADA 6 HORAS POR 6 DOSIS EN
/TOTAL

38 (MERCAPTOPURINA SÓLIDO ORAL 50 MG) ADMINISTRAR 75 MG (1 TABLETA Y MEDIA) VIA ORAL DOS HORAS LUEGO DE MERIENDA SIN LACTEOS (DIA 1)7A DIA 6

MERCAPTOPURINA SÓLIDO ORAL 50
MG) ADMINISTRAR 50 MG (1
TABLETAFIVIA ORAL DOS HORAS
LUEGO DE MERIENDA SIN LACTEOS
DIA 7

75 PESPECIALES:) PENDIENTE
RESULTADO DE LCR CITOLOGICO)
36 (LABORATORIO:) METOTREXATO, UREA
7 CREATININA HOY 17::45
87 BACTRIM SUSPENDIDO HASTA EL ALTA

80 26MUNICAR NOVEDADES

Lcda. Johanna Silva v.
Cl: 1725103129
Cl: 1725103129
ENFERMERA
Reg. Senescyt. 1005-2020-2181823

SOICA NUCLEO DE QUITO Dra. Lisett Valencia A MEDICO DE DATRA C.I.: 1003-1037 17

FORM.005 -

Fecha: 2-AUGUST-2023

DENDON

न्यणालक, उन

\$0:___

Página 1 de :

H. C. : 310790 Cédula : 1754536538 CA. Clasificación: Paciente COBOS ARMAS ISABELLA ANAHI 5 Fecha: 02/08/2023 16:23 Para : Hospitalización Médico : MENDOZA MACIAS GEMA NATHALY Enfermera : Prescripción Cantidad Registro de cumplimiento 10 (ADDENDUM) MACTULOSA JARABE 65 % (200 ml)) ADMINISTRAR VIA ORAL 20 ML CADA 12 HORAS **6**85. i: 1725 15 ENFER Ą. ŗ. 20 12 MHZ 25 COMOR 🛪 🛴 4°50 A 45.00 17 3 23 H 4.4 30 aÇ^∧a. . 4 35 211 SU: 1 368 8 **《我你们的**你 40 72**3** 23/16 - 1 776 F 310.3 1016 45 4 5-1Å. FORM.005 - 546

Página 1 de :

Fecha 3-AUGUST-2023

e ent ~ *******

310790 Cédula : 1754536538 H. C. : Clasificación : CA. Paciente N. II. AGNOST CO 5 Fecha : #103/08/2023 00:00 Hospitalización Para : Médico (KESCOBAR TORRES LIZETH Enfermera : Y-ALEJANDRA Prescripción Cantidad Registro de cumplimiento 10 (INDICĂCIONES DE PEDIATRIA ON@OLOGICA) Muimiôterapia semana 7 de CONSOLTDACION HDMTX (POLA)) AUTORIZADA (PBSO: 49.9 KG) (TALLAT 150 CM) 15 (ADMISION) PEDIATRIA ONCOLOGICA: SALA GENERAL (DZAGNOSTICO) LEUCEMIA LÍNFÖÉLÁSTICA AGUDA B COMÚN BAJO 20 RIESGONT SNC 1 + QT SEMANA 7 DE CONSOLIDACION HDMTX (CONDICTON) ESTABLE 9 /ALERGIAS) NO CONOCIDAS CONTROL DE SIGNOS VITALES) CADA 6 HORAS 25 11 (ACTITOD) SEMIFOWLER 1/2 (QUIDADOS DE ENFERMERIA) CONTROL UPE INGESTA EXCRETA 13 PROTOCOLO DE PREVENCION DE LEATDASAM 14 PEGO DEARIO Y REPORTAR 30 15 PROTOCOMO DE PREVENCION DE QAIDAS ... 16 CONTROL DE PH EN CADA MICCIO. 17 MANTENER PH URINARIO MAYOR A 7. ORLA MULLEY DE AUTHORISTA PARA 18 COMUNICAR EN CASO QUE DIURESIS SEA MENOR A 590 CC EN 4 HORAS 35 19 MOIETA) DIETA PARA PACIENTE MAS SOICANU DIETA PARA FAMILAIR POR SER MENOR DE 18 AÑOS 20 (INFUSIONES:) WEXTROSA EN AGUA AL 5% 1000 ML 34MEQ.DE CLORURO DE SODIO + 40 20MEQ DÈ CLORURO DE POTASIO + $u_{40\text{MEQ}}$ de Bicarbonato de Sodio) ADMINISTRAR A 180 CC/HORA (3000ML/M2) 22 (MEDICAMENTOS:) _=0 CE/QUITO in Ercubar 23 (ENJUAGUE CON BICARBONATO DE SODIO)1 CADA 6 HORAS NTE 45 UPOLICA POLICE DE RAMOS
LOGA PICCE PER RAMOS
LOGA PICCE PER RAMOS
EMPRESENACIONES DESCRICTO
EMPRESENACIONES DESCRICTO
EMPRESENACIONES DESCRICTO
EMPRESENACIONES DESCRICTO
EMPRESENACIONES DE CONTROL D CULCA NUCLEO OF OUTO

Lic Viviana Borja P.

Lic Viviana Borja P.

MICLER CUBLO BRECTO 1. boully FORM.005 Map 920200448.8

Pecha: 3-AUGUST-PARIMAGA.

Página 2 de :

H. C. : PLOTED

Cédula : 1754536538

Clasificación: CA.

Paciente (

COBOS ARMAS ISABELLA ANAHI

Fecha: 03/08/2023 00:00

--- ĝ

Para : Hospitalización

Médico :

RSCOBAR TORRES LIZETH

ALEJANDRA

Enfermera :

Prescripción

Cantidad Registro de cumplimiento

BICARBONATO DE SODIO LIQUIDO
PARENTERAL 1 MEQ/ML (8,4%)
10ML) ADMINISTRAR 35 MEQ IV SI
PH URINARIO ES MENOR A 6
25 (BICARBONATO DE SODIO LIQUIDO
PARENTERATO ES MEQ/ML (8,4%)
10ML) ADMINISTRAR 20 MEQ IV SI
PH URINARIO ES MENOR A 7
26 (ONDANSETRON LIQUIDO PARENTERAL
2MG/ML#(4ML)) ADMINISTRAR 7 MG
IV CADA 8 HORAS.
27 (DEXAMETASONA LIQUIDO PARENTERAL
4MG/ML#(2ML)) ADMINISTRAR 7 MG

IY CADA 38 HORAS

28 (FOLINATO CALCICO (LBUCOVORINA)

LIQUIDO PARENTERAL 10MG/ML
(50MG)) ADMINISTRAR 20 MG IV A
LAS 42 HORAS DE INICIADA
PERFUSION DE METOTREXATE Y LUEGO
CADA 6 HORAS POR 6 DOSIS EN
TOTAL TE

(MERCAPTOPURINA SÓLIDO ORAL 50
MG) ADMINISTRAR 75 MG (1 TABLETA
Y MEDIA) VIA ORAL DOS HORAS
LUEGO DE MERIENDA SIN LACTEOS
JOIA 3) A DIA 6

39 (MERCAPTOPURINA SÓLIDO ORAL 50 MG) AINTNISTRAR 50 MG (1

MG) ADMINISTRAR 50 MG (1 TABLETA) VIA ORAL DOS HORAS LUEGO DE MERIENDA SIN LACTBOS DIA 7

31 (LACTULOSA JARABE 65 % (200 ml))
ADMINISTRAR VIA ORAL 20 ML CADA
12 HORAS 8SUSPENDER EN CASO DE
DIARREAS)

. (.)

33 (ESPECIALES:) PENDIENTE RESULTADO DE LCR CITOLOGICO) 34 (LABORATORIO:) METOTREXATO, UREA A CREATININA HOY 11:45 AM

38 BACTRIN SUSPENDIDO NASTA EL ALTA

36/20MUNIGAR-NOVEDADES

PERSONS

CLESS.

SOLCA NUCLEO DE QUITA SOLCA NUCLEO DE QUITA DE LAC. IVAN GAVILLAND ENFERMENO ENFERMENO PROPOSOCIALES

JE CLE STREET

SOL MUNICIPALITY CONTRACTOR OF THE SOL OF TH

COLCA NUCLEO DE OUTO COLCA NUCLEO DE POIS LIC. VICIOTO DE DIRECTO LIC. VICIOTO DE SINE 33 ENTRUCES E TAMO 13 N° 33 ENTRUCES E TAMO 13 N° 33 ENTRUCES E TAMO 13 N° 33

.

ŭ.,

Fecha: 4-AUGUST-2023

FORM.005

Página 1 de :

```
H. C. :
            310,790
                                      Cédula : 1754536538
                                                                            Clasificación :
                                                                                              CA.
      Paciente
       COBOS ARMAS ISABELLA ANAHI
           -greástic
 5
    Fecha: $504/06/2023 00:00
                                                                    Para :
                                                                            Hospitalización
           COLIDACION
   Médico RETRENDOZA MACIAS GEMA NATHALY
                                                    Enfermera :
        Prescribción
                                           Cantidad Registro de cumplimiento
10
     1/ (INDICACIONES DE PEDIATRIA
        ØNCOLOGÍCA)
        (QUIMICTERAPIA SEMANA 7 DE
        CONSOLIDACION HDMTX (POLA))
        AUTORIZADA
       (FESO: 49.9 KG)
        (TALLA 1150 CM)
        (SC: 1.44)
       (ADMISTON) PEDIATRIA ONCOLOGICA:
        SALAGENERAL
        (DIAGNOSTICO) LEUCEMIA
        LINFÓBLÁSTICA AGUDA B COMÚN BAJO
        RIESGOCS ENCS1 + OT SEMANA 7 DE
20
        CONSOLIDACION HOMTX
      (CONDICION) ESTABLE
       (LALERGEAS) NO CONOCIDAS
        (CONTROL DE SIGNOS VITALES) CADA
       6 HORAS
25
        (ACTITUD) SEMIFOWLER
     12 (CUIDADOS DE ENFERMERIA) CONTROL
      DE INGESTA EXCRETA
     A3 PROTOCÓLO DE PREVENCION DE
        CAIDAS ""
     14 PESO DÍARIO Y REPORTAR
     PROTOCOTO DE PREVENCION DE
30
        CAIDAS A
    16 ONTROE DE PH EN CADA MICCION Y
     MANTENER PH URINARIO MAYOR A 7
     ML/KG/HORA
18 CUIDADOS DE REGION PERIANAL
35
        (DIETA) DIETA PARA PACIENTE
      VDIETA PARA FAMILAIR POR SER
        MENOR DE 18 AÑOS
     20 (INFUSIONES:)
     21/(DEXTROSA-EN AGUA AL 5% 1000 ML
        + 34MEQ DE CLORURO DE SODIO +
40
        20meq de cloruro de potasio +
      √40MEQ DE BIČARBONATO DE SODIO)
        ADMINISTRAR A 180 CC/HORA
        (3000ML/M2)

√MEDICAMENTOS:)

     23 (ENJUAGUE CON BICARBONATO DE
        SODIO) CADA 6 HORAS
45
     24 (BICARBONATO DE SODIO LIQUIDO
        PARENTERAL 1 MEQ/ML (8,4%)
10MLP ADMINISTRAR 35 MEQ IV SI
        PH URINARIO ES MENOR A 6
                                   GOLCA NUCLEO DE DU
```

Lic. Ivan Gavilance L

ENFERMERO

MSP 0202001592

PNFTM

1.039 Andrea Pillajo

143

**-*-3144-2

Página 2 de :

4-AUGUST-2022 H. C. : Cédula : 1754536538 Clasificación : CA. Paciente To Ca COBOS ARMAS ISABELLA ANAHI Rengiger 04708/2023 00:00 Para: Hospitalización Médico : MENDOZA MACIAS GEMA NATHALY Enfermera : Cantidad Registro de cumplimiento Prescripción 25 (BICARBONATO DE SODIO LIQUIDO PARENTERAL 1 MEQ/ML (8,4%) 20ML) ADMINISTRAR 20 MEQ IV SI PH URINARIO ES MENOR A 7 26 (ONDANGETRON LIQUIDO PARENTERAL 2M8/ML;(4ML)) ADMINISTRAR 7 MG ZV CADA & HORAS. (DEXAMETASONA LIQUIDO PARENTERAL 4MG/MLST(2ML) ADMINISTRAR 7 MG IY CABA B HORAS 28 (FOLINARO CALCICO (LEUCOVORINA) LIQUEDO PARENTERAL 10MG/ML (BOMG) ADMINISTRAR 20 MG IV A LAS 42 HORAS DE INICIADA PERFUSION DE METOTREXATE Y LUEGO CADA 6 HORAS POR 6 DOSIS EN TOTAL ATTC Mercaptopurina sólido oral 50 MG) ADMINISTRAR 75 MG (1 TABLETA * MEDIA) VIA ORAL DOS HORAS Luego de merienda sin lacteos (DIA 4)-A DIA 6 30 (MERCAPTOPURINA SÓLIDO ORAL 50 ∕MG) ADMINISTRAR 50 MG (1 TABLETATE VIA ORAL DOS HORAS LUEGO DE MERIENDA SIN LACTEOS DIA 7 31 (LACTULOSA JARABE 65 % (200 ml)) ADMINISTRAR VIA ORAL 20 ML CADA 12 HORAS ESUSPENDER EN CASO DE 1.DIARREAG)計点支表 (MEBO) APLICAR EN REGION PERIAMAD CADA 8 HORAS (REALIZAR v PREVIOLASEO) ✓ESPECIALES:) NINGUNO 4/(LABORATORIO:) NINGUNO

Lota Andri Pillio ENEERMERA CI. 172200144-2

~b~18:--

86 COMUNICAR NOVEDADES

1. Couldy 184. SOLCA NUCLEO DE QU Lic. Ivan Gavilanez G. ENFERMERO MSP. 020708454-2

35 BACTRIM SUSPENDIDO HASTA EL ALTA

116.5 : شقيرا -676A51 5604708%2Gs W-HENT OX

15.1. \$500863IG

が構造して

25 80121

Prescripción Impresa Por:

VILLACIS SOSA JONATHAN FERNANDO

Página 1 de :

ncha (QUIT6 QUIT6		d: 10 mos	
7.4 q 1.28 3 (4)	Set		
12 mg	501	nut of the court o	
the contract of the contract o	f.) Ur.	Jonathan Julacia	
· Em.	TONATUAN C	PERIODO VILLAC	rg g0g
6 5		1719990531	
P. 18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Méd	lico kesponsabi	le
INDICACIONES DE PEDIATRIA ONCOLOGICA		#	
QUIMIOTERAFIA SEMANA 7 DE CONSOLIDACION HDMTX (POLA) DE SOLIC		#	
PESO: 49190RG		#	
TALLA: 1500 MACIGAL		*	
SCI 1.44PURINA SÓ:		#	
ADMISION TRAIT		 #	
DIAGNOSTICOAR =		" #	
CONDICION			
ALERGIAS: 415		₩ #	
CONTROL DE SIGNOS VITALES		π #	
ACTITUD TO		# #	
CUIDADOS DETENFERMERIA		#	
DIETA JEI		#	
INFUSIONES TRUE		#	
		#	
DEXTROSA EN AGUA AL 5% 1000 ML + 34MEQ DE CLORURO DE SODIO + 20MEQ DE CLORURO DE POTASIO	INTRAVENOSO	#	
MEDICAMENTOS:		#	
ENJUAGUE CON BICARBONATO DE SODIO	INTRAVENOSO	#	
MERCAPTOPURINA SÓLIDO ORAL 50 MG	ORAL	#	
MERCAPTOPURINA SÓLIDO ORAL 50 MG	ORAL	#	
LACTULOSA JARABE 65 % (200 ml)	ORAL	#	
MEBO TORO	TOPICO	#	
ESPECIALES (L.		*	
LABORATORIO:		#	
***INDICACTONES DE ALTA ***		#	
FAVOR DESACTIVAR Y HEPARINIZAR CVC		#	
MERCAPTOPURINA SÓLIDO ORAL 50 MG	ORAL	# 14 CA	PORCE
MERCAPTOPURÍNA SÓLIDO ORAL 50 MG	ORAL	#	
LACTULOSA JARABE 65 % (200 ML)	ORAL	 #	
MEBO ** LANGE	TOPICO	π <u>μ</u>	
The state of the s	101100	•	
(Adde)			

1

Pecha: 5-AUGUST-2023

ÖLÜBIMYUBÜ ÖLÜBIMYUBÜ

Prescripción Impresa Por:

VILLACIS SOSA JONATHAN FERNANDO

Página 2 de :

Prac. Num. : H.C. :310790, appaciente : COBOS ARMAS ISABELLA ANAHI 1876539 Fecha: QUITO:05/08/2023 Edad: 10 años 7.2015 RP. . % F 28 COTRIMOXAZOL (SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIM) ORAL # 30 TREINTA COMPRIMIDO 800 MG + 160 MG ***QT SEMANA 8 CONSOLIDACION*** MERCAPTOPURINA SÓLIDO ORAL 50 MG ORAL MERCAPTOPURINA; SÓLIDO ORAL 50 MG ORAL PRESCRIPCION TO THE <u>- ∕</u> pr ′ · INDICACIONES DE PEDIATRIA ONCOLOGICA QUIMIOTERAPIA SEMANA 7 DE AUTORIZADA CONSOLIDACION HDMTX (POLA) PESO: 49.9 KG TALLA: 150 CM SC: 1.44 51 ADMISION FY PEDIATRIA ONCOLOGICA: SALA GENERAL DIAGNOSTIÇO", LEUCEMIA LINFOBLÁSTICA AGUDA B COMÚN BAJO RIESGO + SNC 1 + QT SEMANA 7 DE CONSOLIDACION HDMTX CONDICTON TOS. **ESTABLE** ALERGIAS CONTRIC. NO CONOCIDAS CONTROL DE SIGNOS VITALES CADA 6 HORAS

CUIDADOS DE ENFERMERIA

ACTITUD PURING

1,360

*** . .

不缺

e Serbera e Serbige e CONTROL DE INGESTA EXCRETA

PROTOCOLO DE PREVENCION DE CAIDAS

PESO DIARIO Y REPORTAR

PROTOCOLO DE PREVENCION DE CAIDAS

CUIDADOS DE REGION PERIANAL

DIETA PARA PACIENTE MAS DIETA PARA FAMILAIR POR SER

MENOR DE 18 AÑOS

SEMIFOWLER

INFUSIONES:

7

DIETA

DEXTROSA EN AGUA AL 5% 1000 ADMINISTRAR A 87 CC/HORA (BASALES)

ML + 34MEQ DE CLORURO DE

SODIO + 20MEQ DE CLORURO DE

POTASIO

MEDICAMENTOS:

ENJUAGUE COM BICARBONATO DE CADA 6 HORAS

SODIO

(*6.70)

Property of the second

::

MERCAPTOPURINA BÓLIDO ORAL

ř÷.

ADMINISTRAR 75 MG (1 TABLETA Y MEDIA) VIA ORAL DOS HORAS LUEGO DE MERIENDA SIN LACTEOS (DIA 5) A DIA 6

POLCY MACE A STITUTE OF CONTINUES

FORM.005

• •

, r.

Teléfono de contacto: 02 2419 776

CRIQ. Fecha: 5-AUGUST-2023 Prescripción Impresa Por:

VILLACIS SOSA JONATHAN FERNANDO

Página 3 de :

H.C. : 3107905 Paciente : COBOS ARMAS ISABELLA ANAHI

Prac. Num. : 1876539

Fecha: QUITO, 05/08/2023

אכ

— JR.

JKAZOI.

TOWAKE CT

Edad: 10 años

PRESCRIPCION

36:

MERCAPTOPURINA SÓLIDO ORAL 50 MG CROVEL OF

LACTULOSA JARABE 65 % (200 ml)

iffines Trans MEBO CT C STAZOL BE

ESPECIALES:

PENANT. we e electic

LABORATORIO: ...

***INDICACIONES DE ALTA ***

FAVOR DESACTIVAR Y HEPARINIZAR CVC

MERCAPTOPURINA SÓLIDO ORAL

MERCAPTOPURINA SÓLIDO ORAL 50 MG

LACTULOSA JARABE 65 % (200 .57.6. ML)

ANA CE MEBO

COTRIMONAZOL . (SULFAMETOXAZOL"+

TRIMETOPRIM) COMPRIMIDO 800 MG + 160 MG

QT SEMANA 8 CONSOLIDACION

• •

. TH LEGE .

PANA B CONTRACT

... PE

recited in 7.1

7326 2.5 · •

* · 🚧 , VOL :

367# S (

DPUR THEORY

1

1

₽,

MERCAPTOPURINA SÓLIDO ORAL 50 MG Barry Free

MERCAPTOPURINA SÓLIDO ORAL 50 MG

ADMINISTRAR 50 MG (1 TABLETA) VIA ORAL DOS HORAS LUEGO DE MERIENDA SIN LACTEOS DIA 7

ADMINISTRAR VIA ORAL 20 ML CADA 12 HORAS 8SUSPENDER EN CASO DE DIARREAS)

APLICAR EN REGION PERIANAL CADA 8 HORAS (REALIZAR PREVIO ASEO)

NINGUNO

NINGUNO

BACTRIM SUSPENDIDO HASTA EL ALTA

COMUNICAR NOVEDADES

ADMINISTRAR 75 MG (1 TABLETA Y MEDIA) VIA ORAL DOS HORAS LUEGO DE MERIENDA SIN LACTEOS (DIA 5) A DIA 6

ADMINISTRAR 50 MG (1 TABLETA) VIA ORAL DOS HORAS LUEGO DE MERIENDA SIN LACTEOS DIA 7

ADMINISTRAR VIA ORAL 20 ML CADA 12 HORAS 8SUSPENDER EN CASO DE DIARREAS)

APLICAR EN REGION PERIANAL CADA 8 HORAS (REALIZAR PREVIO ASEO)

ADMINISTRAR 160 MG (1 TABLETA) EN EL DESAYUNO Y 80 MG (1/2 TABLETA) EN LA NOCHE MARTE, MIERCLES Y JUEVES (PROFILAXIS)

INICIAR EL 08/08/2023

ADMINISTRAR 75 MG (1 TABLETA Y MEDIA) VIA ORAL DOS HORAS LUEGO DE MERIENDA SIN LACTEOS DIA 1 A DIA 6

ADMINISTRAR 50 MG (1 TABLETA) VIA ORAL DOS HORAS LUEGO DE MERIENDA SIN LACTEOS DIA 7

ACUDIR A CONTROL POR CONSULTA EXTERNA DE PEDIATRIA EL 15/08/2023 CON RESULTADO DE EXAMENES

SOLCA HUCLED

4.3

Fecha: 4-AUGUST-2033 Prescripción Impresa Por:

MENDOZA MACIAS GEMA NATHALY

Página 1 de 4

I.C. : 310790 Paciente : COBOS ARMAS ISABELLA ANAHI	Prsc. Num. : 187	598
echa: QUITO,04/08/2023	Edad: 10 años	
	anna Julia sa Jaman	r
	SOLCA NUCLEO DE QUITO Dra, Gema Mendoza	
S SIGN Y	f.) MEDICO RESIDENTE	
and the second	GEMA NATHALY MENDOZA MACIAS	
TO LOMO 15	1310400583 Médico Responsablo	_
P. STANTED	Medico Kesponsabio	-
TRINA SOL		
INDECACIONES DE PEDIATRIA ONCOLOGICA	#	
QUIMIOTERAPIA SEMANA 7 DE CONSOLIDACION HDMTX	*	
(POLA) SOC PESO: 49.9 KG	•	
TALLA: 150 CM	· ·	
10M1 9.7	₩ •	
SC: 1.44	•	
ADMISION		
DIAGNOSTICO Dy	#	
CONDICION 4/	•	
ALERGIAS JA LTC	#	
CONTROL DE SIGNOS VITALES	#	
ACTITUD L 10MG	#	
CUIDADOS DE ENFERMERIA	#	
DIETA CURINA SOLI	#	
INFUSIONES TRACEURS	#	
DEXTROSA EN AGUA AL 5% 1000 ML + 34MEQ DE	Intravenoso #	
CLORURO DE SODIO + 20MEQ DE CLORURO DE POTASIO		
+ 40MEQ DE BICARBONATO DE SODIO		
MEDICAMENTOS (F	#	
ENJUAGUE CON BICARBONATO DE SODIO	INTRAVENOSO #	
BICARBONATO DE SODIO LIQUIDO PARENTERAL 1 MEQ/ML (8,4%) 10ML	Intravenoso #	
BICARBONATO DE SODIO LIQUIDO PARENTERAL 1 MEQ/ML (8,4%), 10ML	INTRAVENOSO #	
ONDANSETRON LIQUIDO PARENTERAL 2MG/ML (4ML)	INTRAVENOSO #	
DEXAMETASONA LIQUIDO PARENTERAL 4MG/ML (2ML)	INTRAVENOSO #	
FOLINATO CALCICO (LEUCOVORINA) LIQUIDO PARENTERAL 10MG/ML (50MG)	INTRAVENOSO #	
MERCAPTOPURINA SÓLIDO ORAL 50 MG	ORAL #	
MERCAPTOPURINA SOLIDO ORAL 50 MG	ORAL #	
LACTULOSA, JARABE 65 % (200 ml)	ORAL #	
MEBO TOTAL	TOPICO #	
ESPECIALES 10 %	5	
1 5 A 2 6 B 3 47		
~\ Luno		
SOLCA MUCLE OF THE PEDIATRA SOLCA MUCLE OF THE PEDIATRA DITTO ON COLOGA PEDIATRA OF THE PEDIATRA		
T. CAMO DILLING PEDIATRA	•	
SOLCA LIGHT ON OGA PEDIA. PINALO ON O10674A6A		
HEMACU: 1710		

-RINE

Fecha: 4-AUGUST-2023

APIA SEAC

Prescripción Impresa Por:

MENDOZA MACIAS GEMA NATHALY

Página 2 de 4

Prsc. Num. : H.C. : 310790 Paciente : COBOS ARMAS ISABELLA ANAHI 1875988 Fecha: QUITO,04/08/2023 Edad: 10 años N2 1 RP. of con-LABORATORIO ALL 1.3 ZOL (SY. ***INDICACIONES DE ALTA*** HEPARINIZAR CYC QUIMIOTERAPIA SEMANA 7 DE CONSOLIDACION (POLA) MERCAPTOPURINA SÓLIDO ORAL 50 MG ORAL. 20 VEINTE MERCAPTOPURIÑA SÓLIDO ORAL 50 MG ORAL PIA QUIMIOTERAPIA SEMANA 8 DE CONSOLIDACION (INICIAR EL: 08/08/2023) MERCAPTOPURINA SÓLIDO ORAL 50 MG MERCAPTOPURINA SÓLIDO ORAL 50 MG ONDANSETRON, COMPRIMIDO RECUBIERTO 8 MG ORAL # 10 DIEZ LACTULOSA JARABE 65 % (200 ML) ORAL # 1 UN COTRÍMOXAZOL (SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIM) ORAL # 10 DIEZ COMPRIMIDO 800 MG + 160 MG MEBO b. C. DE BEGNOS TOPICO PRESCRIPCION SAE क्षेत्रपुर्व हुन INDICACIONES DE PEDIATRIA ONCOLOGICA QUIMIOTERAPIA SEMANA 7 DE **AUTORIZADA** CONSOLIDACION HDMTX (POLA) PESO: 49.9 KG TALLA: 150 QM SC: 1.44 ٠**, ټټ** ADMISION " " 777" PEDIATRIA ONCOLOGICA: SALA GENERAL DIAGNOSTICO J., LEUCEMIA LINFOBLÁSTICA AGUDA B COMÚN BAJO RIESGO + SNC 1 + QT SEMANA 7 DE CONSOLIDACION HDMTX CONDICION 10M **ESTABLE** ALERGIAS (N) NO CONOCIDAS CONTROL DE SIGNOS VITALES CADA 6 HORAS ACTITUD RES DE PRE **SEMIFOWLER** CUIDADOS DE ENFERMERIA CONTROL DE INGESTA EXCRETA $\epsilon \mathbf{A}$ PROTOCOLO DE PREVENCION DE CAIDAS A TRACT

SOLCA NUCLEO DE QUITO Dra. Gema Mendoza MEDICO RESIDENTE C.I.: 1310400583

Bign 1 L Long L Long L Long

Fecha: 4-AUGUST-2022 Prescripción Impresa Por:

JIIDD J. M. ^LPARENTEKA

B[43] 101 ייי דן אַרידי

T 281

.

់លំវ

8 4%)

. S:

JAKA .

PAREN ...

anto de on.

PARENTERA.

B (41) 1()

MENDOZA MACIAS GEMA NATHALY

Página 3 de «

H.C. : 310790 'Affaciente : COBOS ARMAS ISABELLA ANAHI

Prsc. Num. : 1875988

Fecha: QUITO, 0 708/2023

Edad: 10 años

٦, PRESCRIPCION

£ 3.00

4.0

PESO DIARIO Y REPORTAR

PROTOCOLO DE PREVENCION DE CAIDAS

CONTROL DE PH EN CADA MICCION Y MANTENER PH URINARIO

MANTENER DIURESIS MAYOR A 3 ML/KG/HORA

CUIDADOS DE REGION PERIANAL

TON LT DIETA DIETA PARA PACIENTE MAS DIETA PARA FAMILAIR POR SER At. 21% T

MENOR DE 18 AÑOS

INFUSIONES: 4MC

•

DEXTROSA EN AGUA AL 5% 1000 ADMINISTRAR A 180 CC/HORA (3000ML/M2)

ML + 34MEQ DE CLORURO DE

SODIO + 20MEO DE CLORURO DE

POTASIO + 40MEQ DE

BICARBONATO DE SODIO

MEDICAMENTOS:

ENJUAGUE CON BICARBONATO DE CADA 6 HORAS

SODIO

BICARBONATO DE SODIO

LIQUIDO PARENTERAL 1

MEQ/ML (8,4%) 10ML

BICARBONATONDE SODIO LIQUIDO PARENTERAL 1

MEG/ML (8104) 10ML

ONDANSETRON LIQUIDO

PARENTERAL 2MG/ML (4ML)

DEXAMETASONA LIQUIDO

PARENTERAL 4MG/ML (2ML)

FOLINATO CALCICO

(LEUCOVORINA) LIQUIDO

PARENTERAL 10MG/ML (50MG) MERCAPTOPURINA SÓLIDO ORAL

50 MG

MERCAPTOPURINA SÓLIDO ORAL

50 MG

LACTULOSA JARABE 65 % (200

ml)

A. IA SI.4.

· 145

. 4 :

N.

√°c¢∧ 1

T. Fr

.023 ---

MERO

• • •

4.5

UP

. .

CIONES DE 4, ESPECIALES: SIGNOR
LABORATORIO: CVC MAYOR A 7

ADMINISTRAR 35 MEO IV SI PH URINARIO ES MENOR A 6

ADMINISTRAR 20 MEQ IV SI PH URINARIO ES MENOR A 7

ADMINISTRAR 7 MG IV CADA 8 HORAS.

ADMINISTRAR 7 MG IV CADA 8 HORAS

ADMINISTRAR 20 MG IV A LAS 42 HORAS DE INICIADA

PERFUSION DE METOTREXATE Y LUEGO CADA 6 HORAS POR 6

DOSIS EN TOTAL

ADMINISTRAR 75 MG (1 TABLETA Y MEDIA) VIA ORAL DOS

HORAS LUEGO DE MERIENDA SIN LACTEOS (DIA 4) A DIA 6

ADMINISTRAR 50 MG (1 TABLETA) VIA ORAL DOS HORAS

LUEGO DE MERIENDA SIN LACTEOS DIA 7

ADMINISTRAR VIA ORAL 20 ML CADA 12 HORAS 8SUSPENDER

EN CASO DE DIARREAS)

APLICAR EN REGION PERIANAL CADA 8 HORAS (REALIZAR

PREVIO ASEO)

NINGUNO

NINGUNO

BACTRIM SUSPENDIDO HASTA EL ALTA

SOLCA NUCLEO DE QUITO Dra. Gema Méndoza MÉDICO RESIDENTE C.I.: 1310400583

HEMATO.

DAR CWIE THE RAPIAMSENO. TIPLE ACCOMANGO: CURINA 101

SOLCA - NÚCLEO DE QUITO RECETA

Fecha: 4-AUGUST-2023

1.3

Prescripción Impresa Por:

MENDOZA MACIAS GEMA NATHALY

Página 4 de 4

H.C. : 310790 : Paciente : COBOS ARMAS ISABELLA ANAHI

Prac. Num. : 1875988

Fecha: QUITO, 04/08/2023

Edad: 10 años

PRESCRIPCION

OPINA :

: 11

COMUNICAR NOVEDADES

INDICACIONES DE ALTA

HEPARINIZAR CVCP

QUIMIOTERAPIA MEMANA 7 DE CONSOLIDACIONA (FOLA)

AUTORIZADA

MERCAPTOPURINA SÓLIDO ORAL MOL 50 MG

ADMINISTRAR 75 MG (1 TABLETA Y MEDIA) VIA ORAL DOS HORAS LUEGO DE MERIENDA SIN LACTEOS (DIA 4) A DIA 6

MERCAPTOPURÎNA SÓLIDO ORAL .. **F**d-50 MG 100-7

ADMINISTRAR 50 MG (1 TABLETA) VIA ORAL DOS HORAS

LUEGO DE MERIENDA SIN LACTEOS DIA 7

QUIMIOTERAPIA SEMANA 8 DE CONSOLIDACION (INICIAR EL: 08/08/2023)

AUTORIZADA

MERCAPTOPURINA SÓLIDO ORAL

ADMINISTRAR 75 MG (1 TABLETA Y MEDIA) VIA ORAL DOS HORAS LUEGO DE MERIENDA SIN LACTEOS DEL DIA 1 AL DIA

MERCAPTOPURINA SÓLIDO ORAL

ADMINISTRAR 50 MG (1 TABLETA) VIA ORAL DOS HORAS LUEGO DE MERIENDA SIN LACTEOS DIA 7

RE

ONDANSETRON COMPRIMIDO

....

RECUBIERTO 8 MG

ADMINISTRAR 8 MG VIA ORAL PRN (EN CASO DE NAUSEAS -VOMITOS)

LACTULOSA JARABE 65 % (200 ML)

ADMINISTRAR VIA ORAL 20 ML CADA 12 HORAS 8SUSPENDER

COTRIMOXAZOL

EN CASO DE DIARREAS)

(SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIM) COMPRIMIDO

337

.4.

**

S : N

DARES 5

ATO TE PO

8(41) 10 and the state of t

> ---****** -16

7.4%)

* **?** %

s;

SAF

Ň

ADMINISTRAR 160 MG (1 TABLETA) EN EL DESAYUNO Y 80 MG (1/2 TABLETA) EN LA NOCHE MARTE, MIERCLES Y JUEVES (PROFILAXIS)

800 MG + 160 MG 125

MEBO

3

100

1.4

1.

PREVIO ASEO) CONTROL POR CONSULTA EXTERNA CON EXAMENES DE

APLICAR EN REGION PERIANAL CADA 8 HORAS (REALIZAR

LABORATORIO 15/08/2023

PLAN EDUCACIONAL: NEUTROPENIA FEBRIL

CUIDADOS DE REGION PERIANAL

SOLCA NUCLEO DE QUITO Dra. Sema Mendoza MEDICO RESIDENTE C.I.: 1310400583

C.1. 17106744+

Fecha: 4-AUGUST-2023 Prescripción Impresa Por:

SRAPIACES.

CA SOL BIC.

4:4

MENDOZA MACIAS GEMA NATHALY

Página 1 de « H.C. : 310790 (Paciente : COBOS ARMAS ISABELLA ANAHI Prsc. Num. : 1875988 Fecha: QUITO 704/08/2023 Edad: 10 años SOLCA NUCLEO DE QUITO 1.53 Dra. Geme Mendoza MEDICO RESIDENTE C.l.: 1314400583 . . 3 (18) f.) المُعَلِّدُ اللهِ GEMA NATHALY MENDOZA MACIAS L* 1310400583 1 PRIME Médico Responsable RP. H 'PUPINA 30. INDICACIONES, DE PEDIATRIA ONCOLOGICA QUIMIOTERAFIAGEMANA 7 DE CONSOLIDACION HDMTX (POLA) DE SOULO PESO: 49.9 RG TALLA: 150 CM TO, UE 1. ADMISION, DIAGNOSTICO ; CONDICION 44 ALERGIAS SEL . CONTROL DE SIGNOS VITALES JALCI ACTITUD CUIDADOS DE ENFERMERIA DIĘTA PURINA SUL INFUSIONES DEXTROSA EN AGUA AL 5% 1000 ML + 34MEQ DE **INTRAVENOSO** CLORURO DE SODIO + 20MEQ DE CLORURO DE POTASIO + 40MEQ DE BICARBONATO DE SODIO MEDICAMENTOS: ENJUAGUE CON BICARBONATO DE SODIO **INTRAVENOSO** BICARBONATO DE SODIO LIQUIDO PARENTERAL 1 **INTRAVENOSO** MEQ/ML (8,4%) 10ML BICARBONATO DE SODIO LIQUIDO PARENTERAL 1 **INTRAVENOSO** MEQ/ML (8,4%) 10ML ONDANSETRON: LIQUIDO PARENTERAL 2MG/ML (4ML) **INTRAVENOSO** DEXAMETASONA LIQUIDO PARENTERAL 4MG/ML INTRAVENOSO FOLINATO CALCICO (LEUCOVORINA) LIQUIDO **INTRAVENOSO** PARENTERAL 10MG/ML (50MG) MERCAPTOPURINA SÓLIDO ORAL 50 MG ORAL MERCAPTOPURINA SÓLIDO ORAL 50 MG ORAL LACTULOSA JARABE 65 % (200 ml) ORAL 31.2594 MEBO TOPICO ESPECIALES: 1.7/

43

.px . . . i

Fecha: 4-AUGUST-2023

A PTA

's RIPA a

· •

Prescripción Impresa Por:

MENDOZA MACIAS GEMA NATHALY

Página 2 de «

H.C. : \$10790 Paciente : COBOS ARMAS ISABELLA ANAHI Prsc. Num. : 1875988 Fecha : QUITO, 04/08/2023 Edad: 10 años . . . F. 1818. 5. $\frac{1}{3}$ 12 SONO COMES RP. LABORATORI GARABE 4. KAZOL (ST ***INDICACIONES DE ALTA*** HEPARINIZAR CVC QUIMIOTERAPIA SEMANA 7 DE CONSOLIDACION (POLA) MERCAPTOPURINA SÓLIDO ORAL 50 MG ORAL 20 VEINTE MERCAPTOPURINA SÓLIDO ORAL 50 MG ORAL QUIMIOTERAPIA SEMANA 8 DE CONSOLIDACION (INICIAR EL: 08/08/2023) MERCAPTOPURINA SÓLIDO ORAL 50 MG MERCAPTOPURINA SÓLIDO ORAL 50 MG Я ... ONDANSETRONO COMPRIMIDO RECUBIERTO 8 MG **ORAL** 10 DIEZ LACTULOSA JARABE 65 % (200 ML) ORAL 1 UN COTRIMOXAZOL (SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIM) ORAL # 10 DIEZ COMPRIMIDO 800 MG + 160 MG M.C. TOPICO PRESCRIPCION 3 3C INDICACIONES DE PEDIATRIA ONCOLOGICA QUIMIOTERAPIA SEMANA 7 DE **AUTORIZADA** CONSOLIDACION HDMTX (POLA) PESO: 49.9 KG TALLA: 150 CM SC: 1.44 ADMISION TO THE PEDIATRIA ONCOLOGICA: SALA GENERAL DIAGNOSTICG DE P LEUCEMIA LINFOBLÁSTICA AGUDA B COMÚN BAJO RIESGO + SNC 1 + QT SEMANA 7 DE CONSOLIDACION HDMTX CONDICION **ESTABLE** ALERGIAS NO CONOCIDAS CONTROL DE SIGNOS VITALES CADA 6 HORAS ACTITUD *** SEMIFOWLER CUIDADOS DE ENFERMERIA CONTROL DE INGESTA EXCRETA PROTOCOLO DE PREVENCION DE CAIDAS r . The . . HEMATO ON COLOGA PEDIATRE 7.1 SOLCA NUCLEO DE QUITO Dra. Gema Mendoza MEDICO RESIDENTE GALI (210400583 . . . - 3 all. 13

FORM.005 EVRTNA DU "ĒL». IČNES DE P

o Hill

PERMIACERY CE SC.

Fecha: 4-AUGUST-2023 Prescripción Impresa Por:

N.

F 11+3 - XX ...

1. 1. 1.

MENDOZA MACIAS GEMA NATHALY

Página 3 de /

Paciente : COBOS ARMAS ISABELLA ANAHI H.C. ': 310790 Prsc. Num. : 1875988 Fecha:: 'QUITO,'04/08/2023 Edad: 10 años 78.3~ PRESCRIPCION FURING CON EIC 31 SA JARAHE PESO DIARIO Y REPORTAR L WATO DE SO ۲ PROTOCOLO DE PREVENCION DE CAIDAS PARENTER 6,48 CONTROL DE PH EN CADA MICCION Y MANTENER PH URINARIO ं र्तः ०५ क MAYOR A 7 -PARE. . MANTENER DIURESIS MAYOR A 3 ML/KG/HORA FIDE CUIDADOS DE REGION PERIANAL ÷ON ... DIETA DIETA PARA PACIENTE MAS DIETA PARA FAMILAIR POR SER 137 gree MENOR DE 18 AÑOS INFUSIONES: DEXTROSA EN AGUA AL 5% 1000 ADMINISTRAR A 180 CC/HORA (3000ML/M2) ML + 34MEQ DE CLORURO DE SODIO + 20MEQ DE CLORURO DE POTASIO + 40MEQ DE BICARBONATO DE SODIO MEDICAMENTOS: ENJUAGUE CON BICARBONATO DE CADA 6 HORAS SODIO SODIO SA JARABE BIÇARBONATO DE SODIO ADMINISTRAR 35 MEQ IV SI PH URINARIO ES MENOR A 6 LIQUIDO PARENTERAL 1 MEQ/ML (8,4%) 10ML BIÇARBONATO DE SODIO LIQUIDO PARENTERAL 1 ADMINISTRAR 20 MEQ IV SI PH URINARIO ES MENOR A 7 MEQ/ML (874%) 10ML ONDANSETRON LIQUIDO ADMINISTRAR 7 MG IV CADA 8 HCRAS. PARENTERAL 2MG/ML (4ML) DEXAMETASONA LIQUIDO ADMINISTRAR 7 MG IV CADA 8 HORAS PARENTERAL 4MG/ML (2ML) FOLINATO CALCICO ADMINISTRAR 20 MG IV A LAS 42 HORAS DE INICIADA PERFUSION DE METOTREXATE Y LUEGO CADA 6 HORAS POR 6 (LEUCOVORINA) LIQUIDO DOSIS EN TOTAL PARENTERAL JOMG/ML (50MG) MERCAPTOPURINA SÓLIDO ORAL ADMINISTRAR 75 MG (1 TABLETA Y MEDIA) VIA ORAL DOS Rain. HORAS LUEGO DE MERIENDA SIN LACTEOS (DIA 4) A DIA 6 50 MG MERCAPTOPURINA SÓLIDO ORAL ADMINISTRAR 50 MG (1 TABLETA) VIA ORAL DOS HORAS LUEGO DE MERIENDA SIN LACTEOS DIA 7 50.MG TON COLER

EN CASO DE DIARREAS)

PREVIO ASEO)

NINGUNO

NINGUNO

BACTRIM SUSPENDIDO HASTA EL ALTA CANUCIEO DE QUITO `.**?**} 7 This This was HEMATO ONCOLOGA FORATRA 4.3 C.1: 7710678464

LACTULOSA JARABE 65 % (200

MICESON.

- Rake

PEON COMES MICABABE

ESPECIALES:

LABORATORIO:

ASOL HER

13.8C" "

SOLCA NUCLEO DE QUITO Dra. Gema Mendoza MEDIPO RESIDENTE C.I., 1370400583

ADMINISTRAR VIA ORAL 20 ML CADA 12 HORAS 8SUSPENDER

APLICAR EN REGION PERIANAL CADA 8 HORAS (REALIZAR

٤

1.

ml)

MEBO

Fecha: 4-AUGUST-2023

1

ناي دور

Prescripción Impresa Por:

MENDOZA MACIAS GEMA NATHALY

Página 4 de 4

H.C. :: 310790

Paciente : COBOS ARMAS ISABELLA ANAHI

Prsc. Num. : 1875988

Fecha: QUITO, 04/08/2023

प्रकार दिराःः

PI A.LOBJ ...

PIRINA

: 20N

PURINA SON

Edad: 10 años

13, PRESCRIPCION ANTINA -

. .

. 1

COMUNICAR NOVEDADES

INDICACIONES DE ALTA

HEPARINIZAR CVC ?**

QUIMIOTERAPIA SEMANA 7 DE CONSOLIDACION (POLA)

MERCAPTOPURINA SÓLIDO ORAL LOL

MERCAPTOPURÍNA SÓLIDO ORAL

50 MG 3D1 **AUTORIZADA**

ADMINISTRAR 75 MG (1 TABLETA Y MEDIA) VIA ORAL DOS HORAS LUEGO DE MERIENDA SIN LACTEOS (DIA 4) A DIA 6

ADMINISTRAR 50 MG (1 TABLETA) VIA ORAL DOS HORAS

LUEGO DE MERIENDA SIN LACTEOS DIA 7

QUIMIOTERAPIA SEMANA 8 DE CONSOLIDACION (INICIAR EL: 08/08/2023)

MERCAPTOPURINA SÓLIDO ORAL

MERCAPTOPURINA SÓLIDO ORAL

50 MG ه خان ښکوه PARTMIFT

ONDANSETRON COMPRIMIDO

RECUBIERTO 8 MG LACTULOSA JARABE 65 % (200

ML)

COTRIMOXAZOL (SULFAMETOXAZOL +

TRIMETOPRIMÍ COMPRIMIDO 800 MG + 160 MG - V

177**9**7

RIF

ACIM L con fire

Aie.

- 161 . N

· · · · •

3-1467 101 76

SA TARABE

. . -;-

MEBQ

AUTORIZADA

ADMINISTRAR 75 MG (1 TABLETA Y MEDIA) VIA ORAL DOS HORAS LUEGO DE MERIENDA SIN LACTEOS DEL DIA 1 AL DIA

ADMINISTRAR 50 MG (1 TABLETA) VIA ORAL DOS HORAS LUEGO DE MERIENDA SIN LACTEOS DIA 7

ADMINISTRAR 8 MG VIA ORAL PRN (EN CASO DE NAUSEAS -VOMITOS)

ADMINISTRAR VIA ORAL 20 ML CADA 12 HORAS 8SUSPENDER EN CASO DE DIARREAS)

ADMINISTRAR 160 MG (1 TABLETA) EN EL DESAYUNO Y 80 MG (1/2 TABLETA) EN LA NOCHE MARTE, MIERCLES Y JUEVES (PROFILAXIS)

APLICAR EN REGION PERIANAL CADA 8 HORAS (REALIZAR PREVIO ASEO)

CONTROL POR CONSULTA EXTERNA CON EXAMENES DE LABORATORIO 15/08/2023

PLAN EDUCACIONAL: NEUTROPENIA FEBRIL

CUIDADOS DE REGION PERIANAL

SA TARABE . PARENT \$ 2 4.45

Allen Lake College Col HEMATO, ONCOLOGA PROMAS

SOLCA NUČLĖO DE QUITO Dra, Gemis Mendoza MEDICO RESIDENTE G.I.: 1310400583

31

.4

FORM.005 N108: FORTH ENC Teléfono de contacto: 02 2419 776

7 čiv

ALTAGONAS SODIO PREGARBIA

Prescripción Impresa Por:

MENDOZA MACIAS GEMA NATHALY

Página 1 de 4

H.C.: 310790 Paciente: COBOS ARMAS ISABELLA ANAHI	Prsc. Num. : 187598
Fecha: 201TO, 04/08/2023	Edad: 10 años
***	SOLCA NUCLES DE QUITO
	Dra, Gemá Mendoza f.) MEDICO RESIDENTE
	GEMA NATHALY MENDOSA MACIA
On-	1310400583
RP.	Médico Responsable
INDICACIONES DE PEDIATRIA ONCOLOGICA	#
QUIMIOTERAPIA SEMANA 7 DE CONSOLIDACION HDMTX (POLA) 3 SODIO	*
PESO: 49. S. RECARBON	
TALLA: 150 CM	*
SC: 1.44	*
ADMISION - T	•
DIAGNOSTICO E	
CONDICION 164/9. %1	.
ALERGIAS	•
CONTROL DE SIGNOS VITALES	•
ACTITUD (C)	
CUIDADOS DE ENFERMERIA	*
DIETA (A.C.)	#
INFUSIONES:	#
DEXTROSA EN AGUA AL 5% 1000 ML + 34MEQ DE CLORURO DE SODIO + 20MEQ DE CLORURO DE POTASIO + 40MEQ DE BIGARBONATO DE SODIO	Intravenoso #
MEDICAMENTOS: NOTE OF	#
ENJUAGUE CON BICARBONATO DE SODIO	INTRAVENOSO #
BICARBONATO DE SODIO LIQUIDO PARENTERAL 1 MEQ/ML (8,4%) 10ML	INTRAVENOSO #
BICARBONATO DE SODIO LIQUIDO PARENTERAL 1 MEQ/ML (8,4%) (310ML)	Intravenoso #
ONDANSETRON LIQUIDO PARENTERAL 2MG/ML (4ML)	INTRAVENOSO #
DEXAMETASONA LIQUIDO PARENTERAL 4MG/ML (2ML)	Intravenoso #
FÓLINATO CALCICO (LEUCOVORINA) LIQUIDO PARENTERAL 10MG/ML (50MG)	Intravenoso #
MERCAPTOPURINA SÓLIDO ORAL 50 MG	ORAL #
MERCAPTOPURINA SÓLIDO ORAL 50 MG	ORAL #
LACTULOSA JARABE 65 % (200 ml)	ORAL #
MEBO: THE CVILL	TOPICO #
ESPECIALES PTA SERU ACTIONA PROT TRINA TEAT TEAT	#
0473	

TIN:

PER ORPRADEOEN Fecha: 4-AUGUST-QB23

. CAS

PTA SE TRINA 301.

Prescripción Impresa Por:

MENDOZA MACIAS GEMA NATHALY

Página 2 de 4

Prac. Num. : H.C. : 310790 Paciente : COBOS ARMAS ISABELLA ANAHI 1875988 Fecha: QUITO, 04/08/2023 Edad: 10 años RP. ~ CC LABORATORIO: RV . . 1 ***INDICACIONES DE ALTA*** HEPARINIZAR ČÝC QUIMTOTERAPIA SEMANA 7 DE CONSOLIDACION (POLA) MERCAPTOPURINA SÓLIDO ORAL 50 MG 20 ORAL VEINTE MERCAPTOPÜÑĪÑADSÓĽÍDO ORAL 50 MG ORAL TC. CA HAPIA San QUIMIOTERAPIONSEMANA 8 DE CONSOLIDACION (INICIAR EL: KO8/08/2023) MERCAPTOPURINA SÓLIDO ORAL 50 MG MERCAPTOPURINA SÓLIDO ORAL 50 MG ONDANSETRON COMPRIMIDO RECUBIERTO 8 MG ORAL 10 DIEZ LACTULOSA JARABE 65 % (200 ML) ORAL 1 UN COTRIMOXAZOL (SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIM) ORAL 10 DIEZ COMPRIMIDO 800 MG + 160 MG TOPICO PRESCRIPCION " TEXAS LEFENAL INDICACIONES DE PEDIATRIA ONCOLOGICA /AUTORIZADA QUIMIOTERAPÌA SEMANA 7 DE CONSOLIDACION HDMTX (POLA) PESO: 49.9 KG TALLA: 150, 24 SC: 1.44 .44. ADMISION " * PEDIATRIA ONCOLOGICA: SALA GENERAL LEUCEMIA LINFOBLÁSTICA AGUDA B COMÚN BAJO RIESGO + DIAGNOSTICO \$NO∕1 + QT SEMANA 7 DE CONSOLIDACION HDMTX ESTABLE CONDICION **ALERGIAS** /NO CONOCIDAS Capa 6 horas CONTROL DE SIGNOS VITALES ACTITUD 1.8:09. SEMI FOWLER CUIDADOS DE AENFERMERIA CONTROL DE INGESTA EXCRETA SOLCA MUCLEO DE QUITO SOLCA MUCLEO DE QUITO ENFERMER DE A GENTA MENDOZA MEDICO DE QUITO MEDICO DE QUITO MEDICO DE QUITO MEDICO DE ADDANTE COMO DE CONTRA DE PROTOCOLO DE PREVENCION DE CAIDAS - 34

7 \mathbf{C} C) ZN.

Fecha: 4-AUGUST-3828 all tour Prescripción Impresa Por:

ARE.

Â(N Li 335 2HG-255

3. (P\$)

MENDOZA MACIAS GEMA NATHALY

Página 3 de 4

Prac. Num. : H.C. : 310790 - Paciente : COBOS ARMAS ISABELLA ANAHI 1875988 Fecha : QUITO, 04,08/2023 Edad: 10 años 1.616. И PRESCRIPCION Ė PESO DIARIO Y REPORTAR PROTOCOLO DE PREVENCION DE CAIDAS RE . 🔊 CONTROL DE PH EN CADA MICCION Y MANTENER PH URINARIO **1 MAYOR A 7 . (N) . "AREN" MANTENER DIURESIS MAYOR A 3 ML/KG/HORA 1. 341 . . CUIDADOS DE REGION PERIANAL RON LIC. DIETA DIETA PARA PACIENTE MAS DIETA PARA FAMILAIR POR SER ALIZNG, SEL MENOR DE 18 AÑOS INFUSIONES AME 'ML DEXTROSA EN AGUA AL 5% 1000 ADMINISTRAR A 180 CC/HORA (3000ML/M2)
ML + 34MEQ DE CLORURO DE
SODIO + 20MEQ DE CLORURO DE POTASIO + 40MEQ DE BICARBONATO DE SODIO MEDICAMENTOS: ENJUAGUE CON BICARBONATO DE CADA 6 HORAS SODIO BICARBONATO DE SODIO ADMINISTRAR 35 MEQ IV SI PH URINARIO ES MENOR A 6 LÌQUIDO PARENTERAL 1 MEQ/ML (8,4%) 10ML BICARBONATONDE SODIO ADMINISTRAR 20 MEQ IV SI PH URINARIO ES MENOR A 7 LIQUIDO PARENTERAL 1 MEQ/ML (8,4%) ONDANSETRON LIQUIDO ADMINISTRAR 7 MG IV CADA 8 HORAS. PARENTERAL 2MG/ML (4ML) DEXAMETASONA LIQUIDO ADMINISTRAR 7 MG IV CADA 8 HORAS (2ML) PARENTERAL 4MG/ML ADMINISTRAR 20 MG IV A LAS 42 HORAS DE INICIADA FOLINATO 'CALCICO' PERFUSION DE METOTREXATE Y LUEGO CADA 6 HORAS POR 6 (LEUCOVORINA) LIQUIDO DOSIS EN TOTAL PARENTERAL 10MG/ML (50MG) ADMINISTRAR 75 MG (1 TABLETA Y MEDIA) VIA ORAL DOS MERCAPTOPURINA SÓLIDO ORAL MORAS LUEGO DE MERIENDA SIN LACTEOS (DIA 4) A DIA 6 50 MG .17 ADMINISTRAR 50 MG (1 TABLETA) VIA ORAL DOS HORAS MERCAPTOPURINA SÓLIDO ORAL LUEGO DE MERIENDA SIN LACTEOS DIA 7 ADMINISTRAR VIA ORAL 20 ML CADA 12 HORAS 8SUSPENDER LACTULOSA JARABE 65 % (200 EN CASO DE DIARREAS) ml) APLICAR EN REGION PERIANAL CADA 8 HORAS (REALIZAR MEBO. OC NES PREVIO ASEO) ESPECIALES: FT MINGUNO LABORATORIO: ningano SCTOIM SUSPENDIDO HASTA EL ALTA A TA S Jillanera My Pullage LOGA PEDIATRA Leda And Pillale ENFERMERA BRITADECKOLC T Did 171067446A X . . 2623 HEMATO SOLCA NUCLED BE QUITO CI. 172480144-2

Dra. Gema Mendoza Menico Residente Gili 1310400583

OLCA MICLEO DE QUITO

LIE: IVAN GAVILLING G. ENFERMERO MAP 920208-5-7

۲,

4

.. .

4.7

-) C

ĊL , R

JURINA 3 Fecha: 4-AUGUST-2023

Prescripción Impresa Por:

MENDOZA MACIAS GEMA NATHALY

Página 4 de 4

PUKINA COM :310790 16@aciente : COBOS ARMAS ISABELLA ANAHI

Prac. Num. : 1875988

Fecha: QUITO 04/08/2023

Edad: 10 años

ACTON . بادر.

2 mg PRESCRIPCION OF IN-

116

CFFAMATE . EB.

ÇOMUNICAR NOVEDADES

Sol Caraller Englisher C. ENFERMERO MSP: 020208456-2

INDICACIONES DE ALTA

HEPARINIZAR CVC.

08/08/2023) 🕾

OUIMIOTERAPÎA SEMANA 7 DE CONSOLIDACION (POLA)

MERCAPTOPURINA SÓLIDO ORAL 50 MG ALOL'

MERCAPTOFURINAL SÓLIDO ORAL

50 MG -- 160-MG-7-

in Superior QUIMIOTERAPIA SEMANA 8 DE **AUTORIZADA** CONSOLIDACIÓN (INICIAR EL:

MERCAPTOPURINA SÓLIDO ORAL

MERCAPTOPURINA SÓLIDO ORAL

50 MG 97

ONDANSETRON COMPRIMIDO RECUBIERTO 8' MG

LACTULOSA JARABE 65 % (200 ML)

COTRIMOXAZOL (SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIM) COMPRIMIDO 800 MG + 160 MG-

A CEL

. 44 Ţţ

XXX XXX

RE. :41

Ĭ.

MEBO

<u>}</u>:

: \$. 20 3.7

ADMINISTRAR 75 MG (1 TABLETA Y MEDIA) VIA CRAL DOS HORAS LUEGO DE MERIENDA SIN LACTEOS (DIA 4) A DIA 6 ADMINISTRAR 50 MG (1 TABLETA) VIA ORAL DOS HORAS

LUEGO DE MERIENDA SIN LACTEOS DIA 7

LUEGO DE MERIENDA SIN LACTEOS DIA 7

AUTORIZADA

ADMINISTRAR 8 MG VIA ORAL PRN (EN CASO DE NAUSEAS -VOMITOS)

ADMINISTRAR 75 MG (1 TABLETA Y MEDIA) VIA ORAL DOS HORAS LUEGO DE MERIENDA SIN LACTEOS DEL DIA 1 AL DIA

ADMINISTRAR 50 MG (1 TABLETA) VIA ORAL DOS HORAS

ADMINISTRAR VIA ORAL 20 ML CADA 12 HORAS 8SUSPENDER EN CASO DE DIARREAS)

ADMINISTRAR 160 MG (1 TABLETA) EN EL DESAYUNO Y 80 MG (1/2 TABLETA) EN LA NOCHE MARTE, MIERCLES Y JUEVES (PROFILAXIS)

APLICAR EN REGION PERIANAL CADA 8 HORAS (REALIZAR PREVIO ASEO)

CONTROL POR CONSULTA EXTERNA CON EXAMENES DE LABORATORIO 15/08/2023

PLAN EDUCACIONAL: NEUTROPENIA FEBRIL

CUIDADOS DE REGION PERIANAL

TO LECTION ON THOUSE AND A SOLUTION OF A A CANADA SOLUTION OF A A CANADA SOLUTION OF A A CANADA SOLUTION OF A CANA

TO DE CUNO

Tillanin i

SOLCA NUCLEO DE QUITO Dra. Gerra Mendoza MEDICO RESIDENTE C.L: 1310400563

Ordes/Descargo Nro:	196242 SF	Egreso Nro:	2571651	Pégina Nre.	-	•
Fecha Envio:	05/08/2023	•				
Pacieste:	COBOS ARMAS ISABELLAANAHI					
18st. Clinica:	310790	c C	£75453653R			
Arta Estrega:	FARMACIA	Plan Social:				
Estregado por:	PILLAJO CAMPO IVĒTH ALEJANDRA	Area Solichan:	Area Solichan: HOSPITAL#ZACION 2			
		New Came:	206-B			
Codigo	Descripción				Cantidad	Presentación
00005515712 00005714612 0000502255	HEPARINA (NO FRACCIONADA) SOLL (TION INVIKTABLE 5.000 ULM (5 ml) MERCAPTOPURINA COMPRIMINO 50 mg COTRINONAZOL (SULFAMETONAZO) TRINIETOPRIMI COMPRIMIDO 800 mg - 160 mg	N.E 5.000 UT md (smt} 800 mg ~ 160 mg		1,000.0 14,000.0 14,000.0	5 = =

Recibe Conforme: March M

Batrega:

SOLCA - NÚCLEO DE QUITO

STATE OF LAND

Página 1 de :

SOLCA - NUCLEO		
Pecha: 5-AUGUST-2023 Prescripción Impresa Por: VII	LLACIS SOSA JONATHAN FERNANDO Pág	ine
i.C. : 310790 Paciente : COBOS ARMAS ISABELLA ANAH	I Prsc. Num. 1876	53
echa : QUITO, 05/08/2023	Edad: 10 dho	
	SOLCA NUCLEO DE MÚTTO Br. Jonathan Villaciá	
Marie Carlos	MEDICO PEST TE	
·	JONATHAN PERNANDO VILLACIS	80
	1719990531	
P	Médico Responsable	
	1	
INDICACIONES DE PEDIATRIA ONCOLOGICA	•	
QUIMIOTERAPIA SEMANA 7 DE CONSOLIDACION HDMTX (POLR) SOLI.	*	
PESO: 49.9 KG	#	
TALLA: 1500 MBICA	*	
SC: 2.44 URITA SCD.	#	
ADMISION 'URINA, SÓL.	#	
DIAGNOSTICO A BANK CO	#	
CONDICION	#	
ALERGIAS 3.	#	
CONTROL DE SIGNOS VITALES	#	
ACTITUDONA."	#	
CUIDADOS DE ENFERMERIA	#	
DIETA N	#	
INFUSIONES: 🎘	#	
DEXTROSA EN ÂGUA AL 5% 1000 ML + 34MEQ DE CLORURO DE SODIO + 20MEQ DE CLORURO DE POTASIO	INTRAVENOSO #	
MEDICAMENTOS:	#	
ENJUAGUE CON BICARBONATO DE SODIO	INTRAVENOSO #	
MERCAPTOPURINA SÓLIDO ORAL 50 MG	ORAL #	
MERCAPTOPURINA SÓLIDO ORAL 50 MG	ORAL #	
LACTULOSA JARABE 65 % (200 ml)	ORAL #	
MEBO A.S.	TOPICO #	
ESPECIALES:	#	
LABORATORIO:	#	
***INDICACIONES DE ALTA ***	#	
FAVOR DESACTIVAR Y HEPARINIZAR CVC	#	
MERCAPTOPURINA SÓLIDO ORAL 50 MG	ORAL # 14 CATO	RCI
MERCAPTOPURINA SÓLIDO ORAL 50 MG	ORAL #	
LACTULOSA JARABE 65 % (200 ML)	ORAL #	
MEBO \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	TOPICO #	
Free State (RC)		
Page 1970 A TOTAL L QSM		

...11

Fecha: 5-AUGUST-2023 Prescripción Impresa Por:

4 1

18

WW.

VILLACIS SOSA JONATHAN FERNANDO

Página 2 de :

Prac. Num. : 1876539 H.C. : 310790 Paciente : COBOS ARMAS ISABELLA ANAHI Edad: 10 años Fecha : QUITOC05X0872023 -* :RO 31. CK

RP.

30 TREINTA COTRIMOXAZOL (SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIM) ORAL COMPRIMIDO 800 MG + 160 MG ***OT SEMANA 8 CONSOLIDACION*** MERCAPTOPURINA SÓLIDO ORAL 50 MG ORAL MERCAPTOPURINA SÓLIDO ORAL 50 MG ORAL

PRESCRIPCION

INDICACIONES DE PEDIATRIA ONCOLOGICA

THE R

75 T:

QUIMIOTERAPIA SEMANA 7 DE AUTORIZADA

CONSOLIDACION HDMTK (POLA)

PESO: 49.9-KG TALLA: 150 CM

SC:. 1.44

ADMISION THE PEDIATRIA ONCOLOGICA: SALA GENERAL

DIAGNOSTICO LEUCEMIA LINFOBLÁSTICA AGUDA B COMÚN BAJO RIESGO +

SNC 1 + QT SEMANA 7 DE CONSOLIDACION HDMTX

CONDICION **ESTABLE**

ALERGIAS NO CONOCIDAS m

CONTROL DE SIGNOS VITALES CADA 6 HORAS

ACTITUD : BONA :: SEMIFOWLER

CUIDADOS DE ENFERMERIA CONTROL DE INGESTA EXCRETA 4 (46)

PROTOCOLO DE PREVENCION DE CAIDAS

TOMMES -PESO DIARIO Y REPORTAR TRIBA DE

PROTOCOLO DE PREVENCION DE CAIDAS

day Achillian ¥6 6 CUIDADOS DE REGION PERIANAL

49. 19. 19 M DIETA DIETA PARA PACIENTE MAS DIETA PARA FAMILAIR POR SER

MENOR DE 18 AÑOS

INFUSIONES:

DEXTROSA EN AGUA AL 5% 1000 ADMINISTRAR A 87 CC/HORA (BASALES)

ML + 34MEQ DE CLORURO DE

SODIO + 20MEQ DE CLORURO DE

POTASIO

MEDICAMENTOS:

ENJUAGUE CON BICARBONATO DE CADA 6 HORAS

*****--

MERCAPTOPURINA SÓLIDO ORAL ADMINISTRAR 75 MG (1 TABLETA Y MEDIA) VIA ORAL DOS

50 MG HORAS LUEGO DE MERIENDA SIN LACTEOS (DIA 5) A DIA 6

iva: OR see to 研究學學 37637 C

主持協 者の教徒のからな

. . .

877 170

FORM.005 : :

Fecha: 5-AUGUST-2023

Prescripción Impresa Por:

VILLACIS SOSA JONATHAN FERNANDO

Página 3 de :

H.C. : 310790 Paciente : COBOS ARMAS ISABELLA ANAHI

Prec. Num. : 1876539

Pecha : QUITQ. 05/08/2023

Edad: 10 años

PURINA 3:

PRESCRIPCION

TURINA 3 MERCAPTOPURINA SÓLIDO ORAL 4.54%

٠À

4. 122

3.5 Kilga ist.

ml)

MICHO

ESPECIALES: AZ.

LABORATORIQE M: Ġ, INVA 8

AL TON"

LACTULOSA JARABE 65 % (200

ADMINISTRAR 50 MG (1 TABLETA) VIA ORAL DOS HORAS LUEGO DE MERIENDA SIN LACTEOS DIA 7

ADMINISTRAR VIA ORAL 20 ML CADA 12 HORAS 8SUSPENDER EN CASO DE DIARREAS)

APLICAR EN REGION PERIANAL CADA 8 HORAS (REALIZAR PREVIO ASEO)

NINGUNO

NINGUNO

BACTRIM SUSPENDIDO HASTA EL ALTA

COMUNICAR NOVEDADES

***INDICACIONES DE ALTA ***

FAVOR DESACTIVARDY HEPARINIZAR CVC

MERCAPTOPURINA SÓLIDO ORAL

MERCAPTOPURINA SÓLIDO ORAL

50 MG LACTULOSA JARABE 65 % (200 ~:Ç:

ML)

MERO

3

٠,

٠,

. De . 1

COTRIMOXAZOL (SULFAMETOXAZOL +

TRIMETOPRIM) · COMPRIMIDO

. .

è.

800 MG + 160 MG

OT SEMANA 8 CONSOLIDACION

MERCAPTOPURINA SÓLIDO ORAL A PAGE

MERCAPTOPURÎNA BOLIDO ORAL

50 MG 19. BC

: 12.75

111

L_x_Pacton

accommon .

intilis i cen dan

*** XO

1. 22. ... - þ

to ew

1. 15. 18 : N)

ADMINISTRAR 75 MG (1 TABLETA Y MEDIA) VIA ORAL DOS HORAS LUEGO DE MERIENDA SIN LACTEOS (DIA 5) A DIA 6

ADMINISTRAR 50 MG (1 TABLETA) VIA ORAL DOS HORAS LUEGO DE MERIENDA SIN LACTEOS DIA 7

ADMINISTRAR VIA ORAL 20 ML CADA 12 HORAS 8SUSPENDER EN CASO DE DIARREAS)

APLICAR EN REGION PERIANAL CADA 8 HORAS (REALIZAR PREVIO ASEO)

ADMINISTRAR 160 MG (1 TABLETA) EN EL DESAYUNO Y 80 MG (1/2 TABLETA) EN LA NOCHE MARTE, MIERCLES Y JUEVES

(PROFILAXIS)

INICIAR EL 08/08/2023

ADMINISTRAR 75 MG (1 TABLETA Y MEDIA) VIA ORAL DOS HORAS LUEGO DE MERIENDA SIN LACTEOS DIA 1 A DIA 6

ADMINISTRAR 50 MG (1 TABLETA) VIA ORAL DOS HORAS LUEGO DE MERIENDA SIN LACTEOS DIA 7

ACUDIR A CONTROL POR CONSULTA EXTERNA DE PEDIATRIA EL 15/08/2023 CON RESULTADO DE EXAMENES

SOLCA NUCKEO