

1 MEDICAMENTO	2 ADMINISTE	RACIÓN			INI= INICIALES DEL RESPONSABLE					
PRESENTACIÓN, VÍA, DOSIS	DIA - MES - AÑO									
UNITARIA, FRECUENCIA	23/08/2023 HORA INI FUN	24/08/2023 HORA INI FUN	25/08/2023	26/08/2023	27/08/2023					
Control de glicemia	HORA INI PUN	HORA INI FUN	HORA INI FUN	HORA INI FUN	HORA INI FUN					
Conceptor and discountry	22:03 CD 60.F	 								
An Ph	26 W)	33.00								
Claruro de Sodio										
1000 W	13:00 1211 2	•								
·										
1 V 40cı										
Enoxaparing										
60 mg	20:00 CO ECF	70:00								
sc On										
Fluoxetina tab		of who est	07:00 CU							
20 mg										
V.O GD										
Clonezepam										
2 my	21:0' CC Gi	21:00								
V.O QD		07:00(D E.F.	53.00 (0)							
Oxicodona tab		01·w(s);	04:80 CO FLX							
TP Smy	19:00 1411 61	19:00								
V·O CIZh										
babapentina tab				5 A	9)					
1P 300ny	21.00 (5) ENF	11:00		او ا						
Lescholosa fras				15						
TP 10-	92:000 916	14:co		\$0 <u>rc</u>						
1.0 Hz										
Ω . I .		04:00 (CG (U)								
yexamerasono aup										
VO HS Dexametasona aup zons lu	1200 CC & T		14							
lu	11.00 (X) (V)									



APELLIDOS NOMBRES SEXO (M-F) EDAD Nº HISTORIA CLÍNICA

MALEZA NUÑEZ MARIA DEL PILAR F 62 296.353

Cancer de Endometrio ALERGIAS: No Conocidas

1 MEDICAMENTO	2 /	2 ADMINISTRACIÓN INI= INICIALES DEL RESPONSABLE FUN= ABREVIATURA DE LA FUNCIÓN													
SSECTION VIA BOSIS		DIA - MES - AÑO													
PRESENTACIÓN, VÍA, DOSIS	23/	OH I	12023	240	125	223	T		-	<u> </u>			T		
UNITARIA, FRECUENCIA	HORA			HORA	INI	FUN	HORA	INI	FUN	HORA	INI	FUN	HORA	INI	FUN
Loratadina tob		\pm	=								<u> </u>		<u> </u>	上	
long	27.00	200	Q1.								H		—		
V-0 C12		 	<u> </u>	I							二				
Ondasetron	ᅥᆫ	士	$\dagger \underline{}$	 						 	+	T	 	 	
8mg.		-		10:15	AA	Ed					<u> </u>		 		
15 min previo a QT repetiral NV 4h y 8h y posterior C/12h	las	+	<u> </u>	14:15	All	Eul					<u> </u>		_	 	
My 20, 2 housened Clita		#	<u> </u>								匚	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	
Dexameta sona 8mg.	(0:00	土		10:00	AA	EL									
Previo a Paclitarel y		#	 												
Provio a Paclitarel y Iv cada 18 h.		\pm	 	 		<u> </u>	-				<u> </u>	 	 	<u> </u>	
Loratadina.		T		1,							罝				
Long		+	 	10:15	₽H	EИ	 -	\vdash			 	 	 		
Previo a Paclitaxel		二													
VO		<u> </u>									 	 	 	 	
Paditaxel 220mg diluido en 500 cc de Clorus de Jodi	20.3	_		10:30	nn	17.1								口	
er soo ce de Cloturo de Jedu		1_		יב יטו	MH	ru,					├─	 	 -	\vdash	
0,97. Perfusión de 3h Honitonización. W DI		1		<u> </u>	\square										
	4=	丰													
Carboplotino Econg diluida en 250ce de daure de sadio 0,97. Pertusian de	(13:32	+-	 	13:30	D#	L 1,	\Box	\Box			\square				
dilundo en 250 co de davro				10.00									 		
On L 1 \	·	-	 												
W 90 min + LV DI												<u> </u>	\vdash		-
]	 	F		\Box					10					
							<u> </u>			\				\longrightarrow	
	-	-							\Box			1.1			
							<u> </u>	-1			 			 	
	7 -											72 E 1			
		+	 	 	-			-+			14	-		\dashv	
					\Box			\exists						-	
		\vdash		┠──┤	-		\longrightarrow	_			\dashv			\Box	
		口			二			寸			寸		 		
	-	\vdash		\vdash				\dashv						\Box	
					\exists						-			_	
	-							#			\exists			二	二
			. P	4 1				1		1		. ,	<i>i</i> 1	. 1	1