

REPORTE DE EPICRISIS INSTITUTO DEL CANCER

Fecha: 01-AUG-2023 16:10:16

Página: de 3

No. INTERNACION 140260 No. HISTORIA CLINICA 305815 Cédula 1801012616

Apellido Paterno	Apellido Materno	Primer Nombre	Segundo Nombre
VALLE	SALTOS	ANITA	DE LOS ANGELES

Edad: 72 años

DX. DE INGRESO Z51.1 QUIMIOTERAPIA

DX. DEFINITIVO SECUNDARIO Z51.1 QUIMIOTERAPIA
> FEMENINA. 72 AÑOS DE EDAD.

-DIAGNOSTICO: CARCINOMA METASTASICO CON ORIGEN PROBABLE DE OVARIO + CONSTIPACION CRONICA + HIPERTENSION ARTERIAL + INSOMNIO + OSTEOPOROSIS + ULCERA SACRA GRADO I + DOLOR ONCOLOGICO CONTROLADO+TEP

-MOTIVO DE INGRESO: QUIMIOTERAPIA ESQUEMA PACLITAXEL/CARBOPLATINO CICLO 5

HISTORIA BREVE Y EXAMEN FISICO

*PO: CARCINOMA METASTASICO CON ORIGEN PROBABLE DE OVARIO EN CURSO DE QUIMIOTERAPIA ESQUEMA PACLITAXEL/ CARBOPLATINO. RECIBE CICLO 1 EL 18 DE ABRIL DEL 2023. INGRESA PARA CICLO 5.

*P1: ANTECEDENTE DE SHOCK SEPTICO DE FOCO PULMONAR EN JUNIO QUE REQUIRIÓ HOSPITALIZACION DE LARGA DATA CUMPLIÓ ANTIBIOTICO DE AMPLIO ESPECTRO, EN COMBINACION CON QUINOLONAS PARA COBERTURA DE GERMESES ATIPICOS.

*P2: OSTEOPOROSIS: DESDE LOS 66 AÑOS DE EDAD SE CONTROLA EXTREMAMENTE. (DENOXUMAB C/6 MESES, CALCIBON D + VITAMINA D) ULTIMA DOSIS DE ANTICUERPO MONOCLONAL 23/03/2023.

*P3: INSOMNIO: FUE VALORADA POR PSIQUIATRIA EL 19/07/2023 QUIEN INDICA ZOPLCONA Y RESPERIDONA. PACIENTE NO ACUDE POR CONDICION. ASISTE FAMILIAR (HIJA) A CONSULTA EXTERNA.

*P4: DOLOR ABDOMINAL CONTROLADO: EN MANEJO CON OXICODONA 5 MG EN CASO DE DOLOR. ULTIMA VALORACION DRA. BEJAR 20/7/23.

*P5: CONSTIPACION CRONICA: EN MANEJO CON LACTULOSA 20 CC PM CON LO QUE PRESENTA DEPOSICIONES.

*P6: CAQUEXIA + ANOREXIA. PACIENTE CON POCA INGESTA. ALBUMINA 30/06/23: 3.34. EN SEGUIMIENTO POR NUTRICION. ULTIMA VALORACION EL 25/7/23.

*P7: ULCERA SACRA GRADO I + DERMATITIS IRRITATIVA PERILESIONAL Y PERIANAL. DESDE JUNIO, EN SEGUIMIENTO POR CLINICA DE HERIDAS. ULTIMA CURACION EL 26/07/2023.

CONTINUA NOTA DE INGRESO

*P8: HTA DIAGNOSTICO EN ABRIL/2023. EN TTO CON LOSARTAN 25 MG VO BID. DIFERIDO. SE MANTIENE CON AMLODIPINO 5 DE RESCATE Y DOXAZOCINA 2 MG CADA DIA INDICADO POR UROLOGIA.

P9: TEP DESDE JUNIO/2023 POR DEFECTOS DE LLENADO DE ARTERIA PULMONAR INFERIOR IZQUIERDA. EN SEGUIMIENTO POR NEUMOLOGIA Y TRATAMIENTO CON ENOXAPARINA 60 MG SC QD. (CALCULADO 1.5 MG X KG). ULTIMO CONTROL 25/7/23.

HALLAZGOS RX, LABORATORIOS

EVOLUCION Igual

FEMENINA DE 71 AÑOS CON DIAGNOSTICO DE CARCINOMA METASTASICO DE ORIGEN PROBABLE OVARIO EN CURSO DE TRATAMIENTO CON QUIMIOTERAPIA ESQUEMA PACLITAXEL/ CARBOPLATINO. CLINICAMENTE EN MEJORES CONDICIONES. SE EVIDENCIA DISMINUCION IMPORTANTE DE MARCADOR TUMORAL. INGRESA PARA CICLO 5 DE QUIMIOTERAPIA. AYER PREMEDICA. HOY PERFUSION DE QUIMIOTERAPIA ESQUEMA PACLITAXEL/CARBOPLATINO CICLO 5.

COMPLICACIONES HOSPITALARIAS

NINGUNA

COMPLICACIONES OPERATORIAS

CONDICION Igual

SECCION NUCLEO DE QUITO
Dra. Tannia Sorla
ONCOLOGA CLINICA
MSP: 1703816874

SECCION NUCLEO DE QUITO
Dr. Ricardo Casillas
MEDICO RESIDENTE
MSP: 1723086424

REPORTE DE EPICRISIS

INSTITUTO DEL CANCER

Fecha: 01-AUG-2023 16:10:16

Página 2 de 3

TRATAMIENTO

OXIGENO POR CANULA NASAL A 1 LITRO PARA SATURACION >90 %
DIETA BLANDA + LIQUIDOS PARA PACIENTE EN CURSO DE QUIMIOTERAPIA CON ANTECEDENTE DE CONSTIPACION CRONICA A TOLERANCIA DE PACIENTE.
VALORADA POR NUTRICION
FORMULA PARA NUTRICION ENTERAL CON 20G PROTEINA PROTICAL INDICACIONES: 3 MEDIDAS EN 200ML DE BEBIDA A LAS 10H00
** PARA EVALUAR TOLERANCIA **
FORMULA PARA NUTRICION ENTERAL DIABETICO DE 400G GLUCERNA INDICACIONES: 5 MEDIDAS EN 200ML DE BEBIDA EN EL DESAYUNO Y MERIENDA
COMPLEMENTO MODULAR PROTEINICO DE 454G ISOWIN INDICACIONES: 1 MEDIDA EN 200ML DE BEBIDA A LAS 10H00 Y 15H00
DIETA GENERAL PARA FAMILIAR PERMANENTE POR ALTO RIESGO DE CAIDAS Y CONDICION DE PACIENTE.
CLORURO DE SODIO AL 0.9% 1000 CC PASAR INTRAVENOSO A 40 CC/HORA.
OMEPRAZOL 40 MILIGRAMOS INTRAVENOSO CADA DIA
ENOXAPARINA 60MG AMPOLLAS 1 AMPOLLA SUBCUTANEA PERIUMBILICAL CADA DIA
DOXAZOCINA 2MG TABLETA TOMAR UNA TABLETA DIARIA 8PM POR 90 DIAS (INDICACION DE UROLOGIA)
AMLODIPINO 5 MG SOLIDO ORAL. TOMAR SI TENSION ARTERIAL ES MAYOR A 140/90 PREVIA COMUNICACION Y VALORACION POR MEDICO RESIDENTE DE ONCOLOGIA.
PROCTO GLYVENOL CADA 12 HORAS Y PRN EN REGION ANAL (TIENE PACIENTE)
CALCIO + VITAMINA D 1 TABLETA VIA ORAL CADA DIA 10:00 AM
RISPERIDONA GOTERO TOMAR 5 GOTAS EN LA NOCHE
ZOPICLONA 7.5 MG TABLETAS TOMAR 1 TABLETA EN LA NOCHE
OXICODONA 5MG TOMAR UNA TABLETA EN CASO DE DOLOR
INDICACIONES DE QUIMIOTERAPIA AUTORIZADA HOY 01/08/2023
ONDASETRON 8 MILIGRAMOS INTRAVENOSO DILUIDO EN 30CC DE CLORURO DE SODIO 0.9% PERFUSION DE 15 MINUTOS. 15 MINUTOS PREVIO A QUIMIOTERAPIA. REPETIR A LAS 4 Y 8 HORAS DE LA PRIMERA DOSIS DE ONDASETRON. POSTERIOR 8 MILIGRAMOS IV CADA 12 HORAS
DEXAMETASONA 8 MG INTRAVENOSO PREVIO A LA PRIMERA DOSIS DE ONDASETRON Y LUEGO CADA 12 HORAS
LORATADINA 10 MILIGRAMOS VIA ORAL PREVIO A PACLITAXEL
PACLITAXEL 210 MG INTRAVENOSO DILUIDO EN 500 CC DE CLORURO DE SODIO 0.9% PERFUSION DE 3 HORAS + LAVADO DE VENA (D1)
MONITORIZACION CONTINUA DURANTE INFUSION DE PACLITAXEL
CARBOPLATINO 600 MG INT

RECETA

OMEPRAZOL 20 MG SOLIDO ORAL TOMAR UNA CAPSULA 30 MINUTOS ANTES DEL DESAYUNO POR 5 DIAS
PEGFILGRASTIM 6 MG APLICAR SUBCUTANEO ALREDEDOR DEL OMBLIGO 24 HORAS DESPUES DE HABER CULMINADO QUIMIOTERAPIA - HOY 19 ABRIL 2023
METOCLOPRAMIDA 10 MG SOLIDO ORAL TOMAR 1 TABLETA PREVIO A CADA COMIDA PRINCIPAL POR 7 DIAS
ONDASETRON 8 MILIGRAMOS TOMAR 1 TABLETA CADA 12 HORAS POR 7 DIAS
SOLUCION ACIDOS GRASOS HIPOXIGENADOS EN ACEITE APLICAR EN ZONA DE PRESION SACRA CADA 8 HORAS
AMLODIPINO 5 MG SOLIDO ORAL TOMAR SI TENSION ARTERIAL ES MAYOR A 140/90 PREVIA COMUNICACION Y VALORACION POR MEDICO RESIDENTE DE ONCOLOGIA.
DOXAZOCINA 2MG TABLETA TOMAR UNA TABLETA DIARIA 8PM POR 90 DIAS (INDICACION DE UROLOGIA)
SULFADIAZINA DE PLATA APLICAR EN AREA ESCARADA SACRA. TIENE PACIENTE
CALCIO + VITAMINA D 1 TABLETA VIA ORAL CADA DIA 10:00 AM
ZOPICLONA 7.5 MG 1 TABLETA 22H00 VIA ORAL
PROCTO GLYVENOL GEL CADA 12 HORAS Y PRN EN REGION ANAL (TIENE PACIENTE)
PICOSULFATO DE SODIO COMPRIMIDOS 5 MG SOLIDO ORAL TOMAR VIA ORAL 2 PERLAS EN LA NOCHE, SUSPENDER EN CASO DE DIARREA (TIENE PACIENTE)
INDICACIONES DE TERAPIA DE DOLOR
MORFINA 10 MG LIQUIDO PARENTERAL MEZCLAR 1 AMPOLLA DE MORFINA DE 1 ML CON 9 CC DE GEL KY Y ADMINISTRAR EN REGION RECTAL 10 ML TRES VECES AL DIA. (TIENE PACIENTE)

FECHA EPICRISIS 01-AUG-2023

FECHA INGRESO: 31-JUL-2023

FECHA ALTA: 01-AUG-2023

DIAS DE HOSPITALIZACION: 1

SOLCA NUCLEO DE QUITO
Dra. Tannia Soria
ONCOLOGA CLINICA
MSP:1703816874

SOLCA NUCLEO DE QUITO
Ricardo Castillas
MEDICO RESIDENTE
1723586424