

GUAYACÁN

Porlieria chilensis

Vulnerable (VU)
Clasificación RCE



Villaseca, N 2023. Porlieria chilensis. iNaturalist.

1. CARACTERÍSTICAS GENERALES

Nombre común	Guayacán o palo santo
Nombre científico	Porlieria Chilensis
Reino	Plantae
Filo/División	Tracheophyta
Familia	Zygophyllaceae
Género	Porlieria
Origen	Endémico de Chile
Distribución	Zona central de Chile
Altura	2–5 m
Tipo	Arbusto o árbol pequeño

2. DESCRIPCIÓN

Arbusto o árbol pequeño, de crecimiento lento, con ramas gruesas, torcidas y abiertas. Sus hojas compuestas y estípulas espinescientes, junto o pequeñas flores violáceas, permiten reconocerlo fácilmente en terreno.

Tamaño y altura	Arbusto o árbol pequeño; hasta 4 m de altura.
Tronco y ramas	Gruesas, tortuosas, cortas y abiertas.
Hojas	Perennes, opuestas, compuestas, sésiles, paripinnadas, de hasta 18 pares de folíolos; estípulas espinescientes.
Flores	Solitarias, hermafroditas, axilares, pequeñas, de color violáceo (5 sépalos, 4 pétalos, 8 estambres, 1 pistilo)
Fruto	Cápsula dehiscente de 4 a 5 lóbulos profundos; de color verde inmaduro a morado en la madurez.
Semillas	Numerosas, de color pardo claro.



Renca Nativa, 2025. Instagram.



Desarrollo de flor y frutos de Porlieria chilensis. (A) Flor, (B) Fruto inmaduro, color verde. (C) Cápsula de fruto maduro, color violáceo. (INIA, 2023)

3. DISTRIBUCIÓN Y HÁBITAT

Regiones	Desde la Región de Coquimbo (IV) hasta la Región de O'Higgins (VI)
Rango geográfico	Desde Punta de Choros, prov. de Limarí, hasta Cuesta Corcolén (San Vicente de Tagua Tagua), prov. de Colchagua; extensión de presencia estimada de 8.014 km²
Altitud	Desde el nivel del mar hasta 1.300 m.s.n.m.
Hábitat	Laderas costeras rocosas y faldeos cordilleranos hasta llanuras de sustrato arenoso; lugares secos, pedregosos y de plena exposición solar.
Vegetación asociada	Región del Matorral y los Bosques Esclerófilos.

4. ÉPOCA DE FLORACIÓN

Floración	Primavera – verano
Fructificación	Verano
Maduración del fruto	Fines de verano (diciembre a febrero); el fruto pasa de verde a color violáceo

5. TIPOS DE USOS

- Medicina humana y veterinaria
- Artesanía y decoración.



eltontitodelosbichos 2026. Porlieria chilensis. iNaturalist.

6. IMPORTANCIA ECOLÓGICA

Forma parte de los ecosistemas de la zona central de Chile y proporciona refugio y alimento para distintas especies asociadas al matorral nativo.



Renca Nativa, 2025. Instagram.



Renca Nativa, 2025. Instagram.

7. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

eltontitodelosbichos. (2026, 11 de agosto). Porlieria chilensis [Fotografía]. iNaturalist. <https://www.inaturalist.org/observations/390471470>

Instituto de Investigaciones Agropecuarias. (2023). Guayacán: Porlieria chilensis. En C. Pizarro A., E. Ibacache C., & C. Pañitrur D. (Eds.), Propagación de especies nativas de Chile (p. 243). INIA Intihuasi. <https://biblioteca.inia.cl/server/api/core/bitstreams/252eec3b-f2d8-4990-8749-59b784cfff1/content>

Lucianativa. (s. f.). [Fotografía de Porlieria chilensis] [Fotografía]. Flickr. <https://www.flickr.com/photos/lucianativa/44278126084/>

Ministerio del Medio Ambiente. (2026). Porlieria chilensis I.M. Johnst. Plataforma Políticas de la Biodiversidad (SIMBIO). <https://simbio.mma.gob.cl/Especies/Vistalmpresion/10144>

[maxiimiliano.vt]. (2026). [Fotografía de Porlieria chilensis] [Fotografía]. Instagram. <https://www.instagram.com/p/DKOKtVCSOAK/>

[Renca Nativa]. (2025). [Fotografía de Porlieria chilensis] [Fotografía]. Instagram. https://www.instagram.com/p/Db1pkiUDnd6/?img_index=1

SIMBIO. (s.f.) Porlieria chilensis. <https://simbio.mma.gob.cl/Especies/Details/10144>

Villaseca Merino, N. (2023, 7 de noviembre). Porlieria chilensis [Fotografía]. iNaturalist. <https://www.inaturalist.org/observations/190440278>

YARETA

Azorella compacta

Vulnerable (VU)
Clasificación RCE



Yareta en el desierto del altiplano. Joey Santore, 2019.

1. CARACTERÍSTICAS GENERALES

Nombre común	Yareta, Llareta, Champa o Yarita
Nombre científico	Azorella compacta
Reino	Plantae
Filo/División	Magnoliophyta
Familia	Apiaceae
Género	Azorella
Origen	Nativa de los Andes
Distribución	Chile, Argentina, Bolivia y Perú
Altura	5–20 cm
Tipo	Planta perenne, crecimiento en cojín

2. DESCRIPCIÓN

Planta caméfito en forma de cojín, densamente compacta, formada por numerosos tallos leñosos agrupados sobre una raíz basal común. Sus diminutas hojas resinosas dispuestas en rosetas terminales y su crecimiento extremadamente lento permiten reconocerla fácilmente en la alta cordillera.

Tamaño y altura	Planta en cojín compacto; hasta 1 m de altura y 1 a 4 m de diámetro
Tronco y ramas	Numerosos, leñosos, fasciculados, que convergen en una estructura radical basal común
Hojas	Simples, diminutas, trígonoas, resinosas
Flores	Pequeñas, amarillo-verdosas, agrupadas de 1 a 5 por roseta.
Fruto	Esquizocarpo seco, orbicular, de 4 a 5 mm, que se abre en dos mericarpos
Semillas	Una semilla por mericarpo



Yareta. Joey Santore, 2019.



Semillas Yareta. Joey Santore, 2019.

3. DISTRIBUCIÓN Y HÁBITAT

Regiones	Desde el límite con Perú (Región de Tarapacá) hasta la Región de Atacama, prov. de Huasco.
Rango geográfico	Altiplano andino del norte de Chile, así como del sur de Perú, oeste de Bolivia y noroeste de Argentina; extensión de presencia estimada de 31.746 km².
Altitud	Entre 3.000 y 5.300 m s.n.m.
Hábitat	Laderas y portezuelos rocosos de alta montaña, faldeos pedregosos y afloramientos rocosos, con exposición preferentemente norte o ecuatorial.
Vegetación asociada	Matorral bajo tropical andino de Parastrephia lucida y Azorella compacta; asociada a Polylepis tarapacana.

4. CONSERVACIÓN

Categoría: Vulnerable (VU) — D.S. N.º 51/2008 MINSEGPRES, RCE, criterio VU A2d

Amenazas principales: Sobreexplotación histórica como combustible para la industria del cobre y del salitre, y para la construcción de los ferrocarriles Arica–La Paz y Antofagasta–Oruro; extracción actual de raíces como leña, hojas para resina y flores con fines medicinales; degradación y fragmentación del hábitat por influencia antrópica y desertización.

Situación: Poblaciones muy fragmentadas y de ocupación desigual del espacio, con crecimiento extremadamente lento que dificulta su recuperación. Se encuentra protegida en el PN Lauca, la RN Las Vicuñas y el PN Isluga, todos en la Región de Arica y Parinacota / Tarapacá.



Yareta. Yurasova , s.f. Dreamstime.

5. IMPORTANCIA ECOLÓGICA

Especie longeva y de crecimiento extremadamente lento: el incremento radial medido es de apenas 1,7 cm en 14 meses, con estimaciones de entre 1,55 y 12,3 mm al año según distintos autores.
Crece exclusivamente entre grandes bloques rocosos y nunca sobre suelos arenosos, en laderas con más de 10° de pendiente y exposición norte o ecuatorial.
Cumple un importante rol como ingeniero ecosistémico: sus cojines reducen la velocidad del viento y atenúan las diferencias de temperatura, facilitando el establecimiento de otras especies.



Yareta close up. Kareen Broodryk, s.f. Dreamstime.



Nolan Exe, 2022. iNaturalist.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Ministerio del Medio Ambiente. (2018). Azorella compacta [PDF]. Clasificación de Especies. https://clasificacionespecies.mma.gob.cl/wp-content/uploads/2019/10/Azorella_compacta_FINAL.pdf

SIMBIO Ministerio del Medio Ambiente, (2026) <https://simbio.mma.gob.cl/Especies/VistaImpresion/9671>

Santore, J. (s. f.). The incredible llareta: Azorella compacta. Crime Pays But Botany Doesn't. <https://www.crimepaysbutbotanydoesnt.com/blog/the-incredible-llareta-azorella-compacta>

Broodryk, K. (s.f.) Close-up flowers yareta plant, also known as cushion llareta (Azorella compacta) located Altiplano Bolivia [Fotografía]. Dreamstime. Dreamstime

Yareta (Azorella compacta) plant texture growing in Altiplano [Fotografía]. (s. f.). Dreamstime.

PATA DE GUANACO

Cistanthe grandiflora

Vulnerable (VU)*
Clasificación RCE

Posiblemente vulnerable, sin mucha información.



Yareta en el desierto del altiplano. Joey Santore, 2019.


1. CARACTERÍSTICAS GENERALES

Nombre común	Pata de guanaco/doquilla/mármol
Nombre científico	Cistanthe grandiflora
Reino	Plantae
Filo/División	Magnoliophyta
Familia	Montiaceae
Género	Cistanthe
Origen	Endémica de Chile
Distribución	Tarapacá a Valparaíso
Altura	20–40 cm
Tipo	Hierba perenne suculenta

2. DESCRIPCIÓN

Planta herbácea suculenta de pequeño tamaño, formada por tallos carnosos y ramificados que crecen desde una base común. Sus hojas almacenan gran cantidad de agua y presentan adaptaciones fotosintéticas CAM y C3, que le permiten tolerar períodos de sequía. Durante la época de floración desarrolla flores llamativas, generalmente rosadas o fucsias, que destacan sobre el paisaje árido y contribuyen a caracterizar el Desierto Florido de Chile.

Tamaño y altura	Hierba de 20–40 cm; varas florales de hasta 50–60 cm.
Tronco y ramas	Tallo erecto, carnoso y poco ramificado.
Hojas	Ovaladas, carnosas, agrupadas en la base, de 3–12 cm.
Flores	Rosado-fucsias, blancas o amarillas de 2–4 cm, agrupadas en racimos.
Fruto	Cápsula pequeña que contiene numerosas semillas.
Semillas	Numerosas, pequeñas y oscuras.



Cistanthe grandiflora en escala fotográfica. Toledo Gálvez, L. 2026. iNaturalist.



Cistanthe grandiflora en Valparaíso. Lartundo, 2015. iNaturalist

3. DISTRIBUCIÓN Y HÁBITAT

Regiones	Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O'Higgins, Maule, Ñuble, Biobío y Araucanía.
Rango geográfico	Se distribuye principalmente por el norte y centro de Chile, desde zonas costeras hasta sectores interiores y cordilleranos.
Altitud	Desde aproximadamente 5 m.s.n.m hasta 2.800 m.s.n.m.
Hábitat	Habita ambientes desérticos, oasis de niebla, matorrales costeros y zonas de clima mediterráneo. Crece en lugares expuestos, laderas y terrenos secos con buena exposición solar
Vegetación asociada	Matorrales costeros, matorrales xéricos, matorrales esclerófilos y ambientes altomontanos.

4. CONSERVACIÓN

Categoría: No clasificada en el RCE. Actualmente no registra categoría de conservación vigente en SIMBIO pero se suele clasificar como vulnerable.

Amenazas principales: Pérdida y transformación del hábitat por actividades humanas, especialmente expansión urbana, alteración de ambientes naturales y degradación del matorral costero.

Situación: Especie endémica de Chile, distribuida principalmente en ambientes desérticos, costeros y mediterráneos. Se encuentra registrada dentro de diversas áreas protegidas del país, entre ellas los parques nacionales Llanos de Challe, Fray Jorge, Río Clarillo y La Campana.



Cistanthe grandiflora en el desierto florido. Omerovic, L. iNaturalist.

5. IMPORTANCIA ECOLÓGICA

Contribuye a la biodiversidad de los ecosistemas áridos y mediterráneos de Chile. Sus flores aportan recursos para insectos polinizadores y su presencia forma parte de comunidades vegetales adaptadas a condiciones de sequía y alta exposición solar.



Hojas Cistanthe grandiflora. Vivero Pocochay, s.f.



Cistanthe grandiflora cerrada. Fernández, V. 2020. iNaturalist.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Deutsche Welle. (2025, 9 de octubre). "Pata de guanaco": La flor que vence la sequía del desierto. <https://www.dw.com/es/pata-de-guanaco-la-flor-que-vence-la-sequ%C3%ADa-del-desierto/a-74295406>

Fernández, V. (2020, 19 de septiembre). Cistanthe grandiflora [Fotografía]. iNaturalist. <https://www.inaturalist.org/observations/60063221>

Ladera Sur. (2025, 24 de octubre). Pata de guanaco, la flor que domina el Desierto Florido por su increíble capacidad de adaptación. <https://laderasur.com/articulo/pata-de-guanaco-la-flor-que-domina-el-desierto-florido-por-su-increible-capacidad-de-adaptacion/>

Omerovic, L. I. (2017, 9 de septiembre). Cistanthe grandiflora [Fotografía]. iNaturalist. <https://www.inaturalist.org/observations/26616681>

Pumahuida. (s. f.). Pata de guanaco: Cistanthe grandiflora. Vivero Pumahuida. <https://www.pumahuida.cl/especies/pata-de-guanaco/>

Rodríguez, R., Marticorena, C., Alarcón, D., Baeza, C., Cavieres, L., Finot, V. L., Fuentes, N., Kiessling, A., Mihoc, M., Pauchard, A., Ruiz, E., Sanchez, P., & Marticorena, A. (2018). Catálogo de las plantas vasculares de Chile. Gayana Botánica, 75(1), 1–430. <https://catalogoplantas.udec.cl/?q=node/4577>

Toledo Gálvez, L. N. (2026, 29 de enero). Cistanthe grandiflora [Fotografía]. iNaturalist. <https://www.inaturalist.org/observations/340326573>

TAMARUGO

Prosopis tamarugo

En peligro (EN)
Clasificación RCE



Prosopis Tamarugo. idouglas, 2019

1. CARACTERÍSTICAS GENERALES

Nombre común	Tamarugo
Nombre científico	Prosopis tamarugo
Reino	Plantae
Filo/División	Tracheophyta
Familia	Fabaceae
Género	Prosopis
Origen	Nativo y endémico de Chile
Distribución	Tarapacá y Antofagasta
Altura	Hasta 18 m
Tipo	Árbol perenne

2. DESCRIPCIÓN

Descripción: Árbol caducifolio de copa amplia e irregular, adaptado a las condiciones extremadamente áridas y salinas del norte de Chile. Presenta tronco grueso, ramas espinosas y hojas compuestas pequeñas.

Tamaño y altura	Hasta 18 m de altura; tronco de hasta 1,5 m de diámetro.
Tronco y ramas	Tronco corto, grueso y de corteza rugosa; ramas fuertes, arqueadas y espinosas, con espinas de hasta 6 cm.
Hojas	Caducas, compuestas y bipinnadas; de 2,5–4,5 cm, con 6–12 pares de folíolos pequeños.
Flores	Pequeñas, amarillas, hermafroditas, agrupadas en racimos cilíndricos de 3–6 cm.
Fruto	Legumbre coriácea, amarilla a verde-amarillenta, cilíndrica y curvada, de 2–5 cm de largo.
Semillas	Marrones, lisas y ovaladas; generalmente 8–10 por fruto.



Flor del Prosopis Tamarugo. Matt Berger, 2019



Fruto del Prosopis Tamarugo. Charif_tala, 2024

3. DISTRIBUCIÓN Y HÁBITAT

Regiones	Tarapacá y Antofagasta.
Rango geográfico	Extremo norte de Chile, principalmente en la Pampa del Tamarugal y sectores cercanos a Toconao.
Altitud	Promedio de 1.100 m s. n. m.
Hábitat	Mesetas áridas, con precipitaciones casi inexistentes, alta radiación solar y presencia ocasional de neblinas. También crece sobre suelos salinos y áreas marginales eventualmente inundables.
Vegetación asociada	Forma bosques de tamarugo y asociaciones mixtas con algarrobo blanco (<i>Prosopis alba</i>). En el Salar de Llamara también forma matorrales arborescentes junto a retama (<i>Caesalpinia aphylla</i>).

4. CONSERVACIÓN

Amenazas principales: Pérdida y degradación del hábitat por actividades humanas, cosecha de madera y leña, y perturbaciones humanas. También enfrenta presión sobre los recursos hídricos de la Pampa del Tamarugal, fundamentales para su supervivencia en un ambiente extremadamente árido.

Situación: El tamarugo está clasificado como En Peligro (EN) en Chile, debido principalmente a la reducción y degradación de su hábitat. Históricamente, su madera fue utilizada como combustible durante la explotación del salitre, provocando una importante reducción de sus poblaciones.



Tamarugo. Navarrete, B. 2024.

5. IMPORTANCIA ECOLÓGICA

Es una especie clave de la Pampa del Tamarugal, capaz de crecer en suelos salinos y condiciones de extrema aridez. Forma bosques que proporcionan refugio y alimento para diversas especies, además de contribuir a la estabilidad y recuperación de los ecosistemas desérticos.



Tamarugo fruto. Navarrete, B. 2024.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Berger, M. (2019). *Prosopis tamarugo* [Fotografía]. iNaturalist. <https://www.inaturalist.org/observations/36395818>

Charif_tala. (2024). Flor de *Prosopis tamarugo* [Fotografía]. iNaturalist. <https://www.inaturalist.org/observations/205991864>

idouglas. (2019). *Prosopis tamarugo* [Fotografía]. iNaturalist. <https://www.inaturalist.org/observations/27597344>

Ministerio del Medio Ambiente. (2026). *Prosopis tamarugo* Phil. [Ficha de especie]. Plataforma Políticas de la Biodiversidad (SIMBIO). <https://simbio.mma.gob.cl/Especies/Vistalmpresion/13297>

Navarrete, B. (2024). Fruto de *Prosopis tamarugo* [Fotografía]. iNaturalist. <https://www.inaturalist.org/observations/200668995>