a


K fit for PEG 20k (5.0 wt.%)
PEG 20k fit: $K = (5.9e+09 \pm 1.6e+09)$ M^{-1}
data
donor count rate [cps]
C_{DNA} (acceptor) [nM]

b


K fit for PEG 20k (7.5 wt.%)
PEG 20k fit: $K = (1.2e+10 \pm 1.5e+09)$ M^{-1}
data
donor count rate [cps]
C_{DNA} (acceptor) [nM]

c


K fit for PEG 20k (10.0 wt.%)
PEG 20k fit: $K = (6.8e+09 \pm 1.8e+09)$ M^{-1}
data
donor count rate [cps]
C_{DNA} (acceptor) [nM]

d


K fit for PEG 20k (12.5 wt.%)
PEG 20k fit: $K = (7.5e+09 \pm 2.3e+09)$ M^{-1}
data
donor count rate [cps]
C_{DNA} (acceptor) [nM]

e


K fit for PEG 20k (15.0 wt.%)
PEG 20k fit: $K = (8.6e+09 \pm 2.0e+09)$ M^{-1}
data
donor count rate [cps]
C_{DNA} (acceptor) [nM]

f


K fit for PEG 20k (20.0 wt.%)
PEG 20k fit: $K = (7.6e+09 \pm 1.7e+09)$ M^{-1}
data
donor count rate [cps]
C_{DNA} (acceptor) [nM]

g


K fit for PEG 20k (25.0 wt.%)
PEG 20k fit: $K = (6.4e+09 \pm 1.0e+09)$ M^{-1}
data
donor count rate [cps]
C_{DNA} (acceptor) [nM]

h


K fit for PEG 20k (30.0 wt.%)
PEG 20k fit: $K = (5.5e+09 \pm 1.2e+09)$ M^{-1}
data
donor count rate [cps]
C_{DNA} (acceptor) [nM]

i


K fit for PEG 20k (40.0 wt.%)
PEG 20k fit: $K = (1.5e+09 \pm 2.1e+08)$ M^{-1}
data
donor count rate [cps]
C_{DNA} (acceptor) [nM]