a


K fit for EG (2.5 wt.%)
EG fit: $K = (1.8e+09 \pm 2.3e+08)$ M^{-1}
data
donor count rate [cps]
C_{DNA} (acceptor) [nM]

b


K fit for EG (5.0 wt.%)
EG fit: $K = (6.7e+08 \pm 4.2e+07)$ M^{-1}
data
donor count rate [cps]
C_{DNA} (acceptor) [nM]

c


K fit for EG (7.5 wt.%)
EG fit: $K = (1.8e+09 \pm 1.7e+08)$ M^{-1}
data
donor count rate [cps]
C_{DNA} (acceptor) [nM]

d


K fit for EG (10.0 wt.%)
EG fit: $K = (4.8e+08 \pm 2.5e+07)$ M^{-1}
data
donor count rate [cps]
C_{DNA} (acceptor) [nM]

e


K fit for EG (12.5 wt.%)
EG fit: $K = (1.2e+09 \pm 2.8e+08)$ M^{-1}
data
donor count rate [cps]
C_{DNA} (acceptor) [nM]

f


K fit for EG (15.0 wt.%)
EG fit: $K = (3.6e+08 \pm 1.5e+07)$ M^{-1}
data
donor count rate [cps]
C_{DNA} (acceptor) [nM]

g


K fit for EG (20.0 wt.%)
EG fit: $K = (2.2e+08 \pm 1.2e+07)$ M^{-1}
data
donor count rate [cps]
C_{DNA} (acceptor) [nM]

h


K fit for EG (25.0 wt.%)
EG fit: $K = (1.1e+08 \pm 6.2e+06)$ M^{-1}
data
donor count rate [cps]
C_{DNA} (acceptor) [nM]

i


K fit for EG (30.0 wt.%)
EG fit: $K = (5.8e+07 \pm 5.6e+06)$ M^{-1}
data
donor count rate [cps]
C_{DNA} (acceptor) [nM]

j


K fit for EG (40.0 wt.%)
EG fit: $K = (4.6e+06 \pm 4.4e+05)$ M^{-1}
data
donor count rate [cps]
C_{DNA} (acceptor) [nM]