a


K fit for PEG 200 (2.5 wt.%)
PEG 200 fit: $K = (3.5e+09 \pm 6.4e+08)$ M^{-1}
data
donor count rate [cps]
C_{DNA} (acceptor) [nM]

b


K fit for PEG 200 (5.0 wt.%)
PEG 200 fit: $K = (1.5e+09 \pm 2.8e+08)$ M^{-1}
data
donor count rate [cps]
C_{DNA} (acceptor) [nM]

c


K fit for PEG 200 (7.5 wt.%)
PEG 200 fit: $K = (3.4e+09 \pm 7.1e+08)$ M^{-1}
data
donor count rate [cps]
C_{DNA} (acceptor) [nM]

d


K fit for PEG 200 (10.0 wt.%)
PEG 200 fit: $K = (2.1e+09 \pm 3.9e+08)$ M^{-1}
data
donor count rate [cps]
C_{DNA} (acceptor) [nM]

e


K fit for PEG 200 (12.5 wt.%)
PEG 200 fit: $K = (2.8e+09 \pm 4.6e+08)$ M^{-1}
data
donor count rate [cps]
C_{DNA} (acceptor) [nM]

f


K fit for PEG 200 (15.0 wt.%)
PEG 200 fit: $K = (6.8e+08 \pm 1.2e+08)$ M^{-1}
data
donor count rate [cps]
C_{DNA} (acceptor) [nM]

g


K fit for PEG 200 (20.0 wt.%)
PEG 200 fit: $K = (2.7e+08 \pm 2.1e+07)$ M^{-1}
data
donor count rate [cps]
C_{DNA} (acceptor) [nM]

h


K fit for PEG 200 (25.0 wt.%)
PEG 200 fit: $K = (6.9e+08 \pm 7.8e+07)$ M^{-1}
data
donor count rate [cps]
C_{DNA} (acceptor) [nM]

i


K fit for PEG 200 (30.0 wt.%)
PEG 200 fit: $K = (1.2e+08 \pm 9.6e+06)$ M^{-1}
data
donor count rate [cps]
C_{DNA} (acceptor) [nM]

j


K fit for PEG 200 (40.0 wt.%)
PEG 200 fit: $K = (7.4e+06 \pm 6.1e+05)$ M^{-1}
data
donor count rate [cps]
C_{DNA} (acceptor) [nM]