a


K fit for PEG 400 (2.5 wt.%)
PEG 400 fit: $K = (3.6e+09 \pm 4.1e+08)$ M^{-1}
data
donor count rate [cps]
C_{DNA} (acceptor) [nM]

b


K fit for PEG 400 (5.0 wt.%)
PEG 400 fit: $K = (2.7e+09 \pm 5.8e+08)$ M^{-1}
data
donor count rate [cps]
C_{DNA} (acceptor) [nM]

c


K fit for PEG 400 (7.5 wt.%)
PEG 400 fit: $K = (4.0e+09 \pm 7.1e+08)$ M^{-1}
data
donor count rate [cps]
C_{DNA} (acceptor) [nM]

d


K fit for PEG 400 (10.0 wt.%)
PEG 400 fit: $K = (2.1e+09 \pm 3.1e+08)$ M^{-1}
data
donor count rate [cps]
C_{DNA} (acceptor) [nM]

e


K fit for PEG 400 (12.5 wt.%)
PEG 400 fit: $K = (4.0e+09 \pm 4.1e+08)$ M^{-1}
data
donor count rate [cps]
C_{DNA} (acceptor) [nM]

f


K fit for PEG 400 (15.0 wt.%)
PEG 400 fit: $K = (1.3e+09 \pm 1.0e+08)$ M^{-1}
data
donor count rate [cps]
C_{DNA} (acceptor) [nM]

g


K fit for PEG 400 (20.0 wt.%)
PEG 400 fit: $K = (1.1e+09 \pm 7.3e+07)$ M^{-1}
data
donor count rate [cps]
C_{DNA} (acceptor) [nM]

h


K fit for PEG 400 (25.0 wt.%)
PEG 400 fit: $K = (4.8e+08 \pm 5.4e+07)$ M^{-1}
data
donor count rate [cps]
C_{DNA} (acceptor) [nM]

i


K fit for PEG 400 (30.0 wt.%)
PEG 400 fit: $K = (3.4e+08 \pm 1.8e+07)$ M^{-1}
data
donor count rate [cps]
C_{DNA} (acceptor) [nM]

j


K fit for PEG 400 (40.0 wt.%)
PEG 400 fit: $K = (3.7e+07 \pm 3.7e+06)$ M^{-1}
data
donor count rate [cps]
C_{DNA} (acceptor) [nM]