a


K fit for PEG 600 (2.5 wt.%)
PEG 600 fit: $K = (4.7e+09 \pm 9.3e+08)$ M^{-1}
data
donor count rate [cps]
C_{DNA} (acceptor) [nM]

b


K fit for PEG 600 (5.0 wt.%)
PEG 600 fit: $K = (2.5e+09 \pm 5.7e+08)$ M^{-1}
data
donor count rate [cps]
C_{DNA} (acceptor) [nM]

c


K fit for PEG 600 (7.5 wt.%)
PEG 600 fit: $K = (3.4e+09 \pm 5.1e+08)$ M^{-1}
data
donor count rate [cps]
C_{DNA} (acceptor) [nM]

d


K fit for PEG 600 (10.0 wt.%)
PEG 600 fit: $K = (3.7e+09 \pm 6.2e+08)$ M^{-1}
data
donor count rate [cps]
C_{DNA} (acceptor) [nM]

e


K fit for PEG 600 (12.5 wt.%)
PEG 600 fit: $K = (3.5e+09 \pm 5.2e+08)$ M^{-1}
data
donor count rate [cps]
C_{DNA} (acceptor) [nM]

f


K fit for PEG 600 (15.0 wt.%)
PEG 600 fit: $K = (2.7e+09 \pm 6.8e+08)$ M^{-1}
data
donor count rate [cps]
C_{DNA} (acceptor) [nM]

g


K fit for PEG 600 (20.0 wt.%)
PEG 600 fit: $K = (1.7e+09 \pm 3.1e+08)$ M^{-1}
data
donor count rate [cps]
C_{DNA} (acceptor) [nM]

h


K fit for PEG 600 (25.0 wt.%)
PEG 600 fit: $K = (1.9e+09 \pm 1.5e+08)$ M^{-1}
data
donor count rate [cps]
C_{DNA} (acceptor) [nM]

i


K fit for PEG 600 (30.0 wt.%)
PEG 600 fit: $K = (1.2e+09 \pm 9.7e+07)$ M^{-1}
data
donor count rate [cps]
C_{DNA} (acceptor) [nM]

j


K fit for PEG 600 (40.0 wt.%)
PEG 600 fit: $K = (5.2e+07 \pm 6.3e+06)$ M^{-1}
data
donor count rate [cps]
C_{DNA} (acceptor) [nM]