

MUSCULAÇÃO — CICLO DA MEIA

Antonio Diniz · 18 semanas · periodizada junto com a corrida · alvo 22/11/2026

1. A semana

Dia	Sessão	Quando	Duração	Por quê nesse dia
Seg	Superior	tarde	30–40min	Perna vem do longão de domingo — zero carga nela
Ter	Força A — Perna (principal)	pós-corrida	35–45min	Dia duro concentrado: o run forte já foi. Quarta e quinta ficam limpas
Qua	Core + mobilidade	tarde	25min	Sem carga de perna — quinta tem qualidade
Qui	—	—	—	Dia da 2ª sessão de corrida
Sex	Força B — Unilateral e tendão	pós-corrida	25–35min	Corrida do dia é fácil; sobra 1 dia + a bike antes do longão
Sáb	—	—	—	Bike. Nada de perna antes do domingo
Dom	Mobilidade	pós-longão	20min	Fáscia plantar e quadril — os dois pontos frágeis

Por que perna cai nos dias que já são duros

O erro comum é espalhar musculação de perna pela semana — aí você chega cansado em todo treino de corrida. Concentrando a carga na terça (logo após o run forte) e na sexta (após o run fácil), **a quarta e a quinta ficam limpas para a segunda sessão de qualidade**, e o domingo pega a perna descansada. Regra: dia duro é duro, dia leve é leve de verdade.

2. As 5 fases

Semanas	Fase	Séries × reps	Descanso	Objetivo fisiológico
2–4	Adaptação anatômica	3×12–15	60–90s	Preparar tendão e tecido conjuntivo para carregar peso
5–9	Força máxima I	4×6	2–3min	Economia de corrida — o maior ganho de performance da musculação
10–13	Força máxima II	4×4	3min	Pico de força: carga máxima, volume mínimo
14–16	Potência / reativo	3×3 + plio	3min	Converter a força construída em elasticidade (rigidez do tendão)
17–18	Manutenção	2×4 leve	2min	Manter o padrão neural sem gerar nenhuma fadiga

O princípio que permite perna 2× por semana

Carga alta + repetição baixa + **longe da falha** = estímulo **neural**, não muscular. Você recruta muito e danifica pouco, então não atrapalha a corrida. É o oposto do treino de hipertrofia. Por isso o descanso é longo (3min): ele existe para você repetir a série com qualidade, não para "puxar o fôlego".

3. Força A — Perna (terça, pós-corrida)

A sessão principal. É esta que melhora economia de corrida.

Semanas 2–4 · Adaptação anatômica

Exercício	Séries × reps	RPE	Execução / atenção
Agachamento goblet	3×12	6	Halter no peito · desce até coxa paralela · sem pressa
Leg press	3×15	6	Amplitude confortável · não colar o joelho no peito (LCA)
Terra romeno (RDL)	3×12	6	Barra colada na perna · quadril para trás · sente o posterior
Afundo caminhando	3×10/perna	6	Joelho da frente alinhado ao pé · tronco ereto
Panturrilha em pé (excêntrica)	3×15	—	3 segundos descendo · descalço · o remédio da fásia

Semanas 5–9 · Força máxima I

Exercício	Séries × reps	RPE	Execução / atenção
Agachamento livre	4×6	7–8	Barra nas costas · subida rápida · 3min de descanso
Terra trap bar	4×6	7–8	Mais seguro que o convencional para coluna · quadril baixo
Búlgaro (pé elevado)	3×8/perna	7	O exercício que corrige assimetria entre pernas
Panturrilha em pé carregada	4×10	7	Amplitude total · pausa 1s embaixo

Semanas 10–13 · Força máxima II

Exercício	Séries × reps	RPE	Execução / atenção
Agachamento livre	4×4	8	Carga mais alta do ciclo · 3min de descanso · 2 reps na reserva
Terra trap bar	4×4	8	Explodir na subida · descer controlado
Búlgaro	3×6/perna	7–8	Com halteres · controle absoluto do joelho
Panturrilha pesada	4×8	8	Carga alta · o Aquiles é mola: precisa de rigidez

Semanas 14–16 · Potência / reativo

Exercício	Séries × reps	RPE	Execução / atenção
Agachamento	3×3	8	Intenção máxima de velocidade na subida · carga alta
Salto agachado (jump squat)	4×4	—	Sem carga ou com 10–15% do peso corporal · aterrissagem macia
Depth jump (caixa 30cm)	4×4	—	Desce da caixa e salta imediatamente · contato mínimo no chão
Panturrilha	3×8	7	Manutenção

Semanas 17–18 · Manutenção (taper)

Exercício	Séries × reps	RPE	Execução / atenção
Agachamento	2×4	7	Só manter o padrão · nada de PR
Salto na caixa	3×3	—	Baixo volume · qualidade de aterrissagem
Panturrilha	2×10	6	Leve

4. Força B — Unilateral e tendão (sexta, pós-corrida)

Complementa a terça pelo lado que a barra não cobre: simetria, glúteo médio e o complexo panturrilha–fáscia. **É aqui que mora a prevenção das tuas duas queixas** (fáscia plantar e quadril).

Semanas 2–4 · Adaptação

Exercício	Séries × reps	RPE	Execução / atenção
Elevação pélvica (hip thrust)	3×12	6	Glúteo máximo — o motor da propulsão · pausa 1s em cima
SL-RDL (unilateral)	3×10/perna	6	Equilíbrio e controle · chave no histórico de LCA
Step-up	3×10/perna	6	Subir sem impulso da perna de trás
Panturrilha sentado	3×15	6	Sóleo — o músculo esquecido, e o que mais sofre correndo
Glúteo médio (abdução)	3×15	—	Banda elástica · estabilidade de quadril

Semanas 5–9 · Força máxima I

Exercício	Séries × reps	RPE	Execução / atenção
Elevação pélvica	4×8	7–8	Carga progressiva · a barra apoiada no quadril
SL-RDL	3×8/perna	7	Com halter · cadeia posterior unilateral
Step-up carregado	3×8/perna	7	Halteres · caixa na altura do joelho
Panturrilha sentado	4×12	7	Joelho dobrado isola o sóleo
Glúteo médio	3×15	—	Manter em todas as fases

Semanas 10–13 · Força máxima II

Exercício	Séries × reps	RPE	Execução / atenção
Elevação pélvica	4×6	8	Carga máxima do ciclo
SL-RDL	3×6/perna	8	Halteres pesados · controle total
Agachamento unilateral	3×6/perna	7–8	Amplitude confortável · sem forçar flexão profunda
Panturrilha sentado	4×10	8	Pesado

Semanas 14–16 · Reativo (volume baixo)

Exercício	Séries × reps	RPE	Execução / atenção
Pogo hops	4×15	—	Saltinhos no lugar · só tornozelo · contato mínimo com o chão
Bounding (passadas saltadas)	4×20m	—	Amplitude grande · converte força em elasticidade
SL hop	3×6/perna	—	Salto unilateral controlado · aterrissagem silenciosa
Panturrilha excêntrica	3×12	—	3s descendo · manutenção da fáscia

Semanas 17–18 · Mínimo

Exercício	Séries × reps	RPE	Execução / atenção
Pogo hops	3×12	—	Só acordar o tornozelo
Panturrilha	2×12	6	Leve

5. Superior (segunda) e Core (quarta)

Superior — segunda

Segue a mesma periodização da perna: **3×10 na adaptação** → **4×6 na força máxima I** → **4×5 na força máxima II** → **3×6 na potência** → **2×8 no taper**. Zero perna aqui.

Exercício	Padrão	Observação
Supino	empurrar	Reto ou halteres
Remada curvada	puxar	Contrapeso da postura de corrida
Desenvolvimento	empurrar	Ombro estável para o balanço dos braços
Barra fixa / puxada	puxar	Nas fases de força: 3× até "máximo menos 2"
Face pull	postura	3×15 em todas as fases — segura o ombro para trás

Core — quarta (sem carga de perna)

O core não é estética: é o que **impede a pelve de colapsar no fim da meia**. Quando o core cede, a passada encurta e o pace cai sem que a perna tenha acabado.

Exercício	Séries	Função
Prancha	3×45s	Anti-extensão — impede a lombar de ceder
Prancha lateral	3×30s/lado	Anti-flexão lateral — estabiliza o quadril na passada
Pallof press	3×12/lado	Anti-rotação — o mais específico para corrida
Dead bug	3×10	Dissociação tronco—membro
Bird dog	3×10	Coordenação cruzada, igual à corrida

Mobilidade — domingo, pós-longão (20min)

Bolinha na fásia plantar 2min/pé · panturrilha excêntrica 2×15 · alongamento de flexor de quadril 2×45s/lado · posição 90/90 · foam roller em quadríceps, ITB e glúteo. **É a rotina que segura as duas queixas registradas no teu histórico.**

6. As regras que fazem isso funcionar

Regra	Por quê
Nunca até a falha.	Se não sobraem 2–3 repetições no tanque, a carga está alta demais. Falha gera dano muscular, e dano muscular rouba a corrida dos próximos dias.
Dor muscular no dia seguinte = errou a dose.	Musculação bem feita para corredor quase não dá dor. Se deu, baixa a carga na próxima.
Descanso longo é parte do treino.	2–3min entre séries. Não é preguiça: é o que mantém o estímulo neural e evita transformar força em treino metabólico.
A corrida tem prioridade.	Se o run de terça foi ruim ou você chegou quebrado, corta uma série — ou a sessão inteira. Nunca o contrário.
Progressão de carga: +2,5 a 5% quando as reps saem fáceis.	Se completou todas as séries no RPE alvo com folga, sobe na semana seguinte. Sem pressa.
Nada de perna na quarta e no sábado.	Quinta tem qualidade e domingo tem longão. Esses dois dias são intocáveis.
Semana de descarga (6, 9, 13, 17) reduz junto.	Volume e carga caem, a pliometria sai. O corpo absorve tudo ao mesmo tempo.
FC de repouso acima de 60 = corta a sessão.	Vale para a musculação antes de valer para a corrida.

Atenção específica ao teu histórico

LCA: trabalho unilateral em todas as fases (búlgaro, SL-RDL, agachamento unilateral). Amplitude confortável, sem flexão profunda sob carga e sem fadiga. Controle vale mais que peso.

Fáscia plantar: panturrilha em pé (gastrocnêmio) na terça e **sentado (sóleo) na sexta** — o sóleo é o que mais sofre correndo e o mais esquecido. Mais a excêntrica no domingo.

Déficit calórico: comer proteína perto da sessão. Treinar força em déficit sem proteína suficiente acelera a perda de massa magra — exatamente o que você não quer.

Gerado em 24/07/2026 · alinhado ao ciclo da meia (20/07 a 22/11)